


المجلد 23 - العددان 8/7
يوليو/أغسطس 2007

SCIENTIFIC
AMERICAN
July / August 2007



الأفلام السينمائية
في عيوننا



لعبة مازق المسافر



طرق أفضل
لاستهداف الألم

مجلة العلوم

الترجمة العربية لمجلة ساينس فيكتوريان
تصدر شهرياً في دولة الكويت عن
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

استخدام الهيدروجين كوقود للسيارات



العددان 232/231 - السبع 1.500 دينار كويتي

* الحدود المنطقية والرياضياتية

* هل هناك شفاء من الكلب ؟

* البحث عن الكود العصبي

* قوة المحولات الربيبية

* السيليكون يصدر حزمًا ليزيرية.

ترجمة في مراجعة

المقالات

خضر الاحمد - عدنان الحموي

نظرية المباريات
لعبة مازق المسافرين
<K> ياسور



4

غالبًا ما يرفض لاعبو هذه اللعبة البسيطة الخيار العقلاني. وفي واقع الأمر، فإن تصرفهم اللامنطقي هذا يجعلهم في نهاية المطاف من الفائزين بجائزة أكبر - وهذه نتيجة تتطلب نوعًا جديدًا من المحاكاة الصورية (التفكير الصوري).

زياد القطب - محمد توفيق الرخاوي

علم الدماغ
البحث عن الكود العصبي
<A.M> نيكوليليس - <S> ريبيرو



10

إن معرفة الكيفية التي نُقلت وفُتِحا الجِردان من القطط، تكشف كيف تُترجم إلى معلومات عاصفة من النبضات تكتسح الدماغ.

عبدالحليم منصور - نزار الرئيس

طاقة
استخدام الهيدروجين
كوقود للسيارات

<S> ساتيايال - <J> بيترفينش - <G> توماس

يعمل الباحثون اليوم على إيجاد سبل تُمكن السيارات التي تعمل بخلايا الوقود، من التزود بالهيدروجين الذي تحتاج إليه لقطع مسافات طويلة.



18

أحمد الكفراوي - محمد صادق فرعون

طبي
هل هناك شفاء من الكَلْب ؟
<F.R> ويلوكباي جونير



26

إن بقاء مراهقة على قيد الحياة بعد إصابتها بالكَلْب ربما يشير إلى طريقة لمعالجة هذا المرض المروع.

فؤاد العجل - عبدالقادر عابد

علم الأحافير
ثدييات أمريكا الجنوبية المفقودة
<J.J> فلانين - <K.A> وايس - <R> تشاربير



34

تجمع غير متوقع لأحافير ثديية فريدة يُبطل أفكارا بقيت راسخة مدّة طويلة حول التاريخ الجيولوجي لأمريكا الجنوبية.

آبو بكر سعدالله - عدنان الحموي

حدود العلم
الحدود المنطقية والرياضياتية
<P.J> دولاهاي



42

تحديات عديدة واجهت علماء الرياضيات عبر التاريخ، وقد تطلب بعضها قرونا من الجهد للتغلب عليها. ويرى <P.J> دولاهاي أن اكتشاف استحالات أساسية وإثباتها يعدّان جزءًا من أبرز عناصر التقدم في هذا المضمار

«مجلة العلوم» تصدر شهرياً في الكويت منذ عام 1986 عن «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي»، وهي مؤسسة أهلية ذات نفع عام يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو أمير دولة الكويت. وقد أسست عام 1976 بهدف المعاونة في التطور العلمي والمخصاري في دولة الكويت والوطن العربي، وذلك من خلال دعم الأنشطة العلمية والاجتماعية والثقافية. «مجلة العلوم» هي في ثلاثة أبعاد محتوياتها: ترجمة لـ «ساينس فيكتوريان» التي تعتبر من أهم المجلات العلمية في عالم اليوم. وتسمى هذه المجلة منذ نشأتها عام 1845 إلى تكسني القاري. غير المتخصص من متابعة تطورات معارف عصره العلمية والثقافية ونوفير معرفة شمولية للقاري. التخصص حول موضوع تخصصه. تصدر «ساينس فيكتوريان» مثالي عشرة لغة عالمية وتتميز بعرضها الشيق للمواد العلمية المتقدمة واستخدامها القيم للصور والرسوم الملونة والحدائق.

بيولوجيا جزيئية

قوة المحولات الربيبية

< F J > ياريك - < R K > بريكر

هاني رزق - محمد عبدالحميد شاهين

إن قطع الرنا RNA المكتشفة حديثاً، والتي تعمل مثل محولات تُفعل الجينات أو تثبطها، قد تصبح أهدافاً لأصناف جديدة من العقاقير.



46

ابتكارات

طرق أفضل لاستهداف الألم

< N > ستينكس

سامي القباني - عدنان الحموي

إن تعميق فهمنا للطرق الكيميائية التي يعمل بها الدواء، إن الأسبرين والفيوكس. قد يؤدي إلى إنتاج أدوية لتسكين الألم مفعولها أفضل مما هو متوافر حالياً.



54

علم الأعصاب

الأفلام السينمائية في عيوننا

< F > ويريلين - < B > روسكا

محمد توفيق الرخاوي - زياد القطب

تعالج الشبكية معلومات تفوق كثيراً ما تخيلها أي شخص على الإطلاق. مرسلّة دسنة أفلام سينمائية مختلفة إلى الدماغ



58


تقانة المعلومات

السيليكون يصدر حزمًا ليزرية

< بهرام جلاي>

رياض صابوني - بسام المعصراني

وأخيراً، تمكن العلماء من حث السيليكون على إصدار حزم ليزرية. وبعد سنوات قليلة سوف تتعامل الحواسيب والأجهزة الأخرى مع الضوء كما تتعامل مع الإلكترونات



66

78 معرفة عملية

حشيش ذو تقانة رفيعة Hi-tech

80 اسألوا أهل الخبرة

- كيف يقتفي الباحثون عبر القرون أثر دنا DNA الميتوكوندريات ؟
- كيف تتشكل القواقع البحرية، أو كيف تتشكل قوقعة الحلزون ؟

81 أخبار علمية

ضربة فاضية في درجات الحرارة العالية

74 عروض ومراجعات كتب

- كتابان جديان يقللان إن الوقت قد حان لإسقاط نظرية الأوتار
- هل الجمال حقيقة والحقيقة جمال.

77 تنميات مستدامة

بوسع الخطوات الراسخة المتخذة حالياً أن تضع سريعاً أشد الناس فقراً على درب الاعتماد على الذات.

لعبة مأزق المسافر^(١)

بشدة، يرفض لاعبو هذه اللعبة البسيطة الخيار العقلاني. وفي واقع الأمر، فإن تصرفهم اللامنطقي هذا يجعلهم في نهاية المطاف من الفائزين بجائزة أكبر - وهذه نتيجة تتطلب نوعاً جديداً من المحاكمة الصورية^(٢).

<باسو>

يعتمدها، والتي تقدم فيها مكافآت وفقاً لتلك الخيارات، يُسمى من قبل الناس الذين يدرسونها (وهم الباحثون في نظرية المباريات^(٣)) «العباءة». وقد صممت هذه اللعبة «مأزق المسافر»^(٤) (TD) عام 1994 وفي ذهني عدة أهداف أهمها: تقنين النظرة الضيقة للسلوك العقلاني^(٥) والعمليات الإدراكية^(٦) التي ينتهجها الاقتصاديون وكثير من المتخصصين في العلوم السياسية، وتحدي الفرضيات المؤيدة لمذهب الحرية الاقتصادية^(٧) التي ينطلق منها علم الاقتصاد التقليدي. وتسلط الضوء على مُحيرة^(٨) منطقية للعقلانية^(٩).

وتحقق لعبة «مأزق المسافر» هذه الأهداف، لأن منطق هذه اللعبة يقتضي أن يكون العدد 2 الخيار الأفضل، مع أن معظم الناس ينتقون العدد 100، أو عدداً قريباً من 100 - وهاتان فئتان من الناس، عناصر أولاهما لم يفكروا منطقياً، وعناصر الفئة الأخرى يدركون تماماً أنهم منحرفون كثيراً عن الاختيار «العقلاني» إلى ذلك، بجني اللاعبين مكافأة أعلى بعدم تمسكهم بالمنطق بهذه الطريقة. لذا، ثمة شيء عقلاني في اختيار اللاعقلانية في لعبة مأزق المسافر.

وفي السنوات التي انقضت منذ تصميمي للعبة مأزق المسافر، حظيت هذه اللعبة باهتمام بالغ، إذ قام الباحثون بتوسيعها، وإعلان اكتشافاتهم التي حصلوا عليها بعد التجارب المخبرية. وقد ولدت هذه الدراسات تبصيرات في اتخاذ الناس لقراراتهم. ومع ذلك، فما زال ثمة أسئلة مفتوحة عن الطريقة التي يُطبق بها المنطق والمحاكمة العقلية على لعبة مأزق المسافر.

الحصافة^(١٠) والعالم ناش^(١١)

تعرفه السبب في أن 2 هو الخيار المنطقي، لننظر في خط التفكير، المقبول ظاهراً، الذي قد تسلكه لوسي. فكرتها الأولى هي

Overview / Sensible Irrationality (***)

game theorists (٢)
Traveler's Dilemma (٤)
cognitive processes (٦)
paradox (٨)

THE TRAVELER'S DILEMMA (١٠)
Common Sense and Nash (١١)
formal reasoning (١)
games (٣)
rational behavior (٥)
libertarian presumptions (٧)
rationality (٩)

common sense (١٠) الحسن العام أو الفطرة السليمة

(١١) John F. Nash (1928/13/6) | أحد العلماء الأمريكيين في الرياضيات وتحديدًا في نظرية المباريات، الهندسة التفاضلية والمعادلات التفاضلية الجزئية. حاز عام 1994 على جائزة نوبل في الاقتصاد مشاركة مع باحثين آخرين في نظرية المباريات وقد اشتهر شعبياً بعنقريته في الرياضيات وصراعه مع الفصام schizophrenia (التحرير)

بعد عودة «لوسي» و«باسل» من جزيرة نائية في المحيط الهادئ، وجدا أن شركة الخطوط الجوية، التي سافرا على إحدى طائراتها، أتلقت القطع الأثرية المتطابقة التي اشتراها كل منهما. وقال أحد مديري تلك الشركة إنه سعيد بدفع تعويض لهما. الركاب، لكنه عاجز عن تقدير قيمة هذه الأشياء الغريبة وهو يرى أن مجرد سؤال المسافرين عن السعر لا يُجدي نفعاً، لأنهما سيبالغان في تقدير قيمة تلك القطع.

لذا فقد وضع ذلك المدير خطة أكثر تعقيداً، وذلك بأن يطلب إلى كل منهما كتابة سعر القطع، بحيث يكون الثمن عدداً صحيحاً من الدولارات يقع بين 2 و 100، من دون أن يتشاورا حول ذلك. فإذا سجلا العدد نفسه، قبله المدير باعتباره السعر الحقيقي، ومن ثم يدفع لكل منهما المبلغ المقابل. أما إذا سجلا عددين مختلفين، فسيفترض المدير أن العدد الأقل هو السعر الحقيقي، وأن الشخص الذي سجل العدد الأكبر قام بعملية غش. وفي هذه الحالة، يدفع لكل منهما العدد الأقل. إضافة إلى مكافأة وغرامة - فالشخص الذي كتب العدد الصغير، يكافأ بزيادة دولارين على المبلغ الذي قدمه لأمانته، أما ذلك الذي سجل العدد الكبير، فيغرم بخصم دولارين من المبلغ الصغير. وعلى سبيل المثال، إذا كتبت لوسي 46، وكتب باسل 100، حصلت لوسي على 48 دولاراً وباسل على 44 دولاراً.

تُرى، ما هما العددان اللذان سيكتبهما باسل و لوسي؟ وما هو العدد الذي تكتبه أنت؟

هذا النوع من السيناريوهات، التي يتاح فيها لفرد أو أكثر، خيارات

نظرة إجمالية/ اللاعقلانية المدركة بالإحساس^(١٢)

- في لعبة مأزق المسافر، يختار شخصان، كل على حدة، عدداً صحيحاً من 2 إلى 100، ويكافأ الشخص الذي عدده أصغر بمبلغ أكبر من المال. وتؤكد نظرية المباريات أن العقلانية يجب أن تقود اللاعبين إلى اختيار العدد 2، لكن معظم الناس ينتقون عدداً صحيحاً قريباً من 100.
- والتوصل إلى فهم دقيق للاختيار العقلاني لا نكون عقلانيين، يحتاج إلى نوع جديد من المحاكمة العقلية.
- إن نتائج (لعبة) مأزق المسافر تناقض افتراض الاقتصاديين بأن نظرية المباريات قادرة على التنبؤ بالطريقة التي يُفترض أن يتصرف بها الناس العقلانيون الأنانيون. وتبين هذه النتائج أيضاً، أن الأنانية لا تعود دائماً على الذين يتصرفون بها بغوائد اقتصادية جيدة.

أنها يجب أن تكتب أكبر عدد ممكن، وهو 100، الذي يجعلها تحصل على 100 دولار إذا كان باسل طماعا مثلها (إذا كان ثمن القطع الأثرية حقا أقل كثيرا من 100 دولار، فإنها ستفكر الآن بسرور في غباء خطة مدير شركة الخطوط الجوية.)

بيد أن ما طرا على بالها سريعا أنها لو كتبت 99 بدلا من 100، فستجني مبلغا أكبر قليلا من الدولارات، لأنها ستحصل، في تلك الحالة، على 101 دولار لكن هذه الفكرة ستخطر، قطعاً، ببال باسل، فلو كتب كلاهما 99 لحصلت لوسي على 99 دولاراً ولو كتب باسل 99، لكان من الأفضل لها كتابة 98، لأنها ستحصل، في هذه الحالة، على 100 دولار غير أن هذا المنطق نفسه سيقود باسل إلى اختيار العدد 98 أيضاً وفي تلك الحالة، يمكنها كتابة 97 والحصول على 99 دولاراً. وهكذا إن الاستمرار في هذا الخط من المحاكاة العقلية، سيجعل المسافرين ينزلان إلى أصغر عدد مسموح به، وهو 2. وقد يبدو أن من المعقول جداً أن تسلك لوسي، فعلاً، كل الطريق الذي يؤدي إلى 2 لدى اتباعها هذا الأسلوب. وهذا ما يقودنا إليه المنطق

وعموماً، يستعمل المتخصصون في نظرية المباريات هذا النمط من التحليل، الذي يُسمى استقراء تراجعيًا⁽¹⁾ ويتنبأ الاستقراء التراجعي بأن كل لاعب سيكتب 2، وأن المطاف سينتهي بكل منهما إلى الحصول على دولارين (وهذه نتيجة قد تفسر السبب في نجاح مدير شركة الطيران في عمله بالشركة). وعملياً، تتنبأ جميع النماذج⁽²⁾ التي يستعملها العلماء في نظرية المباريات بالوصول إلى هذه النتيجة في لعبة «مازق المسافر» - وهي أن اللاعبين يحصلان على مبلغ أقل بمقدار 98 دولاراً مما يحصلان عليه لو اختار كل منهما ببساطة 100 دولار من دون أن يفكرا ملياً بالفوائد التي يجنيانها من انتقانهما عدداً أصغر.

وترتبط لعبة «مازق المسافر بلعبة «مازق السجين» الأكثر انتشاراً بين الناس، التي استُجوب فيها مشبوهان بارتكاب جريمة خطيرة. كل على انفراد، وكان يحق لكل منهما تجريم الآخر (مقابل تساهل السلطات معه) أو البقاء صامتا (وهذا لا يوفر للشرطة أدلة ملائمة



للبت في القضية، وذلك إذا بقي السجين الآخر صامتا أيضاً) وتبدو هذه الحكاية مختلفة جداً عن قصة المسافرين اللذين تضررت قطعتهما الأثرية، لكن رياضيات المكافآت لكل خيار في «مازق السجين»، مطابقة لرياضيات المكافآت في «مازق المسافر»، التي يسمح فيها لكل لاعب أن يختار 2 أو 3 فقط. بدلا من أي عدد صحيح من 2 إلى 100.

وفي نظرية المباريات، يحلل العلماء الألعاب بعيداً عن زخارف القصص النابضة بالحياة، وذلك بدراسة ما يسمى مصفوفة المكاسب⁽³⁾ لكل لاعب - وهي شبكة مربعة تحوي جميع المعلومات ذات الصلة عن الخيارات والمكاسب⁽⁴⁾ المحتملة لكل لاعب [انظر الموتر في الصفحة 7] ويقابل اختيار لوسي سطر⁽⁵⁾، واختيار باسل عمود⁽⁶⁾ ويحدد العددين في المربع المختار مكافأتهما.

وعلى الرغم من الاختلاف في الأسماء، فإن «مازق السجين»، وما ذكرناه عن اختيار 2 في «مازق المسافر»، يقدمان لاعبين لا يواجهان مازقا حقيقياً. ويرى كل مشارك خياراً صحيحاً لا لبس فيه. وهو 2 (أو، تجريم الشخص الآخر، عند عرض قصة السجين) يسمى هذا الخيار الخيار المسيطر⁽⁷⁾، لأنه أفضل ما يمكن عمله، بصرف النظر عما يفعله اللاعب الآخر. وباختيار لوسي 2 بدلا من 3، فإنها تحصل على 4 دولارات بدلا من 3 دولارات إذا اختار باسل 3، وتحصل على دولارين اثنين بدلا من لا شيء، إذا اختار باسل 2 وبالمقابل، لا يوجد للرواية الكاملة لمازق المسافر خيار مسيطر. فإذا اختار باسل 2 أو 3، فافضل ما تفعله لوسي هو اختيار 2 لكن إذا اختار باسل أي عدد من 4 إلى 100، فالأفضل للوسي هو اختيارها عدداً أكبر من 2

وعند دراسة مصفوفة المكاسب، فإن علماء نظرية المباريات يعتمدون غالباً على توازن ناش⁽⁸⁾، نسبة إلى «د. ف. ناش، جونير»

models (1)
payoff matrix (1)
the dominant choice (1)

backward induction (1)
Prisoner's Dilemma (1)
choices and payoffs (1)
Nash equilibrium (1)



جون ف. ناش

تنبأ نظرية المباريات بأن «توازن ناش» يحدث عندما تؤدي لعبة مأزق المسافر بأسلوب عقلائي.

وبالطبع، فمأزق المسافر ليس اللعبة الوحيدة التي تتحدى الاعتقاد بأن الناس يقومون دائما باختيارات عقلانية أنانية لكن ما يثير الناحية الأكثر إدهاشا، هو أنه حتى لو لم يكن كل من اللاعبين معنيا إلا بالفائدة العائدة إليه شخصيا، فليس من المعقول بالنسبة إليهما اللعب بالطريقة التي يتنبأ بها التحليل الصوري

ولمأزق المسافر نتائج أخرى في فهمنا لأوضاع عالمنا الحقيقي فاللعبة تسلط الضوء على الطريقة التي يجري وفقها سباق التسليح، بوصفه عملية تدريجية تسير بنا بخطوات صغيرة لتوصلنا إلى نتائج تتزايد سوءا وقد حاول علماء نظرية المباريات أيضا، توسيع مأزق المسافر لفهم الطريقة التي تسلكها شركتان متنافستان، تجبر كل منهما الشركة الأخرى على تخفيض أسعارها، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بهما (مع أن ذلك يصب، في هذه الحالة، في مصلحة المستهلكين الذين يشترون بضائع من تلك الشركتين)

وقد أدت جميع هذه الاعتبارات إلى طرح سؤالين: كيف يلعب الناس فعليا هذه اللعبة؟ وإذا اختار معظم الناس عددا أكبر كثيرا من 2، فهل بمقدورنا تفسير سبب فشل نظرية المباريات في التنبؤ بذلك؟ فيما يتعلق بالسؤال الأول، فنحن نعرف الآن الكثير عنه أما السؤال الآخر، فلا نعرف عنه سوى القليل.

كيف يتصرف الناس في الواقع⁽¹⁴⁾

خلال العقد الماضي، أجرى الباحثون كثيرا من التجارب على مأزق المسافر، وتوصلوا إلى كثير من المعلومات الجوهرية عن هذه اللعبة. وثمة تجربة مختبرية شهيرة، استعملت فيها قطع نقود حقيقية من قبل طلبة كلية الاقتصاد، بوصفهم لاعبين. نفذ التجربة في جامعة فرجينيا كل من «M. كاي» و «K. كويري» و «R. كوميذ» و «A. هولت». دُفع للطلبة 6 دولارات للمشاركة، واحتفظوا بأي نقود إضافية كسبوها في اللعبة. ولتسهيل التعامل، كانت الخيارات تقدر بالسنوات بدلا من الدولارات، وكان مجال الخيارات محددًا بين 80 و 200، وكانت قيمة الغرامة والمكافأة تتغير في المراحل المختلفة للعبة، من مبلغ صغير قدره 5 سنتات، إلى آخر كبير قدره 80 سنتا. وقد أراد المجرّبون معرفة ما إذا كان لتغيير حجم الغرامة والمكافأة أهمية في طريقة أداء اللعبة. إن تغيير حجم المكافأة والغرامة لا يغير أيا من التحليلات الصورية؛ فالاستقراء التراجعي يؤدي دائما إلى النتيجة (80، 80)، وهي توازن ناش في كل حالة.

لقد أثبتت التجربة التوقع الحدسي بأن اللاعب المتوسط لا يطبق استراتيجية توازن ناش 80. وعندما كانت قيمة المكافأة 5 سنتات، كان متوسط اختيار اللاعبين هو 180. وهذا الاختيار تدنى إلى 120 عندما ارتفعت المكافأة إلى 80 سنتا.

[من جامعة برنستون] (قدم R. كرو) العالم «ناش» في الفيلم السينمائي *A Beautiful Mind* وتوازن ناش نتيجة يستخلص منها أنه ما من لاعب يمكنه تحسين أدائه عندما ينحرف انحرافا احادي الجانب. لننظر في النتيجة (100، 100) في مأزق المسافر (العدد الأيسر هو اختيار لوسي، والأيمن اختيار باسل). فإن غيرت لوسي اختيارها إلى 99، فستكون النتيجة (99، 100)، وعندئذ تحصل على 101 دولار. ولكن لوسي أفضل حالا بهذا التغيير، فإن النتيجة (100، 100) لا تمثل توازن ناش.

يوجد لمأزق المسافر توازن واحد فقط لناش - وهي النتيجة (2، 2)، التي اختار وفقا لها كل من لوسي وباسل العدد 2. إن الاستعمال الكثير لتوازن ناش هو السبب الرئيسي في تنبؤ كثير من التحليلات بهذه النتيجة في مأزق المسافر

ولدى المتخصصين في نظرية المباريات مفاهيم توازن أخرى هي التوازن الشديد⁽¹⁵⁾ والحل القابل للعقلنة⁽¹⁶⁾ والتوازن الشام⁽¹⁷⁾ والتوازن القوي⁽¹⁸⁾، وغير ذلك. ويؤدي كل من هذه المفاهيم إلى التنبؤ بـ (2، 2) في حال مأزق المسافر وهنا تكمن المشكلة فمعظمنا يجد نفسه مدفوعا بإحساس يوجهه إلى اللعب بعدد أكبر كثيرا، وأنه سيحصل، في المتوسط، على مبلغ أكبر كثيرا من دولارين ويبدو أن حدسنا مخالف لنظرية المباريات كلها

اقتضاءات في علم الاقتصاد⁽¹⁹⁾

إن اللعبة وتنبؤها الحدسي لنتيجتها يناقضان أيضا أفكار الاقتصاديين. لقد كان علماء الاقتصاد في وقت مبكر مشدودين بقوة إلى الفرضيات المؤيدة لمذهب الحرية الاقتصادية، التي تقضي بترك الأفراد مسيرين بإراداتهم ورغباتهم الخاصة. لأن خياراتهم الأنانية ستجعل الاقتصاد يعمل بفاعلية لكن بروز طرائق نظرية المباريات أدى دورا كبيرا في تحرير علم الاقتصاد من هذه الفرضيات. غير أن هذه الطرائق ظلت طويلا مستندة إلى مسلمة⁽²⁰⁾ مفادها أن الناس يقدمون على خيارات عقلانية أنانية يمكن لنظرية المباريات التنبؤ بها. بيد أن مأزق المسافر يقوض كلا من فكرة مذهب الحرية الاقتصادية، التي تقول إن الأنانية غير المقيدة مفيدة للاقتصاد، وعقيدة نظرية المباريات بأن الناس سيكونون أنانيين وعقلانيين.

تقضي النتيجة «الفعالة» في مأزق المسافر بأن يختار كلا المسافرين 100 لأن ذلك يؤدي إلى حصول كلا اللاعبين على الحد الأعلى لمجموع ما يكسبانه. أما أنانية الحرية الاقتصادية فستجعل الناس يبتعدون عن 100 إلى أعداد أصغر بفاعلية أقل. أملا منهم في الحصول على مبلغ أكبر، كل على حدة.

وإذا لم يقدّر الناس باستعمال استراتيجية توازن ناش (2، 2)، فإن افتراضات الاقتصاديين المتعلقة بالسلوك العقلاني يجب مراجعتها

How People Actually Behave (14)
rationalizable solution (1)
strong equilibrium (1)

Implications for Economics (19)
strict equilibrium (1)
perfect equilibrium (1)
axiom (1)

مصفوفة المكاسب في «مازق المسافرين»^(١)

وتنتيجة اختيار كلا اللاعبين 2 وحصول كل منهما على دولارين (اللون الذهبي)، تسمى توازن ناش Nash equilibrium. ويكون أداء لوسي أسوأ (لأنها تكسب 0 دولار) إذا اختارت أي عدد آخر وواصل باسل اختياره للعدد 2. وبالمثل، فإن أداء باسل يكون أسوأ إذا اختار وحده عددا ما غير العدد 2. وعندما تُقصر الخيارات على 2 و 3 فقط (المستطيل الأسود اللون)، تصبح اللعبة مكافئة للعبة مازق السجين

توفر مصفوفة المكاسب^(٢) هذه لعلماء نظرية المباريات جميع ما يحتاجون إلى معرفته عن لعبة مازق المسافرين فاختيارات «لوسي» المحتملة مبينة في العمود الموجود في أقصى اليسار، أما اختيارات «باسل» فهي في السطر العلوي وأول عدد في المربع الذي يتقاطع فيه السطر والعمود المختاران هو مكسب لوسي. والعدد الثاني هو مكسب باسل. فمثلا، إذا اختارت لوسي 98 وباسل 99، فإن لوسي تستلم 100 دولار، وباسل يستلم 96 دولارا



اختيار لوسي (بالدولارات)

اختيار باسل (بالدولارات)	2	3	4	...	98	99	100
2	2 2	4 0	4 0	...	4 0	4 0	4 0
3	0 4	3 3	5 1	...	5 1	5 1	5 1
4	0 4	1 5	4 4	...	6 2	6 2	6 2
...
98	0 4	1 5	2 6	...	98 98	100 96	100 96
99	0 4	1 5	2 6	...	96 100	99 99	101 97
100	0 4	1 5	2 6	...	96 100	97 101	100 100

اختيار لوسي (بالدولارات)

قسم «روبنشتاين» الاختيارات الممكنة إلى أربع مجموعات محتملة من الأعداد، ووضع فرضية تقضي بأن ثمة عملية إدراكية مختلفة تكمن وراء كل منها، فالعدد 300 هو استجابة عاطفية عفوية واختيار عدد يقع بين 295 و 299 يتضمن محاكمة عقلية استراتيجية (مثلا، قدرا معينا من الاستقراء التراجعي). وأي عدد من 181 إلى 294 يصلح، إلى حد ما، ليكون اختيارا عشوائيا. وأخيرا، فنظرية المباريات تفسر سبب اختيار 180، لكن اللاعبين ربما توصلوا إلى ذلك العدد بأنفسهم، أو ربما كان لديهم معرفة سابقة باللعبة.

وثمة اختبار لمُخَفِّة روينشتاين^(٣) المتعلقة بالمجموعات الثلاث الأولى. لرؤية المدة التي استغرقها كل لاعب لاتخاذ قرار. وفي الحقيقة، فأولئك، الذين اختاروا من 295 إلى 299، استغرقوا وسطيا أطول وقت (96 ثانية). في حين أن من اختار من 181 إلى 294 أو 300 استغرق قرابة 70 ثانية - وهذا ينسجم مع فرضية روينشتاين القائلة إن الناس الذين اختاروا من 295 إلى 299 فكروا أكثر من أولئك الذين اعتمدوا خيارات أخرى

لقد أجرى المتخصصون في نظرية المباريات عددا من المحاولات لتفسير عدم اختيار عدد كبير من اللاعبين توازن ناش في لعبة مازق المسافرين. وقد حاج بعض المحللين في أنه ثمة كثير من الناس غير قادرين على القيام بالمحاكمة الاستنتاجية الضرورية، ومن ثم فهم يعتمدون اختيارات غير عقلانية عن غير علم. ولا بد أن يكون هذا التفسير صحيحا في بعض الحالات، لكنه لا يفسر جميع النتائج، كذلك التي حصل عليها عام 2002 <T> بيكر و <M> كارتر و <J> نايف. الذين كانوا جميعا حينذاك في جامعة هوهنهايم بألمانيا. وفي التجربة التي أجروها، لعب 51

درست «كايرا» وزملاؤها، أيضا، كيف يمكن أن يتغير سلوك اللاعبين نتيجة ممارسة لعبة مازق المسافرين مرارا وتكرارا، فهل يتعلمون اختيار توازن ناش، حتى لو لم يكن هذا حدسهم الأول؟ وفعلا، عندما كانت المكافأة كبيرة، كان اللعب بمرور الوقت، يتقارب نزولا من توازن ناش 80. بيد أن ما يثير الاستغراب هو أنه عندما كانت المكافآت ضئيلة، كان الاختيار يتزايد باتجاه الحد الأقصى المقابل، وهو 200

تلقت حقيقة كون الناس لا يختارون، في الغالب، توازن ناش، مزيدا من الدعم من تجربة جرت عن طريق الإنترنت، لم تقدم فيها دفعات مالية حقيقية، نفذها <A> روينشتاين [من جامعة تل أبيب وجامعة نيويورك] منذ عام 2002 إلى عام 2004. وقد تطلبت اللعبة من اللاعبين، الذين كانوا سيحضرون إحدى محاضرات روينشتاين عن «نظرية المباريات وناش»، اختيار عدد صحيح بين 180 و 300، كان عليهم اعتباره مقدرا بالدولارات، وكان مقدار المكافأة/ الغرامة محددًا بخمسة دولارات

وقد استجاب نحو 2500 شخص من سبع دول، مما هيأ للتجربة حجم عينة كبيرا وتنوعا واسعا لا يمكن توفيره في المختبر. وقد اختار أقل من سبعة عدد اللاعبين توازن ناش 180. واختار معظمهم (55 في المئة) العدد الأكبر 300 [انظر المؤطر في الصفحة 8]. وما أثار الدهشة هو أن البيانات كانت متشابهة جدا في الزمر الجزئية المختلفة، مثل الناس المنتمين إلى دول مختلفة.

لكن عمليات التفكير التي تولد هذا النمط من الاختيارات تظل غامضة. وبوجه خاص، كان أكثر الاستجابات شيوعا (300) هو الاستراتيجية الوحيدة التي «سيطرت» في اللعبة - وهذا يعني استراتيجية أخرى (299) لا يمكن أن تفعل أسوأ من ذلك، وتكون أحيانا أفضل

Payoff Matrix of the Traveler's Dilemma (١)

Rubenstein's conjecture (٢)

payoff matrix (٣)


نظرية المباريات مقابل نظرية اتخاذ القرار العادية : أنا أعرف أنك تعرف أنني أعرف ...^(*)

استيقظ، أصيب بالفزع حين اكتشف أن القرو أخذت جميع قبعاته إلى أعلى الشجرة. وإذا ذا تذكر حكاية جده، ومن ثم قذف بقبعته التي كانت على رأسه إلى الأرض. لكن، وبسبب خفي، لم ير أي من القرو أي قبعة، وقام واحد فقط من القرو بالنزول إلى الأرض، ثم أمسك بالقبعة بقوة، واتج نحو يانع القبعات، ووجه إليه صفعة عنيفة وقال «هل تظن أنك الوحيد الذي له جـ؟»

توضح هذه الحكاية اختلافا مهما بين نظرية اتخاذ القرار العادية ونظرية المباريات. ففي النظر الأخيرة، ما هو عقلاني للاعب قد يعتمد على ما

سمعت هذه الحكاية في الهند. فعندما كان يانع قبعات يصحو من قيلولته تحت إحدى الأشجار، وجد أن مجموعة من القرو نقلت جميع قبعاته إلى أعلى الشجرة. عند ذلك انتابته نوبة غضب، وألقى بقبعته التي كان يعتمرها على الأرض. وما إن رأت القرو - المعروف عنها حبها للتقليد - ما فعل الرجل، حتى رمت جميع القبعات على الأرض، وإذا ذاك، سارع يانع بجمعها.

بعد نصف قرن من هذا الحادث، وضع حفيد يانع - الذي هو أيضا، يانع قبعات - بضاعته تحت الشجرة نفسها لينعم بقسط من القيلولة، وعندما



تضمنت اللعبة نظام مكافآت نقدية. يختار المجرمون لاعبا بطريقة عشوائية ليبيع 20 دولارا مضروبا بالعدد المقابل لمتوسط ربح هذا اللاعب في اللعبة. وهكذا فإن الفائز، الذي كان متوسط ربحه 85 دولارا، حصل على 1700 دولار

ومن بين اللاعبين الذين عددهم 51، اختار 45 منهم عددا وحيدا لاستعماله في كل لعبة (أما الستة الآخرون، فاختاروا أكثر من عدد واحد). ومن بين هؤلاء الذين عددهم 45، لم يختار توازن ناش (2) إلا ثلاثة منهم. واختار عشرة منهم الاستراتيجية (100)، كما اختار 23 منهم أعدادا من 95 إلى 99. ومن المفترض أن يعرف المتخصصون في نظرية المباريات كيف يفكرون استنتاجيا، لكنهم، عموما، لم يعتمدوا الاختيار العقلاني الذي تمليه نظرية المباريات المنهجية.

ولو نظرنا إلى الأمر بطريقة سطحية، لبدأ لنا أن تفسير اختياراتهم بسيط، وهو أن معظم المشاركين توصلوا إلى حكم حصيف بأن نظراهم سيختارون أعدادا من شريحة التسعينات العالية، لذا فاختار عدد كبير، بوجه مشابه، يؤهلهم لكسب أعلى عائد متوسط لكن، لماذا توقع كل شخص أن يختار كل شخص آخر عددا كبيرا؟


ربما كانت الغيرية "مغروسة بقوة في نفوسنا جنبا إلى جنب مع الأنانية، لذا فسلوكنا حصيلية صراع بينهما. نحن نعرف أن مدير شركة الخطوط الجوية سيدفع أكبر قدر من المال إذا اختار كلاهما 100 وكثير منا لا يرضى أن "يخذل" رفيقه في السفر ليبيع مجرد دولار إضافي، لذا فتحن نختار 100، حتى لو كنا ندرك تماما، عن سابق تفكير، أن 99 خيار أفضل لنا كأفراد.

ولقطع شوط أبعد في تفسير المزيد من أنماط السلوك التي نرى في مثل هذه التجارب، قدم بعض الاقتصاديين افتراضات قوية، لكنها لا تحظى بقدر عال من الواقعية، ثم استخلصوا السلوك المرصود من نماذج معقدة. وإنني لا اعتقد أننا سنتعلم الكثير من هذا الأسلوب ومع تحول هذه النماذج والافتراضات لتصبح أعقد من أن تكون ملائمة للبيانات، فإنها توفر لنا بصيرة تضعف قوتها مع الزمن


عضوا من جمعية نظرية المباريات - وجميعهم عمليا متخصصون محترفون في هذه النظرية - اللعبة الأصلية في مازق المسافرين، من 2 إلى 100. وقد لعب كل منهم مع نظرائه الخمسين الآخرين، وذلك باختيارهم استراتيجية وإرسالها إلى الباحثين. قد تكون الاستراتيجية عددا وحيدا يُستعمل في كل لعبة، أو استعمال تشكيلة من الأعداد، واعتماد عدد مرات استعمال كل منها. وقد

ما الذي كانوا يفكرون فيه؟^(**)

افترض الباحثون أن عمليات التفكير المختلفة تكمن وراء الأنماط المختلفة من الخيارات التي اعتمدها الناس في لعبة مازق المسافرين، التي نمت فيها الخيارات من 180 إلى 300 [الرسم البياني (a)]. فعندما تكون استجاباتهم عاطفية وعموية، يختارون 300. أما إذا كان الاختيار نتيجة تفكير استراتيجي، فهم يختارون [299/295]. وأما إذا كان عشوائيا، فيختارون [181/294]. إن اللاعبين، الذين يعتمدون خيارا عقلانيا صوريا [180]، ربما يكونون قد استنحوه أو عرفوه مسبقا. وكما هو متوقع، فالناس الذين يعتمدون خيارات "عموية" أو "عشوائية" يستغرقون في عملية اختبارهم الفترات الزمنية الأقصر [الرسم البياني (b)].



Game Theory vs. Ordinary Decision Theory: I Know that You Know that I Know ... (**) What Were They Thinking? (**) altruism (1)



وإني أعتقد أن الافتراض بأن العقلانية معرفة مشتركة هي مصدر التعارض بين المنطق والحدس. وبأن الحدس، في حالة لعبة مازق المسافر، سليم، وهو بانتظار إثبات صحته من خلال منطق أفضل. والمشكلة شبيهة بما حدث في وقت مبكر من نشوء نظرية المجموعات. ففي ذلك الوقت، كان الرياضياتيون يقبلون بأن وجود المجموعة الشاملة^(١) - وهي المجموعة التي تحوي كل شيء - شيء مسلم به. فقد بدت المجموعة الشاملة طبيعية وواضحة جداً، لكن كثيراً من محيريات نظرية المجموعات نشأت نتيجة افتراض وجود تلك المجموعة، الذي أثبت الرياضياتيون الآن خطؤه. وفي رأيي، فإن المعرفة المشتركة للعقلانية، التي يقبل بها علماء نظرية المباريات، تواجه مصيراً مشابهاً.

عقلاني لللاعب الآخر، فكي تتخذ لوسي قرارها سليم، يجب عليها أن تضع نفسها في موضع اسل، وتفكر فيما يجب أن يفكر فيه. لكنه سيفكر بما تفكر لوسي فيه، وهذا يؤدي إلى عملية تراجع نهائية. ويصف علماء نظرية المباريات هذا الوضع قولهم: «العقلانية هي معرفة مشتركة بين اللاعبين». ويعبارة أخرى، فإن لوسي و باسل قلايان، وكل منهما يعرف أن الآخر عقلاني، وكل منهما يعرف أن الآخر يعرف، وهلم جرا. الافتراض بأن العقلانية معرفة مشتركة أمر شائع في نظرية المباريات، ونادراً ما يُعلن ذلك صراحة. لكنه قد يقحمنا في مشكلات في بعض الألعاب، مثل لعبة مازق السجين، التي يمكن للاعبين فيها أن يوافقا بحركات متعارضة مع هذا الافتراض.

مسألة غير محلولة^(٢)

وما يؤثر الاهتمام أنه يرتبط بهذا الرافض للعقلانية والمنطق نوع من «ما وراء العقلانية»^(٣). وإذا سلك كلا اللاعبين الطريق ما وراء العقلاني هذا، فسيكون كل منهما على ما يرام. وفكرة السلوك المولد بالرفض العقلاني للسلوك العقلاني شيء يصعب إعطاؤه صيغة معينة. لكن فيه تكمن الخطوة الواجب اتخاذها في المستقبل لحل المحيريات العقلانية^(٤) التي تزعج نظرية الألعاب، والمكودة^(٥) في لعبة مازق المسافر.

Unsolved Problem (١)
universal set (١)
paradoxes of rationality (٣)
welfare economics (٥)
meta-rationality (٢)
codified (٤)
Econometric Society (١)

المؤلف

Kaushik Basu

استاذ علم الاقتصاد في جامعة كارل ماركس للدراسات الدولية، ومدير مركز علم الاقتصاد التحليلي في جامعة كورنيل. نشر عدداً كبيراً من المقالات في مجلات أكاديمية تعنى بتطوير علم الاقتصاد، واقتصاد الرخاء^(١)، ونظرية المباريات، والتنظيم الصناعي. وهو يكتب أيضاً مقالات في وسائل الإعلام الشعبية. وله عمود شهري في BBC News online وهو زميل في جمعية الاقتصاد القياسي^(٢).

مراجع للاستزادة

On the Nonexistence of a Rationality Definition for Extensive Games. Kaushik Basu in *International Journal of Game Theory*, Vol. 19, pages 33-44, 1990.

The Traveler's Dilemma: Paradoxes of Rationality in Game Theory. Kaushik Basu in *American Economic Review*, Vol. 84, No. 2, pages 391-395; May 1994.

Anomalous Behavior in a Traveler's Dilemma? C. Monica Capra et al. in *American Economic Review*, Vol. 89, No. 3, pages 678-690, June 1999.

The Logic of Backwards Inductions. G. Priest in *Economics and Philosophy*, Vol. 16, No. 2, pages 267-285; 2000.

Experts Playing the Traveler's Dilemma. Tilman Becker et al. Working Paper 252, Institute for Economics, Hohenheim University, 2005.

Instinctive and Cognitive Reasoning. Ariel Rubinstein. Available at arielrubinstein.tau.ac.il/papers/Response.pdf

Scientific American, June 2007

لكن التحدي الباقي ليس هو تفسير السلوك الحقيقي للناس العاديين أمام لعبة مازق المسافرين. ويعود الفضل جزئياً إلى التجارب التي أوضحت أن من المحتمل أن تكون الغيرية والتكيف الاجتماعي، والمحاكمة الخاطئة، هي التي توجه معظم اختيارات الأفراد. غير أنني لا أتوقع أن يختار كثير من الناس 2، إذا استبعدت هذه العوامل الثلاثة جميعها من الصورة. ثري، كيف نستطيع تفسير ذلك إذا واصل حقاً معظم الناس اختيار أعداد كبيرة، ربما في شريحة التسعينات، حتى لو لم يكونوا مفتقرين إلى القدرة على الاستنتاج، وكانوا يكتبون غيرتهم الطبيعية وسلوكهم الاجتماعي كي يلعبوا بقلب قاس، في مسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من المال؟ وخلافاً للقسم الأكبر من نظرية المباريات الحديثة، الذي يمكن أن يستعمل فيه قدر كبير من الرياضيات، التي يسهل استيعابها من قبل من يعرفون التقنيات الرياضية، فهذا سؤال صعب يتطلب تفكيراً إبداعياً.

لنفترض أنا وأنت اثنين من اللاعبين الحاذقين والقساء القلوب فما الذي يمكن أن يدور بخلدنا؟ أنا أتوقع أنك ستختار عدداً كبيراً ولكن في المجال من 90 إلى 99: عندئذ يجب عليّ ألا أختار 99. لأنه أياً كان العدد الذي تختاره من هذا المجال، فإن اختياري للعدد 98 سيكون جيداً أو أفضل بالنسبة إليّ. لكنك إذا كنت تنطلق من المعرفة نفسها للسلوك البشري غير الرحيم، مثلاً ما فعل أنا، واتبعت المنطق نفسه، فإنك ستعتمد 99 خياراً لك - وباستعمال النوع نفسه من المحاكاة العقلية التي كانت ستجعل لوسي و باسل يختاران 2، فسرعان ما تلغي كل عدد من 90 إلى 99. لذا من غير الممكن جعل مجموعة الأعداد الكبيرة، التي قد يختارها منطقياً ذوو القلوب القاسية، مجموعة محددة تماماً، ونكون ندخلنا حقل المعرفة الصعب فلسفياً وذلك بإعمال العقل في فذلكات منطقية ذات طبيعة أساسية غير محددة جيداً.

ولو تعين عليّ أداء هذه اللعبة، لقلت لنفسني: «إنس منطق نظرية المباريات واختر عدداً كبيراً (ربما كان 95)، وأنا أعرف أن غريمي سيختار شيئاً مشابهاً، وسيتجاهل كلانا الحجة المنطقية بأن العدد الأصغر التالي سيكون أفضل من أي عدد نختاره.»

البحث عن الكود العصبي

إن معرفة الكيفية التي تُفكّلت وفقها الجردان
من القطط، تكشف كيف تُترجم إلى معلومات
عاصفة من النبضات التي تكتسح الدماغ.

A. M., L. A. نيكوليس - S. ريبير



من حولنا وكذلك ذكرياتنا وأحلامنا، وحتى تاريخ جنسنا البشري من تجميع حشد من الإشارات الكهربائية البالغة الصغر التي تنتشر عبر أدمغتنا تماما مثلما تكتسح عاصفة رعدية السماء في ليلة صيف

خطوط مستقيمة على نحو خادع^(١)

كانت الجرزة إيش تشارك دون أن تعلم في تجربة صممت لمواجهة هذا السؤال المحوري جدا. أما كونها قد قررت أن تستخدم شعر وجهها لإنجاز هذه المهمة، فذلك كان مجرد أمر صائب فقط فعندما تكون الجرذان في حاجة فعلية إلى الفرار من القلط بالاندفاع عبر فتحة حجمها غير محدد وواقعة في مكان ما في أحد جدران مكان مظلم غير مألوف، فإن أشعار شواربها تمنحها أفضل أمل للنجاح.

ترجم مستقبلات الجرذ الميكانيكية أي انحراف ميكانيكي صغير جدا لأشعار الشوارب إلى سلاسل متتالية سريعة من التفريغات الكهربائية الصغيرة التي تعرف بجهود الفعل الكهربائي^(٢) لتبلغ بالإشارة موضع المنبهات اللمسية وشدها ومدتها. تنتقل هذه النبضات إلى الدماغ عبر الجهاز الثلاثي التوائم، وهو الشبكة العصبية التي تكون الجزء من الجهاز الحسي الجسدي المتخصص بنقل الإشارات اللمسية الواردة من الوجه ومعالجتها. لذلك فإن فهمنا للكيفية التي تحسب بها الجرزة إيش وغيرها من الجرذان بمنتهى السرعة واليسر قطر فتحة ما في مجرد جزء من الثانية مستخدمة فقط المعلومات الحسية التي تجمعها أشعار شواربها يتركز على توضيح كيف تتأثر المجموعات الضخمة من العصبونات الموزعة عبر الجهاز الثلاثي التوائم لمعالجة تلك المعلومات الحسية الواردة.

يكشف البحث في هذه المسألة بالطبع عما هو أكثر بكثير من مجرد معرفة كيف تراوغ الجرذان القلقة القطط الجائعة لقد قام علماء الفزيولوجيا العصبية بالفعل منذ بداية سبعينات القرن العشرين بدراسة الجهاز الثلاثي التوائم في القوارض لمحاولة الإجابة عن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الكود العصبي إن العمل الذي نقوم به في مختبرنا والذي يقوم به آخرون في كثير من المختبرات في جميع أنحاء العالم من أجل حل شفرة هذا الكود يوضح فقط كيف تطورت الفرضيات العلمية بشكل مثير منذ ذلك الحين، وكذلك القدر الهائل الذي لا يزال علينا أن نتعلمه بعد

لقد كانت النظرية التي يفضلها معظم علماء الأعصاب منذ ثلاثة عقود هي تلك النظرية المعروفة بنموذج الخط الموسوم^(٣)، لأنها اقترحت أن المعلومات الحسية المتولدة في محيط الجسم تنتقل عبر مسارات عصبية متوازية على طول الطريق إلى القشرة المخية الجديدة للدماغ. ومن حيث الجوهر تنتقل الرسالة خلال دائرة تغذية (تلقين) تقدمية^(٤) تماما لتصل المستقبلات الحسية المحيطية (مثل أشعار الشوارب) بالتركيبة الأعلى رتبة في الدماغ

لقد لاقى هذا النموذج تأييدا ذا شأن مهم خلال السبعينات من القرن العشرين، عندما كشف <T> وولسي^(٥) و<H> فاندربولس^(٦) [عالمًا

حينما انفتحت فجأة الأبواب الانزلاقية بتحكم حاسوبي كاشفة حجرة دامسة الظلام، ولكنها مألوفة بالفعل للجرزة إيش، قامت الجرزة إيش بالضبط بما كان متوقعا منها بعد كل هذه الأسابيع من التدريب القاسي. فاندفعت بقوة دون تردد داخل الحجرة الضيقة، متحركة باقصى سرعة نحو الجدار المقابل، ومتأثرة على الأرجح بالمكافأة التي كانت متأكدة من الحصول عليها نظرا لأدائها الممتاز في الآونة الأخيرة، وكانت على أتم استعداد لاستعراض مهاراتها والتباهي بها.

لقد بدأت التجربة لحظة اجتياز الجرزة إيش حزمة من الأشعة الضوئية تحت الحمراء، أمام فتحة موضوعة في مسار غدوها مباشرة. كانت هذه الفتحة، المطوقة من الجانبين بذراعين صغيرين لقضيبين معدنيين كل منهما على شكل الحرف T يبرزان من جانبي الحجرة. تحدد حيزا (شقا صغيرا) ضيقا، وعلى الجرزة إيش أن تمر من خلاله لتصل إلى الجدار المقابل. وكان العمل الذي عليها أن تقوم به أبعد ما يكون عن التفاهة، إذ كان عليها في محاولة واحدة أن تقدر قطر الفتحة بأسرع ما يمكن ولجعل الأمور أكثر تعقيدا وإثارة للاهتمام كان حجم الفتحة يتغير عشوائيا من تجربة إلى أخرى. ولم يكن أمام الجرزة إيش وهي غير قادرة على رؤية القضيبين إلا سبيل واحد لبلوغ هدفها ألا وهو الاعتماد كلية على حسها اللمسي الشديد الحساسية.

لقد تمكنت الجرزة إيش على نحو مثير للدهشة في 90% من التجارب أن تميز على نحو صحيح ما إذا كانت الفتحة أضيق أو أوسع من ذي قبل، حتى عندما لم يتغير قطر الفتحة إلا بمقدار مليمترين فقط واستطاعت أن تحل هذا اللغز اللمسي بالكاد في 150 جزءا من الألف من الثانية بلمس حافات القضيبين بأطراف الأشعار الطويلة البارزة التي تثبت من جانبي وجهها فقط. لم تكن حيلة الجرزة إيش عملا بسيطا من المنظور البشري، فأي شخص يحاول إنجاز مهمة أو حل مسألة مماثلة بوضع شاربه أو لحيته على الفتحة نفسها كان سيفشل فشلا مخزيا مثيرا للرتاء.

لكن إيش جرزة. وقاعدة كل شعرة من أشعار شاربيها تحتوي على كثافة عالية جدا من الأعضاء الحسية المحيطية المتخصصة المعروفة بالمستقبلات الميكانيكية التي تترجم الخصائص الرئيسية للمنبهات اللمسية إلى لغة يستطيع الدماغ أن يفهمها ألا وهي الكهربا. تنتقل مثل تلك الإشارات الكهربائية في الجرذان كما في البشر بواسطة عدد وافر من الأعصاب المحيطية الموجودة في جميع أنحاء الجسم إلى تراكيب دماغية متعددة مترابطة فيما بينها فتتكون بذلك دائرة عصبية ضخمة تعرف بالجهاز الحسي الجسدي المسؤول عن ذخيرتنا المتسعة من الأحاسيس اللمسية. تسهم هذه الدائرة نفسها أيضا في نشوء معظم خبرتنا الإدراكية الشخصية، أي إحساسنا الخاص بذاتنا

لكن لا تزال منذ زمن بعيد وإلى الآن الكيفية المضبوطة التي يترجم بها الدماغ هذه اللغة من النبضات الكهربائية إلى مثل تلك المدارك الحسية الدقيقة والمتنوعة لغزا عويضا يصعب فهمه، وواحدا من أبحاث الدماغ المقدسة المضنية التي تتطلب بحثا طويلا جاهدا إن حل (فك) " هذا الكود العصبي هو بمثابة فتح الأبواب لفهم ماهية هويتنا. إذ تثبت قدراتنا على التحدث والحب والكراهية وإدراك العالم

Deceptively Straight Lines (١١)
action potentials (١٢)
strict feedforward circuit (١٣)

SEEKING THE NEURAL CODE (١٤)
crack (١٥)
labeled-line model (١٦)

التشريح العصبي في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز] النقب عما بدا أنه خطوط الاتصال المادية داخل القشرة المخية الحسية الجسدية الأولية primary somatosensory (S1) cortex في دماغ الفأر. ويمكن تقسيم القشرة المخية في الفأر. كما في الثدييات الأخرى، إلى ست طبقات على أساس النسيج المميز لكل منها وتوزيع أنماط الخلايا العصبية بها، وترقيمها من I إلى VI من سطح الدماغ الخارجي الأقصى إلى الطبقة القشرية الداخلية وباستخراج كتل نسيجية تحوي القشرة المخية S1 للفأر بأكملها، تمكن «وولسي» و«فاندرلوس» من تحضير شرائح رقيقة متماسة تغطي النطاق القشري المخي بأكمله، ثم صبغ تلك المقاطع النسيجية للكشف عن وجود أكسيداز السييتوكروم، وهو إنزيم ميتوكوندري (مُتَقَدِّرِي) مرتبط بالنشاط الخلوي المكثف. ولقد أدهش «وولسي» و«فاندرلوس» ما اكتشفاه من احتواء الطبقة القشرية المخية IV على عناقيد متعددة متميزة من العصبونات الغنية بأكسيداز السييتوكروم، ومنظمة تنظيمًا جيد التخطيط من الصفوف والأعمدة وقد كونت آلاف من العصبونات المترابطة بإحكام كل عنقود برميلي الشكل¹، وهذا حث الباحثين على تسمية العنقود الواحد بالبرميل والمطرس (المادة البينخلوية) بالحقل البرميلي. والأكثر إثارة للدهشة أن هذا الحقل البرميلي كان يحدد خريطة جميلة، ولو أنها محرفة بعض الشيء، لخطم (مقدم فم وأنف) الفأر. وسرعان ما وُجد نسق حقل برميلي مماثل في القشرة المخية للجرد [انظر المؤطر في الصفحة المقابلة]، وكشف المزيد من الدراسات عن وجود مثل تلك الخرائط

نظرة إجمالية/ كود منبثق²

الطوبوغرافية في تراكيب تحت قشرية منها جذع الدماغ والمهاد حيث لُقبت العناقيد بالبرميلات وأشبه البراميل. ولقد أظهر بالفعل باحثون لاحقون أن تكديسات من هذه الخرائط الطوبوغرافية في كل واحدة من المحطات (التوصيلات) تحت القشرية بالجهاز الثلاثي التوائم تصل المستقبلات الحسية المحيطية الموجودة في أشعار وجوه الجردان بالقشرة المخية S1 على طول الطريق فيما بينهما

ويستخدم علماء الفزيولوجيا العصبية الحسية مصطلح «الحقل الاستقبالي»³ لتحديد مقدار الجلد الذي يتسبب عند تنبيهه في استجابة عصبون بإنتاج جهود فعل كهربائي (كمونات عمل). وبناء عليه كان التنبؤ الأكثر أهمية لنموذج الخط الموسوم في حالة الجهاز الحسي الجسدي للقوارض أن الحقل الاستقبالي أو الحقل الحيزي للعصبون الفردي الواقع في أحد هذه البراميل الثلاثية التوائم سيفتصر على شعرة شارب رئيسية واحدة.

ولكن بحلول أواخر ثمانينات القرن العشرين بدأت نتائج مناقضة تتحدى هذه الرؤية الخطية الصرفة⁴. فعلى سبيل المثال، سجل عالم الفزيولوجيا العصبية <M> أرمسترونك-جيمس⁵ [في جامعة لندن] حينذاك نشاط عصبونات فردية واقعة في عدة براميل قشرية مخية لجردان مخدرة. ومع استطاعته تحديد شعرة الشارب الرئيسية لمعظم هذه العصبونات القشرية المخية، أثبت أيضا أن العصبون الفردي كان قادرا على الاستجابة لانحراف أشعار الشارب المحيطة بتلك الشعرة الرئيسية.

لقد اقترح «أرمسترونك جيمس» في استنتاج شبه ابتداعي (شبه هرطقي)

بالنسبة إلى زمانه، أن الحقول الاستقبالية للعصبونات الفردية في القشرة المخية البرميلية للجرد لم تقتصر على أشعار أولية فردية، بل اشتملت الحقول الحيزية بدلا من ذلك على بضع أشعار محيطة تدفع عند انحرافها العصبونات إلى إحداث استجابات حسية أضعف وأبطأ، ولكن مع ذلك يعتقد بها. لقد كانت هذه الفكرة كافية لإحداث خلاف كبير في هذا المجال، ومع ذلك كانت مجرد بداية عقد انتقالي لفهم العلماء التكويد العصبي.

حوسبة مؤرعة⁶


إن التقنية التي استخدمها «أرمسترونك-جيمس» لتسجيل نشاط العصبونات الفردية (كل منها على حدة) في الجردان المخدرة، كانت هي تقريبا الطريقة الرسمية المقررة في عام 1989. وذلك عندما قرر واحد منا (وهو نيكوليليس) مع <K.J> شابين⁷ [الذي يعمل حاليا في جامعة الولاية بنيويورك في المركز الطبي التابع لها في القلب التجاري للمدينة] أن يطبقا طريقة جديدة للإصغاء، إلى النشاط الكهربائي لعدة عصبونات فردية في أن واحد.

في البداية، ركزنا على العصبونات الواقعة في أشباه البراميل بالنواة الجوانية (الإنسية) الخلفية البطنية ventral posterior medial nucleus (VPM)، وهي تركيب يوجد في المهاد ويعد المصدر الرئيسي للاتصالات العصبية الصاعدة إلى الحقول البرميلية⁸. في القشرة المخية الحسية الجسدية الأولية، أظهرت دراساتنا الأولى أن عصبونات النواة VPM أظهرت حقولا استقبالية واسعة جدا لأشعار شوارب متعددة وعلى غرار ما وجده «أرمسترونك-جيمس» في القشرة المخية، نتجت الاستجابات الأقوى والأسرع لعصبونات VPM من انحراف شعرة الشارب الرئيسية لكل عصبون منها محددة مركز حقله

Overview/ An Emerging Code (+)
Distributed Computing (+++)
somatosensory cortex (1)
barrel shaped cluster (2)
receptive field (3)
neat linear view (4)
barrel fields (4)

- إن العواصف من النبضات الكهربائية التي تكتسح الجهاز العصبي المركزي، تُترجم بطريقة أو باخرى إلى أفكار وانفعالات وأحاسيس. وقد قضى علماء الأعصاب عقودا من الزمان في محاولة حل شفرة هذه اللغة العصبية.
- لقد تصورت الفرضيات المبكرة بشأن الإدراك الحسي أن الإشارات تنتقل انتقالا خطيا صرفا على طول طرق عصبية غير مترابطة (منفصلة) فيما بين مستقبلات المنبهات ومراكز المعالجة العليا في الدماغ.
- لقد كشفت مراقبة مجموعات كبيرة من العصبونات في المسارات الحسية عن حقيقة أخرى بديلة، وهي أن المعلومات تُنشر في نسق الأنشطة الزمانية المكانية للمجموعات العصبية بأكملها.

لفترة زمنية طويلة، قام علماء الفزيولوجيا العصبية بدراسة الجهاز الثلاثي التوائم للجرذ كنموذج لاكتشاف كيف تُعالج المعلومات في الجهاز العصبي. ويمتد الجهاز الثلاثي التوائم، وهو عبارة عن شبكة عصبية تنقل المنبهات الحسية من الوجه، من مستقبلات حسية محيطية (مثل المستقبلات الميكانيكية المتجمعة عند قاعدة كل شعرة من أشعار الشارب) إلى الأعلى باتجاه جذع الدماغ وتركيبات الدماغ تحت القشرية، وأخيرا إلى القشرة المخية الحسية الجسدية الأولية. وبالفعل، بين علماء التشريح في سبعينات القرن العشرين أن الخرائط الفعلية لوجه الجرذ مدركة ومتصورة وثرثرية في المناطق الثلاثية التوائم في القشرة المخية [أرناد] وتحت القشرة المخية.



الحقل البرميلي القشري المخي^(*)

تشكل عناقيد برميلية الشكل - مؤلفة من عصبونات الحقل محتشدة بكثافة ومنظمة في تمثيل طوبوغرافي محرف بعض الشيء للوجه - حقلًا برميليًا في القشرة المخية الحسية الجسدية للجرذ. إن الصفوف [A - E] والأعمدة [5-1] من البراميل التي تعكس تنظيم أشعار الشارب في خمط (مقدم فم وأنف) الجرذ، تتيح للعلماء الرجوع والإشارة إلى برميل من البراميل أو شعرة الشارب الرئيسية المناظرة له من الموقع الخاص بهما على الشبكة.

للمعلومات المسبقة الواردة وقد تابعنا هذه النتائج وأعقبناها بتجارب أكثر تحداً من الناحية التقنية، تتضمن مراقبة نشاط عينات أكبر من العصبونات الفردية في محطات (توصيلات) متعددة من جهاز الجرذ الثلاثي التوائم، تقع في جذع الدماغ والمهاد والقشرة المخية وقد منحتنا تسجيلاتنا المتزامنة المتعددة المواقع والمتعددة المساري الكهربائية عينات لعصبونات فردية يصل عددها إلى 48 عصبونا لكل حيوان في أن واحد موزعة عبر عدد من التراكيب العصبية

A SENSORY NETWORK (*)
cortical barrel field (١)


عصبون ترشحزح وفقا للزمن التالي للمنبه. ويتعبير آخر، كنا لا نستطيع في الواقع أن نحدد مركز الحقل الاستقبالي لعصبون معين وحدوده إلا إذا عيّنا لحظة زمنية محددة إن هذا المظهر الزمني المكاني الديناميكي لاستجابات العصبونات قد أتاح الفرصة أيضا للخلايا أن تعيد تنظيم ردود أفعالها فوراً بعد أي تغير في تدفق المعلومات للمسببة من محيط الجسم. فعلى سبيل المثال، عندما قمنا بمجرد تخدير رقع صغيرة من جلد وجه الجرذ تمكنا من مشاهدة إعادة تنظيم تامة للحقول الاستقبالية للعصبونات VPM في غضون بضع ثوانٍ لتتلاءم مع النسق الجديد

الاستقبالي، في حين انطلقت استجابات أضعف وأبطأ من تنبيه الأشعار المحيطة. في الحقيقة، ازداد حجم الحقول الاستقبالية للعصبونات VPM الفردية ازديادا ملحوظا مع تناقص مستوى تخدير الجرذان حتى إفاقتها تماما في النهاية، حيث إنها شملت أحيانا معظم الأشعار الوجهية على الجانب نفسه من وجه الجرذ وإضافة إلى ذلك، لما كانت العصبونات VPM تستجيب لتنبيه الأشعار الوجهية المختلفة بعد فترات كمون أو تأخير مختلفة (وهي فترات فاصلة بين التنبيه والاستجابة)، فإن الحقل الحيزي للحقل الاستقبالي لكل


استجابات المجموعة الخلوية

يحدث تنبيه شعرة شارب فردية موجات من النشاط الكهربائي في عناقيد خلوية برميلية الشكل في جذع الدماغ (SPV و PrV) والمهاد (VPM) والقشرة المخية (S1).

القشرة المخية الحسية الجسدية
الأولية (S1)



النواة الجوانية (الإنسية) الخلفية
البطنية (VPM)



النواة الثلاثية التوائم
النخاعية (SPV)



النواة الثلاثية التوائم
الرئيسية (PrV)



مجموعة برميلية فردية

الزمن التالي للمنبه
(بالجزء من الألف من الثانية)

إن تنبيه أشعار الشوارب الفردية على وجه الجرذ يكشف عن شبكة معقدة من التفاعلات الموزعة^(١) عبر مجموعات من العصبونات وعلى مر الزمن. وهكذا يتم توكيد المعلومات الحسية الواردة من شعرة شارب واحدة في شسق الاستجابات الزمانية المكانية بواسطة عدد كبير من الخلايا الموجودة في كل مكان بالجهاز الثلاثي التوائم للحيوان.

استجابات المجموعة العصبونية

بدلاً من الاستجابة لشعرة شارب رئيسية واحدة فقط، يتفاعل 25 عصبوناً في أعمدة برميلية قشرية مخية مختلفة مع تنبيه أشعار شاربية مختلفة بأنماط استجابة متمايزة [أدناه]. بـصور كل صف النشاط الكهربائي لخلية فردية بعد تنبيه شعرة الشارب.



العصبونات القشرية المخية لتصنيف مواقع منبهات شعرة الشارب الفردية؛ ثم بمجرد أن بلغت الشبكات ANNs مستوى عالياً من الدقة، قام بإدخال مجموعة جديدة من البيانات، ثم بقياس مدى جودة إمكانية تنبؤ اللوغاريتمات بموقع شعرة الشارب المنبهة. وعندما تمت تغذية الشبكات ANNs بأنشطة العصبونات الفردية منعزلة كانت دقة تنبؤاتها منخفضة للغاية. ولكن عندما تمت تغذيتها بالاستجابات المجتمعة لمجموعات العصبونات الفردية، تمكنت اللوغاريتمات بسهولة من التنبؤ بالموقع الصحيح لمنبه شعرة الشارب من محاولة واحدة.

وفي الوقت نفسه، كانت مختبرات أخرى تحصل باستخدامها مجموعة متنوعة من الطرائق على بيانات تؤيد

CONVERGING SIGNALS (١)
reactions distributed (١)
population neural code (١)

حسية دقيقة وذات معنى عن البيئة المحيطة بالحيوان مباشرة إلا بضم أنشطة مجموعات كبيرة من العصبونات الفردية. ولاختيار هذه المشاهدة (الملاحظة) إلى مدى أبعد، حاول «كزنفر» [وهو طالب دراسات عليا في مختبرنا] في منتصف تسعينات القرن العشرين، «قراءة» الرسائل المكددة التي ترسلها مجموعات العصبونات الثلاثية التوائم في الحرز. وقد فعل ذلك بتغذية سلسلة من لوغاريتمات تمييز الشسق الصناعية (المعروفة بالشبكات العصبونية الصناعية (artificial neural networks (ANNs)) بأنشطة الكثير من العصبونات القشرية المخية التي تم الحصول عليها أثناء التنبيه الميكانيكي للعديد من أشعار الشارب الفردية. في البداية قام «كزنفر» بتدريب واحد من اللوغاريتمات على استخدام شسق الإثارة الزمانية المكانية لمجموعات كاملة من

المختلفة يصل إلى خمسة.

لقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها على الإطلاق أخذ عينات حيزية على نحو شامل من المسار الحسي للحيوان. وقد كانت النتيجة واضحة بقدر ما كانت مثيرة للدهول؛ فانحرافات شعرة الشارب الفردية في الحيوانات اليقظة أطلقت موجات معقدة من النشاط الكهربائي، انتشرت عبر عدة عناقيد برميلية الشكل داخل كل تركيب من التراكيب العصبية الواقعة على طول الجهاز الثلاثي التوائم (انظر المظفر في هذه الصفحة). لم يكن ما كنا نشاهده متناغماً على الإطلاق مع انتقال المعلومات على طول خطوط موسومة ساكنة منعزلة عن بعضها؛ وإنما أوحى لنا نتائجنا بدلاً من ذلك بالنموذج المعروف بالتمثيل الموزع أو بالكود العصبي المجموعي^(٢)، حيث لا يكون دماغ الجرذ قادراً على استخلاص معلومات

لن يتمكن الدماغ من استخلاص معلومات ذات مغزى إلا بضم أنشطة المجموعات العصبونية.

طنقات القشرة المخية للجرذ

العصبية بفعل تغيرات تحدث في أغشيتها الخلوية. ولكن «فانسيلو» وجدت أنه عندما تحدث الجردان تحركا من أي نوع لأشعار شواربها، تطلق عصبونات القشرية المخية والمهادية الدفعات العصبية على نحو أكثر أطرادا. استجابة لنبضة عصبية كهربائية فردية دون أي فترات تثبيط على الإطلاق.

لقد حثتها هذه الملاحظة على محاولة توصيل متتاليات من نبضتين كهربائيتين إلى العصب بدلا من متتاليات من نبضات فردية، وكانت النتيجة مذهلة. عندما كانت الجردان بقطرة ولكنها ساكنة ولا تحرك أشعار شواربها، كانت عصبونات القشرية المخية والمهادية تستطيع الاستجابة فقط للمنبه الأول من زوج المنبهات، في حين كان الآخر يُخجِب بالتثبيط التالي للإثارة. ولكن عندما كانت الجردان تحرك أشعار شواربها بنشاط، تمكنت عصبوناتها S1 و VPM من الاستجابة بشكل جيد جدا لكل من النبضتين الكهربائيتين، حتى عندما لم يكن يفصل بينهما إلا 25 ميكروثانية (25 جزءا من المليون من الثانية). إن الانهماك في سلوك تحريك أشعار الشوارب بخفة وسرعة قد غيّر بوضوح خواص العصبونات، وهذا أتاح للقشرة المخية والمهاد تمثيل متتالية من المنبهات للمسبة تمثيلا صحيحا.

وفي أثناء هذه الفترة الزمنية، بدأ «كروبا» بالنجاح في تدريب الجردان على أداء المهمة نفسها التي سوف تبرع في أدائها الجرذة إيش فيما بعد في غضون بضعة سنوات. لقد قدمت هذه الطريقة وسيلة جديدة لاختبار فيما إذا كانت استجابات العصبونات تختلف أيضا، عندما يصبح لمهمة التمييز للمسبة الشريط للحيوان مغزى ومتطلبات أكثر، أي أكثر شبيها بالحياة الحقيقية. مثل استخدامه شعْر وجهه ليقدر

Context Counts (+)

(+) feedback، أو الاسترجاع: التغذية الراجعة - التلقين

التردد

strict feedforward, labeled-line theory (T)

في لحظة زمنية مختلفة. لقد كانت نتائجا بالفعل بعيدة كل البعد عن نظرية الخط الموسوم ذي التغذية التقدمية المتزامنة^{١١} ولكن لا يزال الكثير من التنبؤات المشتقة من نموذجنا التقاربي الالتفاني اللاتزامني يتطلب اختبارات تجريبية مكثفة، وهذا قادنا إلى رحلة بحثية أخرى لعقد من الزمان نقوم فيها بتنبية أشعار شوارب الجردان بمجموعة من الوسائل لم يسبق تجربتها قط.


القرائن تؤخذ بعين الاعتبار^{١٢}

في عام 1998، قامت «فانسيلو» وهي طالبة دراسات عليا في مختبرنا بتصميم تقنية بارعة لقياس كيفية استجابة العصبونات S1 و VPM لمنبهات متشابهة في ظروف مختلفة في الجردان الحرة الحركة. لقد تمكنت «فانسيلو» - عن طريق زرع مسرى كهربائي على هيئة قيد بالغ الصغر حول العصب تحت الحجاج، وهو فرع العصب الثلاثي التوائم الوارد من الأشعار الوجهية - من توصيل متتاليات دقيقة من النبضات الكهربائية إلى العصب في الوقت نفسه الذي تقاس فيه استجابات العصبونات S1 و VPM. وبعد ذلك قامت بقياس كيف تغيرت تلك الاستجابات العصبونية أثناء مختلف السلوكيات التي تظهر على الجردان وهي تتجول تجوالها الروتيني اليومي وكشفت هذه التجارب أنه عندما تحرك الجردان أشعار شواربها تختلف جدا الطريقة التي تستجيب بها عصبونات القشرية المخية والمهادية للمنبهات للمسبة عن طريقة استجابتها عندما تكون هذه الحيوانات نفسها بقطرة أو مخدرة.

وفي الجردان الساكنة، كانت هذه العصبونات تستجيب للتنبية على نحو تقليدي بمتتالية قصيرة من جهود الفعل الكهربائي (كمونات العمل)، تعقبها فترة زمنية طويلة الأمد يُثبِّط فيها إطلاقها للدفعات (الدقات)

مسارات الإشارات الثلاثية التوائم

يتم تعديل الإشارات للمسبة الواردة من الشعرة الشاربية بواسطة إشارات عصبية تنتقل على طول روابط جانبية ونازلة بين تراكيب الدماغ.



نتائجنا الكهربائية الفيزيولوجية. ولقد واصل «كزنفر» مع «د. كروبا» [الحاصل على زمالة ما بعد الدكتوراه] جهودهما ليثبتا أول مرة أن إحصار النشاط العصبوني في القشرة المخية S1 يؤثر في استجابات العصبونات VPM في المهاد، وهذا يوحي بأن إشارات الارتجاع^{١٣} النازلة من القشرة المخية إلى النواة VPM يمكن أن تؤدي أيضا دورا مهما في تعديل المعلومات الصاعدة من جذع الدماغ. وقد أدت هذه النتائج مع مثيلاتها إلى اقتراح مجموعتنا البحثية أن الاستجابات للمسبة للأشعار الشواربية المتعددة ذات الديناميكية العالية المشاهدة في كل من العصبونات S1 و VPM كان يحددها عدد وافر من الإشارات المعدلة الصاعدة والهابطة والمتنقلة جانبيا والتي تتقارب للالتقاء عند كل واحد من هذه العصبونات

فتحة ضيقة




فتحة واسعة



في هذه التجربة، استخدم الجرد أشعار شارببيه لتحسس الفتحة المكونة بواسطة قضيبين متحركين يطوقان نتوءاً أنفياً (nose poke)، ثم اتخذ الحيوان قراره بشأن تقدير حجم الفتحة بالبحث عن جائزة في غرفة خارجية في واحدة من محطتين كان قد تدرب لربطهما بـ «ضيقة» أو «واسعة».

إن القدرة على التنبؤ بسلوك الجرد تثبت أن لوغاريتم تعرف النسق يستطيع أن يحل شفرة المعلومات الحسية المكونة في نشاط الحيوان العصبي، فعندما تُغذى (تلقم) شبكة عصبية صناعية (ANN) بتسجيلات من أدمغة الجرذان المشتركة في التجربة المبينة في اليسار، فإنها يمكن أن تحدد فيما إذا كان الحيوان سيميز اتساع الفتحة تمييزاً صحيحاً أو لا. وكما هو متوقع، كان أداء الشبكة ANN (الرسم البياني) عند مستوى الصدفة قبل اقتحام الجرذان لحزمة الضوء عند مدخل الحجرة التجريبية [0 ثانية]. وبعد أن بدأت الحيوانات تستكشف الفتحة بواسطة أشعار شواربيها [0.1 إلى 0.25 ثانية]، ارتفعت دقة تنبؤ اللوغاريتم بسرعة.



إن عضوية عصبون فردي في تلك المجموعات مرنة وسلسة على الأرجح ويمكن أن تتغير من لحظة إلى أخرى، كما يستطيع عصبون واحد أن يشترك في الكثير من هذه المجموعات في آن واحد. وتستطيع كذلك الخصائص الاستثنائية للخلايا الفردية أن تتغير باستمرار نتيجة لحالة المحيط الحسي والتجارب الإدراكية السابقة للحيوان وديناميكية دماغه الداخلية، سواء كانت تتخير العينات من البيئة المحيطة به إيجابياً أو سلبياً، وتوقعات الحيوان للمستقبل.

ونحن البشر نشترك مع الجرذان في الملامح الأساسية نفسها لبنية الدماغ وفزيولوجيته وبيولوجية خلاياه، ونجتاز مثلها محيطنا الحسي بمساعدة شبكات عصبية معقدة، تُولّد تصورات متعددة عن العالم المحيط بنا وتشكل الإدراك من لحظة إلى أخرى بمقياس دقيق وفقاً للتغير في الانتباه والدوافع والحالة المزاجية وتأخذ في الحساب تجاربنا الحسية السابقة.

READING THE MIND OF A RAT (١٠)
Dynamic Network (٤٤)

والارتجاعية في داخل الجهاز الحسي للحيوان. لقد تمكنت الشبكة ANN بفضل اتحاد أنشطة نحو 50 عصبوناً قشرياً مخياً من التنبؤ بدقة بالغة بقدرة الجرذان على تحديد اتساع الفتحة أو ضيقها تحديداً صحيحاً في أي تجربة.

شبكة ديناميكية^(٢)

إن قدرتنا على التنبؤ بسلوك الحيوان من أنماط الاستثارة العصبية وحدها قد أوحى لنا بأننا على المسار الصحيح نحو اكتشاف ترجمة لغة الجهاز العصبي. لقد كان جلياً تماماً أن دماغ الثدييات يعتمد على الأرجح على مجموعات عصبية واسعة الانتشار، تكونها على نحو ديناميكي خلايا متوافقة تماماً، لتذهب الحيوانات قدراتها الإدراكية الشديدة الحساسية بدلاً من الاعتماد كليةً على نشاط عصبونات فردية متخصصة أو حتى أعمدة خطية من وحدات برميلية الشكل.

قطر ثقب دائم التغير.

لقد أكدت نتائج «كروبا» ملاحظات «فانسيلو» السابقة ووسعت مداها. فعندما استخدمت الحيوانات أشعار شواربيها استخداماً نشيطاً لتقدير قطر الفتحة، أظهرت نسبة مئوية كبيرة من عصبوناتها VPM و S1 استجابات قوية طويلة الأمد بلا تثبيط إضافة إلى ذلك، بدأت عصبونات متعددة في القشرة المخية تغير بشكل واضح معدلات إطلاقها للدفعات العصبية قبل أن تلمس أشعار شوارب الجرذان حافات القضبان بكثير. وهذا يوحي بأن حالة الجرذان السلوكية كانت تؤثر بالفعل في خواص العصبونات مُعدّة إياها للمهمة العصبية الحاسمة التي أمامها.

لقد قام «كروبا» بتغذية شبكة عصبية صناعية بأنماط الإثارة الزمانية المكائنية لمجموعات العصبونات التي تم تسجيلها أثناء تنفيذ هذه المهمة، وذلك كبرهان نهائي يثبت أن هذه التأثيرات كانت أيضاً جزءاً من المعلومات المكونة للتغذية التقديمية.



كيف تستطيع أدمغتنا أن تمنح كل واحد منا هذا الوجود الفريد الذي يتعذر نسخه؟

أمرًا ممكنًا، وهذا أتاح لنا اليوم الإصغاء إلى نشاط ما يقرب من 500 عصبون فردي لفترات زمنية طويلة في الحيوان اليقظ المنشغل بممارسة سلوكيات طبيعية ولا عجب أن مراقبة العصبونات كل على حدة قد تكون هي التي ساعدت على تبني وجهة النظر الخطية المركزية العصبون للاتصال العصبي. فذلك الطرائق البدائية القديمة يمكن تشبيهها بالاستماع لصوت واحد فقط أثناء تادية مسرحية موسيقية معقدة (أوبرا). فمهما كان المغني المنفرد موهوبا، فسيجد المرء صعوبة في متابعة المسرحية. ولكن عندما تتجمع العصبونات في مجموعات عصبية كبيرة موزعة على نطاق واسع، فستمنحنا التأثيرات الجماعية لهذه العصبونات أوصافا بالغة الدقة عن البيئة المحيطة بنا وهكذا كلما فر جرد من قط مهاجم، كانت نجاته على الأرجح بفضل سمفونية النبضات الكهربائية التي تُعزف في رأسه. ■

(١) robot arm [انظر "Controlling Robots with the Mind" by Miguel A. L. Nicolelis - John K. Chapin, Scientific American, October 2002
(٢) tactile feedback
(٣) collective interactions

المؤلفان

Miguel A. L. Nicolelis - Sidarta Ribeiro

لقد قاما باستقصاء التكويد العصبي معا عندما كان «جربيريو» زميلا لنا بعد الدكتوراه في مختبر «نيكوليليس» بجامعة ديوك. قام «نيكوليليس» (بصفته المدير المساعد لمركز ديوك للهندسة العصبية) و«W A» (بصفته «مهندس الأعصاب») بابتداء استخدام أغراس دماغية متعددة المساري الكهربائية لاستقراق السمع لأشعة اعداد كبيرة من العصبونات وتطوير طرائق حسابية لترجمة النماذج ونمطيتها. ويشترك كل من «نيكوليليس» و«جربيريو» في ولعهما بنشر فوائد ووسائل علم الأعصاب المتقدم والمطور. فهما مؤسسان مساعدا لعهد ناتال العالمي لعلم الأعصاب في شمال شرق البرازيل و«جربيريو» هو المدير العلمي لمركز سيزار تيمولاريا للأبحاث والتعليم، وهو قسم بالعهدة يخطط أساسا لتجميع مؤسسة تدريب وأبحاث من الدرجة العالمية في علم الأعصاب. ومؤسسات للتعليم المدرسي والصحة العقلية والرياضة، ومنحف العلوم، ومحمية طبيعية. لتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المنطقة النائية من البرازيل.

مراجع للاستزادة

Brain-Machine Interfaces to Restore Motor Function and Probe Neural Circuits. Miguel A. L. Nicolelis in *Nature Reviews Neuroscience*, Vol. 4, pages 417-422; May 2003.

Layer-Specific Somatosensory Cortical Activation during Active Tactile Discrimination. David J. Krupa et al. in *Science*, Vol. 304, pages 1989-1992; June 25, 2004.

Global Forebrain Dynamics Predict Rat Behavioral States and Their Transitions. Damien Gervasoni, Shih-Chieh Lin, Sidarta Ribeiro, Ernesto S. Soares, Janaina Pantoja and Miguel A. L. Nicolelis in *Journal of Neuroscience*, Vol. 24, No. 49, pages 11137-11147; December 8, 2004.

International Institute of Neuroscience of Natal: www.natalneuroscience.com

Scientific American, December 2006

ولكن كيف يمكن أن نتحقق جميع هذه النواتج الثانوية من التفريغات الكهربائية البالغة الصغر لبلايين العصبونات؟ كيف يمكن أن تجعلنا أدمغتنا نتصرف كلنا بمثل هذا التشابه في بعض الأوقات، ومع ذلك تمنح كل واحد منا وجودا فريدا يتعذر نسخه وسوف يتفق معظم علماء الأعصاب على أن التفاصيل المعقدة لهذا اللغز سيظل يكتنفها غموض عميق لبعض الوقت.

ومع ذلك، أتاح لنا بالفعل عمل مجموعتنا البحثية - الرامي إلى حل شفرة الكود العصبي من وضع فهمنا السطحي لهذه اللغة قيد الاستعمال العملي - قراءة أنماط الاستثارة العصبية من القشرة المخية الحركية للفرد واستخدام لوحات الحاسوب لترجمة تلك المعلومات في الزمن الفعلي إلى تعليمات لتحريك ذراع إنسالة. إن أمنا هو أننا يوما ما، قريبا، سنبرع أيضا في تركيب واستعمال الكلمات والعبارات بالقدر الكافي لمخاطبة الدماغ وسوف يتيح لنا ذلك على سبيل المثال صنع ذراع بشرية صناعية بديلة مُحَمَّلة بأجهزة إحساس لإرسال ارتجاع لمسي إلى القشرة المخية الحسية الجسدية للشخص الذي يستعملها.

ومع أن حل شفرة الكود العصبي مازال بعيد المنال، فبإمكاننا حاليا فهم بضعة مقاطع لفظية واستخدامها، علما بأن ذلك لم يكن أمرا واقعا منذ 10 سنوات فقط. إن واحدا من الأسباب المهمة التي تمكننا من استخدام هذه اللغة بالفعل منذ الآن هو تكيفها المتواصل فيها والذي ينشأ بدوره عن خواص الاتصال المتشابكة خلال المجموعات العصبية. وحتى لو سقطت بضع كلمات، تستطيع الرسالة العبور والوصول بالطريقة نفسها تقريبا التي تستطيع بها شبكة تقانة التعويض السريع عن فقدان بضع عقد. لقد كان لتطور التجهيزات والمعدات

استخدام الهيدروجين كوقود للسيارات^(١)

يعمل الباحثون اليوم على إيجاد سبل تتيح للسيارات التي تعمل بخلايا
الوقود التزود بالهيدروجين الذي تحتاج إليه لقطع مسافات طويلة.

S. سانابال - D. بينروفيتش - G. توماس

يصعب تخزين كمية كافية من
غاز الهيدروجين بالسيارات في
خزان بحجم خزان الكازولين

GASSING WITH HYDROGEN (١)



أدهش «شارل» العالم حين خلق في سماء باريس على ارتفاع 3000 قدم فوق سطح الأرض، في يوم من أواخر أيام صيف سنة 1783، في منطاد صنعه من قماش حريري مغلف ببطقة من المطاط ومعبأ بغاز الهيدروجين، الأخف من الهواء. وقد عمد القرويون الذين أصابهم الذعر من هذا التحليق إلى تحطيم المنطاد عند عودته إلى الأرض. لكن «شارل» اختط بعمله هذا نهجا لا يزال الباحثون - بعد مرور قرنين من الزمن، يعملون في إطاره - يتجلى هذا النهج في استخدام طاقة غاز الهيدروجين، العنصر الأخف في الطبيعة، كوقود لوسائل النقل.

بعد إحراق الهيدروجين أو استخدامه في خلايا الوقود fuel cells التي تشغل محركات سيارات المستقبل، خيارا مغريا لأسباب عديدة، فهو يحضّر محليا من مجموعة كبيرة من خامات كيميائية ومن مصادر طاقة أخرى (مثل مصادر الطاقة المتجددة ومن مصادر نووية وكذلك من مصادر الوقود الأحفوري fossil fuel) وهو غاز نظيف وغير سام يمكن أن يشكل مصدرا لطاقة للآلات المتعددة الأنواع، وعند احتراقه لا يطلق أي ملوثات بيئية، مثل غاز ثاني أكسيد الكربون المكون الفعّال في غازات الدفيئة. وحين حمله في خلايا الوقود التي تشبه في تركيبها البطاريات، يؤمن الهيدروجين، عند احتراقه بالأكسجين، الطاقة اللازمة لتشغيل محركات السيارات التي تعمل بالكهرباء، ناشرا الحرارة ومخلقا الماء، فقط كمنتج ثانوي [انظر «نحو سيارات تعمل بالهيدروجين»، العلوم، العدد 19 (2005)، ص 16]. وقد يتعدى مردود وفعالية السيارات التي تعمل بخلايا الوقود ضعفي مردود السيارات العاملة حاليا: كما قد يؤدي استخدام الهيدروجين إلى تقديم المساعدة والعون لحل مسائل وأمور اجتماعية وبيئية مثل تلوث الهواء، وما يسببه من مخاطر على الصحة العامة وتغيرات المناخ العالمي والاعتماد على النفط المستورد.

ومع جميع هذه التوقعات الإيجابية فإن عقبات أساسية تعترض استخدام غاز الهيدروجين كوقود للسيارات. إن الطاقة التي تحملها كمية ما منه (1 كع مثلا) تزيد على ثلاثة أضعاف الطاقة التي تحملها الكمية ذاتها من الكازولين؛ لكن يتعدّر علينا اليوم، بل يستحيل، حمل غاز الهيدروجين وتخزينه في السيارات بالسهولة والإحكام اللذين يُحمل بهما الكازولين. ويعدّ أمر هذا الحمل والتخزين من أشد الأمور التقنية تعقيدا وأكثرها مدعاة للإثارة والتحدّي، إذ كيف يمكن أن نحمل السيارة، بصورة آمنة ومحكمة، ما يكفي من غاز الهيدروجين لتحقيق مستوى الأداء، ولقطع المسافة المطلوبين، وليست مهمة الباحثين في هذا المجال يسيرة، إذ إن عليهم إيجاد الحلول المثلى goldilocks التي تؤمن

نظرة إجمالية/ تخزين الهيدروجين

- من كُبرى العقبات التي تعترض تزويد سيارات المستقبل التي تعمل بخلايا الوقود، تحميلها كمية من غاز الهيدروجين تكفي لسيرها المسافة الدنيا التي يطلبها المستهلكون والمقدّرة بنحو 300 ميل.
- غالبا ما يُخزّن الهيدروجين في درجات الحرارة الاعتيادية على شكل غاز شديد الانضغاط في خزانات تتحمل هذا الضغط العالي، إلا أنها لا تتسع لحمل ما يكفي منه؛ وبالمقابل فإن نظم تخزين الهيدروجين السائل التي تحتاج إلى درجات حرارة شديدة الانخفاض، تعاني بدورها عقبات كبيرة.
- يجري حاليا تطوير تقانات تخزين بديلة، تحقق للهيدروجين كثافات مرتفعة؛ إلا أن أبا منها لم يثبت جدارته حتى الآن في التغلب على العقبات القائمة.

ضبط عمليات التخزين وأمانها، وتأمين الوسيلة التي تتبع حمل ما يكفي من الهيدروجين لقطع المسافة الدنيا المقبولة في يومنا وهي 300 ميل في خزان وفود لا يشكل حجمه مصدر إزعاج لركاب السيارة ولمكان الأمتعة والحقائب فيها، وعليهم كذلك إيجاد الوسائل التي تتيح تحرر الوقود الغازي في درجات الحرارة الاعتيادية وانطلاقه بمعدلات تدفق تحقق للسيارات التسارع المطلوب على الطرق السريعة. كما تتيح إمكانية إعادة ملء الخزان في دقائق قليلة وبأسعار معقولة. علما بأن تقنيات تخزين وقود الهيدروجين الغازي ما زالت حتى يومنا هذا قاصرة وبعبدة جدا عن تحقيق هذه الأهداف.

لذلك يبذل الباحثون العاملون في صناعة السيارات، في كافة القطاعات الحكومية والأكاديمية ومراكز الأبحاث، في جميع أرجاء العالم جهودا كبيرة لتدارك هذا القصور والتغلب عليه. كما أن الاتفاقية التي وقعتها الوكالة الدولية للطاقة سنة 1977 حول استخدام الهيدروجين تضم اليوم أكبر مجموعة دولية تعالج قضايا تخزين الهيدروجين، حيث يعمل فيها أكثر من 35 باحثا في ثلاثة عشر بلدا، كما أن الشراكة العالمية لاقتصاد الهيدروجين التي تشكلت في سنة 2003، تضم اليوم 17 حكومة التزمت كلها بدعم تقانات استخدام الهيدروجين وخلايا الوقود كما وضعت وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2005 مشروعا وطنيا لتخزين الهيدروجين يشارك فيه ثلاثة مراكز أبحاث متميزة والعديد من الصناعات والجامعات ومختبرات الأبحاث الفدرالية في مجالات أبحاث أساسية وتطبيقية. وقد قدّم هذا المشروع في عام 2006 أكثر من 30 مليون دولار لتمويل نحو 80 مشروع بحث.

عوائق البنى التحتية

يعد الحجم الكبير للمواضيع الذي تطرحه مسألة خلايا الوقود الهيدروجيني أحد العوائق التي تحول دون تبني هذه الخلايا على نطاق واسع في السيارات والشاحنات، فالناقلات العاملة في الولايات المتحدة وحدها تستهلك نحو 383 مليون كالون من الكازولين في اليوم (أي ما مقداره 140 بليون كالون في السنة)، وهو ما يشكل نحو ثلثي الاستهلاك القومي من النفط، الذي تستورد أكثر من نصفه من بلاد تقع في ما وراء البحار. لذلك تبدو الحاجة واضحة إلى استثمار مبالغ طائلة لتحويل صناعة السيارات في الولايات المتحدة إلى صناعة سيارات تعمل بخلايا الوقود، وكذلك لتحويل شبكة مصافي تكرير النفط ومحطات توزيع مشتقاته المنتشرة في جميع أرجاء البلاد، إلى محطات يتم فيها التعامل مع كميات كبيرة من الهيدروجين. كما أن على السيارات التي تعمل بخلايا الوقود أن تكون قادرة على منافسة السيارات الحالية من حيث رخص ثمنها وطول عمرها وجودة أدائها وعليها أيضا تلبية متطلبات الأمان اللازمة والتغلب على الموقف السلبي للجمهور تجاهها، الذي لم تغب عن ذهنه ذكرى مأساة منطاد airship هندنبرك في سنة 1937، التي لا يزال الناس يعتقدون أن غاز الهيدروجين مسؤول عنها. على الرغم من توفر العديد من الأدلة المؤثقة التي تؤكد أن مسؤولية اشتعال الحريق في المنطاد تقع على طبيعة سطحه الخارجي القابل للاشتعال.

وترجع صعوبة تخزين كمية كافية من الهيدروجين في السيارة إلى طبيعة هذه المادة، فالهيدروجين، في درجة الحرارة الاعتيادية



سوف تقدم محطات تزويد السيارات بغاز الهيدروجين في المستقبل خدماتها باستخدام أحد نظم التخزين التي يجري تطويرها في الوقت الحاضر.

غاز الهيدروجين، وأخيرا فإن على نظام التخزين أن يكون قادرا على إطلاق الهيدروجين بمعدل يكفي ليكون أداء مجموع خلية الوقود والمحرك الكهربائي قادرا على تأمين الطاقة والتسارع اللذين يتوقعهما السائق

تخزين الهيدروجين⁽¹⁾

يجري تخزين الهيدروجين اليوم في معظم نماذج السيارات العاملة بخلايا الوقود، التي يبلغ عددها بضع مئات، في أسطوانات تتحمل ضغوطا مرتفعة كتلك المستخدمة للغطس تحت الماء. وقد سمح التطور التقني الذي لحق بصناعة الخيوط الجراحية وبصناعةلياف الكربون، بصنع خزانات شديدة المتانة وخفيفة الوزن يمكن حمل الهيدروجين فيها تحت ضغط يراوح بين 5000 و 10 000 باوند/بوصة مربعة "psi" (350 إلى 500 ضغط جوي) (انظر المظهر في الصفحة 22) إلا أن زيادة الضغط المطبق على الخزان لا تعني بالضرورة زيادة كثافة الهيدروجين فيه على نحو يتناسب وتلك الزيادة، فأفضل كثافة طاقة تم تحقيقها في خزانات بلغت قيمة الضغط المطبق عليها 10 000 باوند/بوصة مربعة (وهي ما يقابل تركيزا للهيدروجين مقداره 39 غرام/لتر) تبلغ نحو 15% من طاقة الكازولين الذي يحمله الحجم ذاته وتحمل خزانات الضغط العالي حاليا نحو 3.5% إلى 4.5% من وزنها هيدروجينا. وقد صنعت شركة فورد مؤخرا نموذج سيارة رياضية تعمل بمحرك هجين⁽²⁾ hybrid يتم فيه تخزين 4.5 كغ من وقود الهيدروجين في خزان تحت ضغط مقداره 5000 باوند/بوصة مربعة، وتبلغ المسافة العظمى التي تقطعها السيارة بهذا الوقود 200 ميل.

تتقبل وسائط النقل الكبيرة، مثل الباصات والشاحنات وسواها لكبر حجمها، خزانات الضغط العالي التي يتم فيها تخزين كميات كافية من الهيدروجين، في حين لا تستطيع سيارات الركاب حمل مثل هذه الخزانات، كما أن تكلفة هذه الأخيرة تزيد بأكثر من عشرة أضعاف على تكلفة الخزانات المستخدمة حاليا في السيارات.

يمكن تحسين كثافة الهيدروجين بالطاقة بتخزينه مميّعا، حيث يتم احتواء أكبر قدر منه في الحجم المحدد لأي خيار محتمل، والهيدروجين

(1) Containing Hydrogen (+)

(2) رطل إنكليزي لكل بوصة مربعة

(3) وهو محرك يعمل بالكازولين كما يعمل بخلايا الوقود

وتحت الضغط الجوي (الذي تبلغ قيمته 14.5 باوند/بوصة مربعة، "psi") يكون على شكل غاز تبلغ كثافته الطاقةية 1/3000 من كثافة الكازولين الطاقةية، وهذا يعني أن مل، خزان سيارة اعتيادية سعته 20 غالونا بهذا الغاز تحت ضغط جوي واحد، يجعلها تسير مسافة 300 قدم فقط؛ لذلك يعمل المهندسون، بغية تحسين أداء الهيدروجين، على زيادة كثافته الطاقةية في جميع أنظمة التخزين التي يعملون عليها.

يُعدّ التوصل إلى جعل السيارات العاملة بوقود الهيدروجين تقطع المسافة الدنيا المقدرة بنحو 300 ميل، أحد الأهداف العملياتية الأساسية التي تسعى الجهود المشتركة الحكومية والصناعية إلى بلوغها من خلال تطوير تقنيات متطورة لسيارات المستقبل. ويعتمد المهندسون لذلك طريقة مفيدة في حساباتهم مفادها أن كالونا واحدا من الكازولين، يعادل - من منظور طاقي - 1 كغ (2.2 باوند من الهيدروجين). وتحتاج السيارات العادية الحالية إلى نحو 20 كالونا من الكازولين لقطع مسافة 300 ميل، وهذا يعني أن سيارة نموذجية تعمل بخلايا الوقود سوف تحتاج إلى نحو 8 كغ من الهيدروجين (بسبب مردوده العملياتية الأعلى) وقد تحتاج سيارات أخرى، تبعاً لنوعها وقياسها، إلى أكثر أو أقل من ذلك. وبيّنت التجارب المجراة على نحو 60 نموذجا من خلايا الوقود التي طورها العديد من الشركات المصنّعة للسيارات أن المسافة التي تقطعها سيارات الخلايا تراوح ما بين 100 و 190 ميلا.

وإن نجد السعي نحو الوصول إلى هدف عملي قد يمكن بلوغه في عام 2010 (حيث تتوقع بعض الشركات رؤية أول سيارات تعمل بخلايا الوقود تسير على الطرقات)، يقارن الباحثون أداء تقانات تخزين مختلفة تسعى إلى حمل «علامة» bench mark 6% وزنا، وهو ما يعني نظام تخزين يحوي 6% من وزنه هيدروجينا، بحيث يمكن تخزين 6 كغ من الهيدروجين في نظام تخزين يزن 100 كغ، وهو قياس ملائم للسيارات. وعلى الرغم من صغر ما تبدو عليه هذه النسبة فإن الوصول إليها أمر عسير جدا، إذ إن أفضل ما يمكن تحقيقه اليوم، باستخدام خزانات تعمل تحت ضغوط منخفضة نسبيا، لا يصل إلى 2%، كما أن تصنيع نظم تخزين تقارب في حجمها حجم خزان الوقود في سيارة اعتيادية تعمل بالكازولين، قد يكون أكثر صعوبة، لأن جزءا كبيرا من الحيز المخصص له سوف يُشغل بالخزان والصمامات والأنابيب والمنظّمات والمحسّنات وتدابير العزل الحراري وأمر أخرى يتطلبها حمل 6 كغ من



طبيعة تجهيزات الاحتواء والعزل فيها (انظر المؤطر في الصفحة 23) إلا أن هناك عقبات كثيرة أمام استخدام الهيدروجين المميع أولاها أن درجة غليانه الشديدة الانخفاض تقتضي تأمين تجهيزات تبريد شديدة الفعالية واتخاذ إجراءات احتياطية لضمان تدبره كما يجب عزل خزاناته بصورة محكمة ومتقنة وأخيرا فإن هذا التميع يحتاج إلى


مثل أي غاز آخر، يتكاثف عند تبريده في درجة حرارة شديدة الانخفاض متحولاً إلى الحالة السائلة، ويجري ذلك في درجة الحرارة -253°C وتحت الضغط الجوي العادي وتبلغ كثافة الهيدروجين السائل 71 غرام/لتر، وهو ما يعادل 30% من كثافة الغازولين الطاقة. أما كثافة الهيدروجين الوزنية التي يمكن تحقيقها في نظم التخزين فتتوقف على

التحدي أمام عمليات التخزين


2015 لتحقيق أداء أفضل، إلى تلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من انماط السيارات المتوفرة حينها. تأخذ القيم المدونة أدناه بالاعتبار التجهيزات اللازمة لتشغيل كل واحد من الأنظمة المختلفة: فالكثافة الحجمية للهيدروجين السائل، مأخوذاً لوحده، تبلغ 71 غرام/لتر، وهي تنخفض إلى نحو 40 غرام/لتر عند أخذ الخزان وملحقاته بالاعتبار ولا تظهر على الشكل البيانات الخاصة بالمواد التي تمتز الهيدروجين (انظر المؤطر في الصفحة 25) التي ما زالت في مراحل مبكرة من تطويرها ولا تتوفر أي بيانات عن سعتها أو عن تكلفتها

يجب أن يحمل نظام تخزين وقود الهيدروجين ما يكفي منه لجعل السيارة تسير مسافة 300 ميل على الأقل، ويجب أيضاً أن يكون مدمجاً، خفيف الوزن، يسهل تركيبه على السيارة. ويتطلع الباحثون إلى التوصل في سنة 2010 إلى نظام تخزين يحوي 6% من وزنه هيدروجيناً. ويحمل 45 غراماً من الهيدروجين في اللتر قد يلبي هذا النظام (الممثل بالهدف الدائري في الشكل الأيسر) حاجة الجيل الأول من السيارات العاملة بخلایا الوقود. علماً بأن أيًا من الخيارات المتاحة في الوقت الحاضر لا يسمح ببلوغ هذا الهدف وسوف تكون هناك حاجة في عام

سعات أنظمة تخزين الهيدروجين



التكلفة التقديرية



projected system (٢)

degree celsius (١)

The storage Challenge (٣)

الحاضر إلى إيجاد مواد يمكنها تحقيق هذا الغرض.

ويركز بعض الباحثين جهودهم على صنف من بعض المواد المعروفة باسم «هيدريدات الفلزات metal hydrides العكوسة»، تم اكتشافها بمحض المصادفة في مختبرات شركة فيليبس بهولندا سنة 1969، حين لوحظ أن سبيكة مصنوعة من فلزي الساماريوم والكوبالت samarium-cobalt تمتص غاز الهيدروجين عند وضعها في جو مضغوط منه، كما يمتص الإسفنج الماء. وعند إبعاد هذا الضغط المرتفع يتحرر الهيدروجين من السبيكة، وهذا يدل على أن له تأثير امتصاص عكوسا.

وما لبثت أبحاث مكثفة أخرى أن لحقت بخطى هذا الاكتشاف، فكان «د. رايلي» [في مختبر بروك هافن الوطني] و«د. ساندرلو» [في مركز إنكو للأبحاث والتطوير بولاية نيويورك] رائدين في تطوير سبائك من هيدريدات ذات قدرة ممتازة على امتصاص الهيدروجين. وكان عملهم المبكر هذا الأساس الذي قامت عليه صناعة بطاريات هيدريدات النيكل الواسعة الانتشار اليوم. والتي بلغت كثافة الهيدروجين فيها قيمة عالية جدا تزيد بنحو 150% على ما هي في الهيدروجين السائل، وحيث تتقارب ذرات الهيدروجين فيما بينها إلى حد كبير بسبب حشرها بين ذرات الفلز في شبكته البلورية crystal lattice [انظر المؤطر العلوي في الصفحة 24]

تمتلك هيدريدات الفلزات العديد من الخصائص التي تجعلها تلبي بصورة جيدة متطلبات الاستخدام في السيارات، فهي تؤمن كثافة هيدروجينية أعلى مما يؤمنه الهيدروجين السائل وتحت ضغوط منخفضة نسبيا تراوح بين 10 و 100 ضغط جوي. كما أنها ثابتة بطبيعتها بحيث لا يحتاج حفظها وتخزينها إلى بذل أي طاقة إضافية، مع حاجتها إلى طاقة حرارية لإطلاق الغاز الذي تخزنه، أما نقطة ضعفها، فنكمن في كبر كتلتها، حيث يعد وزنها عائقا أمام تخزينها في السيارات. وقد توصل الباحثون في مجال الهيدريدات الفلزية في الوقت الحاضر إلى تحقيق سعة هيدروجينية فيها حدًا أقصى 2% من وزنها الكلي، وهذا يعني الحاجة إلى نظام تخزين يزن 1000 باوند (ويسمح للعربة بقطع مسافة 300 ميل)، وهو رقم كبير جدا بالنسبة إلى السيارات العاملة في الوقت الحاضر والتي تزن نحو 3000 باوند.

تركز دراسات هيدريدات الفلزات في الوقت الحاضر على مواد تحوي بطبيعتها نسبة مرتفعة من الهيدروجين، حيث يصار إلى تعديلها على نحو يتيح لها تلبية متطلبات أنظمة تخزين هيدروجين تعمل في درجات حرارة قريبة من الدرجة 100°C، وتحت ضغط يراوح بين 10 و 100 جو، ويجعلها تطلق هيدروجينها بسرعات تحقق التسارع الذي تتطلبه السيارات السريعة هذا ولأن الكثير من هذه المواد العالية المحتوى من الهيدروجين ثابتة إلى حد بعيد، فهي تحتاج لتسخينها إلى درجات حرارة مرتفعة نسبيا لإطلاق هيدروجينها. فهيدريد المكنيزيوم مثلا، الذي يحوي 7.6% من وزنه هيدروجينا. يطلق غازه عند نحو الدرجة 300°C وإذا أردنا الاستفادة من الطاقة الحرارية الضائعة التي تحملها عوادم خلايا الوقود، التي تبلغ درجة حرارتها نحو 800°C، لإطلاق عملية تحرير الهيدروجين من هيدريد المكنيزيوم، وجب السعي إلى خفض درجة حرارة الإطلاق.

Chemical Compaction (**)
atmospheres (2)

COMPRESSED HYDROGEN (4)
Achilles' heel (1)

هيدروجين مضغوط

كثافة التخزين



هيدروجين

أسطوانتان متينة وخفيفة الوزن، تتحمل ضغوطا عالية، مثل أسطوانتان الغواصين، يعبأ فيها الغاز المضغوط تحت ضغط يراوح بين 5000 و 10 000 باوند/ بوصة مربعة (psi).



الوضع الحالي

متوفرة

الإيجابيات السلبية


خفيفة الوزن كبيرة الحجم، تحتاج إلى انضغاط تحت ضغط عال وإلى إعادة تعبئة

طاقة تزيد على ما تتطلبه عملية انضغاط الغاز تحت ضغط مرتفع. تؤدي هذه المتطلبات إلى ارتفاع سعر وقود الهيدروجين السائل، وإلى ندني مردود الطاقة الإجمالي لعملية التبريد الشديد (القرية) cryocooling. ومع ذلك فقد عمدت إحدى شركات تصنيع السيارات، وهي الشركة BMW، إلى تبني هذه الطريقة، وهي تخطط لصنع سيارة خلال هذا العام، أطلقت عليها اسم «هيدروجين 7»، بمحرك احتراق داخلي يعمل إما على الكازولين (لمسافة 300 ميل)، أو على الهيدروجين السائل (لمسافة 125 ميلا). وسوف تباع هذه السيارة على نطاق محدود ولزبائن مختارين في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى تتوفر فيها محطات التزود بوقود الهيدروجين.

الانتراز (الاندماج) الكيميائي

قد يستفيد الباحثون اليوم من كيمياء عنصر الهيدروجين في سعيهم إلى إيجاد طرق تتيح لهم زيادة الكثافة الطاقية لوقوده، فجزئياته، في حالته النقية وفي طوريه الغازي والسائل، تتشكل من ذرتين مرتبطتين إحداها بالآخرى: إلا أنه يمكن ربط هذه الذرات كيميائيا بذرات بعض العناصر الأخرى على نحو تكون فيه أقرب، بعضها من بعض، مما في الهيدروجين السائل. وتسعى أبحاث تخزين الهيدروجين في الوقت

الهيدروجين السائل^(**)



الوضع الحالي	السلبيات	الإيجابيات
متوفر	فقد مستمر للوقود بسبب التسخين - الحاجة إلى طاقة لتبريد الهيدروجين	خفيف الوزن وصغير الحجم

20 سنة باستخدام نظام مكون من مادتي الديكاليين والنفثالين. يتحول الديكاليين السائل (وصيغته $C_{10}H_{18}$) عند تسخينه إلى مركب كيميائي ذي رائحة واذرة، هو النفثالين (وصيغته $C_{10}H_8$)، حيث تتغير طبيعة الروابط الكيميائية في جزيء الديكاليين، وتنتقل من هذا التحول خمسة جزيئات من غاز الهيدروجين. ومع تعريض النفثالين إلى جو من غاز الهيدروجين تحت ضغط معتدل، ينعكس هذا الإجراء، فيمتص النفثالين الهيدروجين ويتحول ثانية إلى ديكالين decalin (يبلغ وزن الهيدروجين الممتص 6.2% من وزن النفثالين) ويعمل الباحثان الكيميائيان <A> كوبر> و<G> بيز> [من شركة منتجات الهواء والكيميائيات في ولاية بنسلفانيا] على تقنيات مماثلة مستخدمين مركبات عضوية سائلة (ذات أساس هيدروكربوني). كما يعمل باحثون آخرون^(*) على مواد سائلة جديدة تحمل الهيدروجين، مثل البورانات الأمينية aminoboranes القادرة على تخزين كميات كبيرة من الهيدروجين وإطلاقه في درجات حرارة معتدلة.

Hydrides Carriers (**)

Destabilized Hydrogen (**)

LIQUID HYDROGEN (***)

(*) من بينهم <S> توماس أونري> وفريقه [في المختبر الوطني لشمال غرب الباسيفيك] وأستاذ الكيمياء <G> سيدون> [في جامعة بنسلفانيا]

يسعى الكيميائيان <J> فاجو> و<G> أولسن> [من مختبرات HRL في كاليفورنيا]، كما يسعى باحثون غيرهم في مواقع أخرى، إلى استكشاف خيارات أو مقاربات ذكية للتغلب على الصعوبة التي يسببها ارتفاع درجة حرارة الإطلاق: وتجمع هيدريداتهم «القليلة الثبات» مواد عدة تعمل على تبديل مسار التفاعل، بحيث تطلق المركبات الناتجة ما تحويه من هيدروجين في درجات حرارة أكثر انخفاضاً.

والهيدريدات القليلة الثبات تنتمي إلى صنف من المواد المسماة الهيدريدات المعقدة، والتي تحوي غاز الهيدروجين في تركيبها. وقد ظن الكيميائيون لأمد طويل أن العديد من هذه المواد لا يصلح للاستخدام وقوداً للسيارات، فهي مركبات غير عكوسة، إذ تحتاج بعد تفككها وإطلاقها ما تحمله من هيدروجين، إلى معالجة لاحقة تعيدها إلى حالتها الأولية المهدرجة. وقد أدهش الكيميائيان بوكدانوفيتش> و<M> شويكارد> [من معهد ماكس بلانك لأبحاث الفحم في ألمانيا] عام 1996، حين قدّموا الدليل على أن معقد هيدريد ألانات الصوديوم يصبح عكوساً عندما يضاف إليه مقدار يسير من فلز التيتانيوم. وقد أطلق هذا العمل موجة من النشاط خلال العقد الماضي: فتم في مختبرات HRL تحضير معقد قليل الثبات من بوروهيدريد الليثيوم وهيدريد المكنيزيوم يحمل، بصورة عكوس، 9% من وزنه هيدروجيناً ويعمل في درجة الحرارة 200°C. واعتُبر هذا التحسين أمراً جديراً بالملاحظة مع أن درجة حرارة عمل المعقد ظلت مرتفعة على نحو ما، وظلت سرعة انطلاق الهيدروجين منه بطيئة جداً، وهذا يحول دون استخدامه وقوداً للسيارات. ومع ذلك فقد كان عملاً واعداً.

وعلى الرغم من القيود التي تحدّ من استخدام هيدريدات الفلزات في الوقت الحاضر، فإن العديد من الشركات المصنعة للسيارات يرى فيها الخيار الأفضل الذي يعمل تحت ضغط منخفض والأكثر قابلية للحياة على المدى القريب وال المدى المتوسط ففي شركتي تويوتا وهوندا، يخطط المهندسون المصممون لمقاربة هجينة في نظام يعمل فيه هيدريد فلزي صلب تحت ضغط معتدل نسبياً (أخفض على نحو ملحوظ من 10 000 psi)، وقادر كما يتوقعون، على قطع مسافة تزيد على 300 ميل. كما يدعم فريق من خبراء التخزين في شركة جنرال موتورز، من بينهم <S> جورجنسن> أبحاثاً تجرى في بلدان عدة (من بينها روسيا وكندا وسنغافورة) عن طيف واسع من نظم هيدريدات الفلزات. وتتعاون الشركة مع مختبرات سانديا الوطنية في برنامج يمتد على أربع سنوات، بمخصصات تبلغ 10 ملايين دولار، لصنع نموذج نظام يعمل بمعقد هيدريد فلزي.

حوامل الهيدروجين^(***)

وهناك خيارات مقاربات أخرى تتمتع بميزة إمكانية عملها في السيارات بصورة جيدة، لكنها تواجه، بدورها، صعوبة تبدو في مرحلة التزويد بالوقود. ذلك أن هذه الهيدريدات تحتاج إلى معالجات صناعية لإعادة تكوين مادتها المستهلكة، وهي خطوة ينبغي أن تتم خارج العربة: إذ ما إن ينطلق الهيدروجين المخترن في النظام المعتمد، حتى يُسَلَّم ما تبقى منه إلى محطة تزويد بالوقود ليصار إلى معالجته في وحدة معالجة كيميائية (انظر المخطط السفلي في الصفحة 24)

وقد درس فريق من الباحثين اليابانيين هذه المقاربة منذ أكثر من

هيدراتات معقدة

الوضع الحالي

قيد التطوير


السلبيات

مرتفع الوزن، يعمل في درجات حرارة مرتفعة، ويتدفق الوقود منه بصورة غير كافية.

الإيجابيات


صغير الحجم، يمكن إعادة شحنه على السيارة، كما يمكنه العمل تحت ضغوط منخفضة أو متوسطة.

كثافة التخزين



هيدريد معقد

يشكل الهيدروجين، بارتباطه بفلزات وبمواد أخرى، هيدراتات فلزية (كيميائية) (في أسفل الصفحة)، وهيدراتات معقدة (في يسار الشكل) ويتحرر الوقود الهيدروجيني عند الحاجة إليه. بتسخين هذه المعقدات



هيدريد الصوديوم والالسيوم (مثال عن هيدريد معقد)



قيمت في بعضها 5000 كم/لغرام الواحد، وهذا يعني إمكانية تغطية مساحة تبلغ ثلاثة أقدنة (تحو 2000 كم) بملء ملعقة صغيرة من مسحوق هذه المادة وتستدعي الاهتمام من بين هذه المواد، تلك المصنعة من عنصر الكربون، وذلك لخفة وزنها وانخفاض تكلفتها وإمكانية تشكيل العديد من البنى النانوية القياس منها: من أنابيب نانوية إلى أنابيب على شكل أرباق مستدقة إلى الفوليرينات⁽¹⁾ fullerenes ذات الحزبات الكروية الشكل، إلى الهلامات الهوائية (وهي أجسام صلبة ذات مسامية فائقة)

تصميم مواد جديدة

وتتوجه مقارنة أخرى لموضوع اختزان الهيدروجين نحو مواد خفيفة الوزن وذات سطح نوعي كبير جداً، يمكن لجزيئات الهيدروجين أن تلتصق بها (أو تُمتز عليها) (انظر المظهر في الصفحة المقابلة) وكما يتوقع المرء فإن كمية الهيدروجين التي يمكن أن ترتبط بسطح مثل هذه المواد تتناسب مع مساحة هذا السطح وقد أدت التطورات الحديثة في مجال الهندسة النانوية إلى تصنيع حشود من مواد ذات سطح نوعي عالٍ جداً تبلغ

هيدراتات كيميائية

الوضع الحالي

قيد التطوير

السلبيات

حاجة المواد إلى المعالجة وإعادة الصلاحية في خارج السيارة، الحاجة إلى تكلفة إضافية بسبب المعالجة في خارج السيارة وما تتطلبه من بني تحلية.

الإيجابيات


خفيف الوزن وصغير الحجم، يمكن أن يكون سائلاً.

كثافة التخزين



هيدروجين

تحتوي هذه المركبات التي قد تكون سائلة أو صلبة على الهيدروجين ويطلق الوقود الغازي منها عند تسخينها وتعريضها لحقاز (الصورة اليسرى) وبين المخطط (في أقصى اليسار) كيفية معالجة الهيدريد الكيميائي في خارج السيارة وإعادة تحميله بالهيدروجين بعد استخدامه



كاربازول الإثيل

CHEMICAL HYDRIDES (100%)


Designer Materials (100%)

COMPLEX HYDRIDES (100%)


(1) أي بمقياس النانو، وهو ما يعادل 10^{-9} من وحدة القياس المعتمدة: فالنانومتر يعادل 10^{-9} متر
(2) الفوليرين هو الشكل المتغاير الرابع لعنصر الكربون في الطبيعة وتتكون سبته من حلقات خماسية وحلقات سداسية متجاورة مترتبة على شكل كرة قدم. اكتشفه في سنة 1985 المهندس المعماري "هوتزين نوكميسترو"، ومنه أخذ اسمه أما الأشكال الثلاثة الأخرى لعنصر الكربون فهي الشكل والماس والكرافيت (النفير)

مواد تمتاز الهيدروجين


تمتاز (تعلق) ذرات الهيدروجين على سطح مواد تصمم على نحو خاص لذلك.



● هيدروجين
● مواد كيميائية ذات أساس كربوني أو سواها من البنى النانوية.



أنايب نانوية من الكربون (أعلى اليسار) يمكنها حمل الهيدروجين عليها وتخزينه حتى نحين الحاجة إليه (أسفل اليسار) يصمم الكيميائيون بنية جزيئية فلزية - عضوية تستطيع جزيئات الهيدروجين أن تعلق عليها (أسفل الشكل)



أنايب نانوية من الكربون

بنية فلزية-عضوية

HYDROGEN ADSORBENTS (١)

المؤلفون

Sunita Satyapal - John Petrovice - George Thomas

يعملون جميعاً في برنامج وزارة الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأبحاث التطبيقية والتطويرية لتقانة تخزين الهيدروجين. شغل ساتياپال عدة مناصب في الجامعات وفي الصناعة، وهو الآن رئيس الفريق العامل في وزارة الطاقة في مجال الأبحاث التطبيقية والتطويرية لتقانة تخزين الهيدروجين. أما هيتروفيتش [وهو متقاعد حالياً] فزميل في المختبر الوطني لبوس الاموس ومستشار في وزارة الطاقة وعضو في كل من جمعية الخزف الأمريكية والجمعية الأمريكية للمواد. أما خوماس [وهو الآن مستشار لدى وزارة الطاقة] فهو خبير تمتد لأكثر من ثلاثين سنة في دراسة تأثيرات الهيدروجين في الفلزات بمختبرات سانديا الوطنية. إن الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن وجهة نظر المؤلفين ولا تعبر عن آراء وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية

مراجع للاستزادة

The Hydrogen Economy: Opportunities, Costs, Barriers, and R&D Needs, National Research Council and National Academy of Engineering, National Academies Press, 2004. Available at www.nap.edu/catalog.php?record_id=10922

Hydrogen Program: 2006 Annual Merit Review Proceedings. U.S. Department of Energy. Available at www.hydrogen.energy.gov/annual_review06_proceedings.html

United States Council for Automotive Research: www.uscar.org
International Energy Agency's Hydrogen Implementing Agreement: www.ieahia.org

International Partnership for the Hydrogen Economy: www.iphe.net

Scientific American, April 2007

الوضع الحالي

السليبيات

الإيجابيات

في مرحلة مبكرة من البحث والتطوير.

كبير الحجم - قد يتطلب عمله درجات حرارة منخفضة.

خفيف الوزن - يعمل على نحو عكوس في السيارة، يمكن أن يعمل في درجة حرارة الغرفة.

ومنها أيضا الكربون المنشط وهو مادة رخيصة الثمن، يمكنها اختزان حتى 5% من وزنها هيدروجينا.

ومع ما لهذه البنى الكربونية ذات السطح النوعي المرتفع جدا من مزايا فإن أمامها جميعا عائقا مشتركا يحد من إمكانية استخدامها، فارتباط جزيئات الهيدروجين بذراتها ارتباطا واما يقتضي معه حفظها في درجات حرارة شديدة الانخفاض وقريبة من درجة حرارة النيتروجين السائل وهي -196°C. لذلك يوجه الباحثون سعيهم فيها - على خلاف الباحثين في مجال الهيدريدات الفلزية الذين يسعون إلى خفض طاقة ارتباط الهيدروجين بها - لاستكشاف وسائل ترفع من قيمة طاقة الارتباط هذه، وذلك بتعديل طبيعة سطوحها أو بإضافة مواد جديدة إليها تبديل من خصائصها: يستخدم هؤلاء الباحثون نماذج نظرية لبنى كربونية بغية التوصل إلى تحديد الأنظمة الواعدة الأفضل تهيئا لدراسات لاحقة تُجرى عليها.

وعدا هذه المقاربات التي تتوجه نحو مواد ذات أساس كربوني، فإن هناك مقاربة مغرية أخرى لهندسة نانوية تُوجه صوب مجموعة من مواد تعرف بالمواد العضوية-الفلزية، كان قد اكتشفها منذ سنوات قليلة «عمر ياغي» [أستاذ الكيمياء في جامعة ميتشيكان بان هاربر، وهو حاليا في

هل هناك شفاءً من الكلب؟^(*)

إن بقاء مراهقة على قيد الحياة
بعد إصابتها بالكلب ربما يشير إلى
سبيل لمعالجة هذا المرض المروع.

<E. R. ويلوكباي جونير>



وقد يصبح الشفاء من الكلب
هبة للعالم النامي، فالمرض نادر في
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لأن
حملات برامج الصحة العامة قد قضت تقريباً
على الفيروس في الحيوانات الأليفة، مثل: الكلاب
والقطط والماشية. ولا يموت إلا مريضان أو ثلاثة كل
عام في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن فرصة الشخص أن
يصاب بالمرض هي نحو واحد لكل 100 مليون. (في الحقيقة إن
المرض هو من الندرة في الولايات المتحدة إلى حد أنه لا يتمّ تعرفه
في نصف عدد المرضى إلا بعد أن يموتوا). ولكن منظمة الصحة
العالمية تقدر أن الكلب يقتل 55 000 فرد سنوياً في آسيا وإفريقيا
 وأمريكا اللاتينية، وأن معظم الضحايا يصابون بالعدوى نتيجة
لعض الكلاب. وإذا تمكن الباحثون من تحليل بروتوكول ميلووكي
كما يجب وتعرفوا معالجه غير مكلفة قد تكون لها فوائد مماثلة
فإن العلاج الناتج قد ينقذ آلاف الأرواح.

عضة خفاش^(**)

إن الكلب هو فيروس رنوي RNA virus يحتوي على الرنا
RNA، وهذا يعني أن له غشاءً خارجياً وأنه يستخدم حمض
الريبونوكليك كمادته الجينية عوضاً عن حمض الديوكسي
ريبونوكليك (الدنا DNA) الذي يستخدمه الإنسان وجميع
أشكال الحياة الأخرى. إن هذا الميكروب⁽¹⁾ الذي يشبه
الرصاصه يغزو خلايا الإنسان ويدفعها بعنف لإنتاج فيروسات

إن الكلب واحد من أكثر الأمراض قدماً وترويعاً للناس.
فهو يهاجم الدماغ مسبباً تهيجاً وذعراً واختلاجات عنيفة.
ويعاني الضحايا تقلصات مؤلمة في الحلق عند محاولتهم
الشرب أو الأكل. ويعقب ذلك شلل، إلا أن البشر المصابين
بالكلب يبقون يقظين بصورة متقطعة وحتى قرب حلول الموت
ويكون بإمكانهم التعبير عن مخاوفهم ومعاناتهم لأسرهم
وللقائمين على رعايتهم. ومع أن اللقاحات الخاصة بفيروس
الكلب تستطيع أن تمنع تطور المرض، إلا أن الأطباء، وحتى
عهد قريب، لم يكن لديهم أي أمل بالنسبة إلى المرضى الذين
أخفقوا في الحصول على التمنيع باللقاح في أبكر فرصة بعد
تعرضهم للعض من حيوان مصاب بالكلب. وبمجرد ظهور
أعراض الكلب (تمطياً خلال شهرين من العضة) فإن الموت كان
عادة محتملاً في أقل من أسبوع.

ومع ذلك ففي عام 2004 كنت ضمن فريق من الأطباء في
مستشفى الأطفال التابع لولاية ويسكونسن، وقد تمكنا من
إنقاذ فتاة عمرها 15 عاماً من مثل هذا المصير. وبذلك صارت
«جيناً كيسياً» (من ولاية ويسكونسن) أول ناجية غير محصنة
من الكلب (كذلك هناك خمسة أشخاص آخرون تمّ تلقيحهم،
لكن الكلب تطور لديهم على نحو ما ومع ذلك نجوا أيضاً).
لقد أثار علاجنا المبتكر، والمسمى بروتوكول ميلووكي، الجدل
بين الأطباء الاختصاصيين، وادعى البعض أن شفاء «جيناً»
كان رمية من غير رام. ومع أن المحاولات القليلة لإعادة تطبيق
المعالجة لم تنقذ حياة أي مريض بالكلب غيرها، فبحماس،
نأمل أننا نسير على الطريق الصحيح. فعلى أقل تقدير، بدأ
الباحثون بإجراء دراسات على الحيوانات لتعيين أي من
العناصر في هذا البروتوكول قد يساعد على هزيمة الكلب.

A Bat Bite (**)

A CURE FOR RABIES? (*)

(1) الكائن المجهرى



تستطيع اللقاحات ضد الكّلب أن تمنع المرض من التطور إذا أُعطيت سريعا بعد تعرّض المريض للعض من حيوان مصاب بالكّلب؛ ولكن المرض يصبح مميتا لهؤلاء الذين يفشلون في الحصول على اللقاح.

المسار إلى الدماغ

إن عضّة حيوان مصاب بالكّلب تُدخل اللعاب المملوء بالفيروس في الجرح. وبعد تكاثره في موضع الجرح لمدة شهر يدخل الفيروس عصبيا محيطيا، فإذا أصيبت عضبونات حسية بالعدوى فإن الميكروبات تسافر إلى العقد الحسية عن طريق النخاع الشوكي، ثم إلى المهاد والقشرة الحسية. وقد يشكو المرضى من تنمل (وخز إبر ودبابيس) أو حنّ حرق أو حنّ شديد. أما إذا أصيبت عضبونات حركية فإن الفيروس يصل إلى الدماغ عن طريق الأعصاب التي تربط النخاع الشوكي بالقشرة الحركية. وتتضمن الأعراض: الضعف والشلل والنفضات العضلية التي قد ترتقي إلى نوبات من التشنجات.



جديدة، ويحدث ما يحدث من تلف يصنع خمسة بروتينات ولأنها شديدة التخصص بالنمو في خلايا الدماغ والأعصاب فإن فيروس الكّلب نادرا ما يمكن العثور عليه في أي مكان آخر في الجسم. فبعد نقله عن طريق عضّة حيوان مصاب بالكّلب (والتي تُدخل اللعاب المصاب بالعدوى في الجرح) يتضاعف الفيروس موضعيا في العضلات أو الجلد ولأن الفيروس يكون موجودا بكمية ضئيلة جدا ولأنه لا ينتقل من خلال مجرى الدم أو العقدة اللمفاوية، فإن الجهاز المناعي للجسم لا يكتشف هذه الميكروبات (الأحياء المجهرية) في هذه المرحلة. وتستمر فترة الحضانة الخالية من الأعراض نمطيا من أسبوعين إلى ثمانية أسابيع، إلا أنها قد تمتد لعدة سنوات. وفي نقطة معينة تصل الفيروسات إلى أحد الأعصاب، وعندها تكون اللعبة قد انتهت.

في أواخر القرن التاسع عشر اكتشف عالم الميكروبات «لويس باستور» أن حقن فيروس الكّلب المقتول يحفز الجهاز المناعي على إنتاج أضداد ضد هذا الميكروب؛ والأكثر من ذلك فقد تبين لـ«باستور» أن الوقت اللازم للجسم لإنتاج تلك الاستجابة المناعية أقصر من فترة حضانة المرض وقد حقن فيروسات مقتولة مأخوذة من الأنخعة (الحبال) الشوكية للارانب المخبوطة^(*) في الأفراد الذين عضتهم كلاب مصابة، فبقوا أحياء باكتساب المناعة قبل ظهور أي أعراض عندهم وقد تطور الكّلب في الفلسفة ما بين التمنيع والاستجابة المناعية، لذلك يحقن الأطباء مرضاهم بأضداد خاصة بالكّلب لتغطية تلك الفجوة الزمنية هذا وتنظيف الجرح بطريقة ملائمة بالماء والصابون (الذي يقتل الفيروس بنزع غشائه) هو أمر مهم أيضا، والوقاية فيما بعد التعرض للإصابة (العناية بالجرح وخمس حقنات من لقاح مأمون جدا وجعرة واحدة من الأضداد antibody) لم تفشل أبدا في الولايات المتحدة

منذ إدخالها في عام 1975.

لقد بدأ صراع الفتاة «جينا» مع الكّلب عندما اصطدم خفاش نافذة داخلية في كنيسة في أثناء أحد الطقوس الدينية. وعندما التقطته من طرفي جناحيه لإطلاقه إلى الخارج، انطلق الخفاش بقوة نحو يد «جينا» اليسرى، وأصيبت في سبابتها بجرح قاطع بطول ربع بوصة (نحو 6 ملمترات) ولما كانت أسنان الخفاش قصيرة وحادة كالشفرة، فلا يحسن الناس بالعضة عادة، وقد يكون من الصعب العثور على موضعها. لهذه الأسباب ينصح مسؤولو الصحة بإعطاء لقاح الكّلب لكل من لامس خفاشا أو كان

نائما في غرفة فيها خفاش (إلا إذا أمكن أسر الخفاش وتم اختباره للتأكد من خلوه من الكّلب). وقد نظفت «جينا» الخدش لديها بماء الأكسجين (بيروكسيد الأكسجين) ولكنها لم تسع للحصول على التمنيع، ولو أنها فعلت ذلك لأتمت دراستها الثانوية في الصف الثاني من دون اضطراب.

وبدلا من ذلك، تضاعف الفيروس في إصبع «جينا» نحو الشهر، ثم دخل في أحد الأعصاب وانتقل بسرعة نحو دماغها متحركا بسرعة نحو سنتيمتر واحد في الساعة. ولأن هذا الفيروس يستهدف الجهاز العصبي دون غيره (حيث لا تعمل أنواع عديدة من الخلايا المناعية) فإن الجسم لا يكتشف الفيروس إلا بعد أن يكون قد ارتشع بكثافة في الدماغ والنخاع الشوكي والمريض بالكّلب يتطور لديه في النهاية شلل تام نتيجة خمج (عدوى) الأعصاب الحركية وفقد لكل الإحساس نتيجة خمج الأعصاب الحسية والآلية وراء هذا الفقد للنشاط

Overview/ A Rabies Riddle (**)

THE TERRIBLE COURSE OF RABIES (**)

المصانة بالعدوى (**)

نظرة إجمالية/ أحجية داء الكّلب^(*)

- في عام 2004 أنقذ الأطباء حياة فتاة مراهقة التقطت الكّلب من عضّة خفاش. وتضمن العلاج إحداث سبات (غيبوبة) وإعطاء عقاقير كافحت فيروس الكّلب وصانته الدماغ.
- لا يعرف الباحثون لماذا نجحت المعالجة، ونجاحها لم يتم تكراره. ويحتاج الباحثون إلى أن يجربوا العلاج على الحيوانات المصابة بالكّلب، ولكن الكليات البيطرية تعارض ذلك.
- إن بمقدور علاج الكّلب، يمكن الاعتماد عليه وغير باهظ الثمن، أن ينقذ آلاف الأرواح في البلاد النامية، حيث لا يزال المرض شائعا.

المخاطية (في العين والجهاز التنفسي والفم) هو الكيفية التي تُديم الكُلب في الطبيعة. لقد ارتدى أعضاء الفريق الطبي الذي كان يعتني بـ«جيناً» أغطية واقية للرأس وأقنعة للوجه وأردية واقية وقفازات طوال الشهر الأول لمرضها. واقتضى تشخيص الكُلب تحليل عينات من لعابها وجلدها ودمها وسائلها الشوكي ثم إرسال تلك العينات جواً إلى قسم الكُلب في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بولاية أتلانتا، وبإمكان هذا المختبر تقديم النتائج الأولية في أقل من 24 ساعة.

في تلك الأثناء قمت بفحص «جيناً»، وقد كانت نائمة، إلا أنها أدت الأوامر البسيطة، ولم يكن باستطاعتها استمرار الحفاظ على توازنها. وكانت تعاني ضعفاً في ساقها اليسرى، وكانت منعكساتها⁽¹⁾ طبيعية، وهذا مكنتني من استبعاد احتمال شلل الأطفال أو فيروس غرب النيل⁽²⁾ كذلك كانت ذراعها اليسرى تنتفض بتقطع، وكان نمط الخدر في يدها اليسرى ونفض ذراعها اليسرى يرتبطان بموضع عضلة الخفاش، ويقترح ذلك أن الكُلب أكثر من الاخماج الشائعة هو الذي يسبب التهاب الدماغ. ولأن الأطباء غالباً ما يعاينون صوراً غير نمطية لمرض شائع أكثر من مرض نادر حقاً، فقد طمأنت عائلة «جيناً» والمرضات بأنه من المستحيل تقريباً أن تكون «جيناً» مصابة بالكُلب، وقد راهنتُ على نوع آخر من التهاب الدماغ، الأرجح أن يكون مناعياً ذاتياً، وهو أكثر انتشاراً 1000 مرة من الكُلب.

وكان لدينا 24 ساعة لإعداد خطة في حال كنتُ مخطئاً، وفي الوقت ما بين فحص الحالات الأخرى، كنت أركز على واحدة من ركائز مهنة الطب ألا وهي التعمق في البحث عن الأشياء. لقد عرفت الحكمة الشائعة وهي أن الكُلب متى بدأ فلا يمكن لأي شيء أن يوقفه، لذا فقد كان محتملاً أن تكون «جيناً» قد ماتت لو كان ذلك هو تشخيص حالتها؛ وكل ما كان بوسعنا عمله هو الإقلال من معاناتها. ولكنني أعرف أيضاً أن الطب يتقدم دائماً، لذا فربما «كان هناك» شيء جديد. فبالبحث في الإنتاج الطبي المتاح على الإنترنت⁽³⁾ لم يظهر أي حلول خارقة breakthroughs، إلا أن التلوك⁽⁴⁾ ما بين

(1) التهوية الآلية mechanical ventilation : جهاز يساعد المريض على التنفس عندما يفشل في التنفس بذاته

(2) استجاباتها الانعكاسية online (3)

تخريب الجسم
بمجرد دخول الفيروس إلى القشرة فإنه ينتشر سريعاً إلى الدماغ الشديد الترابط مبدئياً ميلاً إلى المخيخ (الذي ينسق حركات الجسم) والحصين (المتعلق بالذاكرة القصيرة الأمد) والجهاز الحوفي (الذي ينظم الانفعالات). وتصبح الحيوانات المخموجة سريعة التهيج وقلقة وعدوانية، وقد تقوم بتشويه ذاتها. ولكي تكتمل دورة حياته، فإن فيروس الكلب يجب أن يشق طريقه إلى الغدد اللعابية والدمعية، ومن ثم يتابع نحو ضحاياه التاليين. يهاجر الميكروب من الدماغ عبر أي عصب محيطي بما في ذلك الأعصاب المستقلة التي تربط الدماغ بالأعضاء الحيوية والغدد اللعابية والدمعية. ويحدث الموت نتيجة لتوقف القلب أو السكتة الدماغية أو القصور التنفسي.



وتلتهب الدماغ. ولأن تصوير دماغ «جيناً» كان طبيعياً [لم يُبد أي سمة للتهاب أو سكتة دماغية stroke]، خمن أطباؤها أنها تعاني ذلك النوع من التهاب الدماغ نتيجة لما بعد الخمج أو نتيجة المناعة الذاتية. وبدا أنها قد تتطور نحو السبات وتحتاج إلى التهوية الآلية⁽¹⁾، لذا حُوِّلت إلى مستشفىنا.


لقد أوشكتُ مع زملائي أن نحقق في تشخيص الكُلب، لولا أننا تلقينا بعض المساعدة. فقد عاد طبيب «جيناً» المحلي H> دوناًو> من عطلة نهاية الأسبوع، وقام بفعل ما يتعلمه طلبة الطب باعتباره أحد أساسيات الطب. ألا وهو تكرار أخذ التاريخ الطبي لما حدث لمريضته، وعلم بأمر الخفاش. وكان أخذ هذا التاريخ الطبي حاسماً لنجاحنا، فقد اقترحت على الفريق الذي كان على وشك نقل «جيناً» إلى مستشفىنا استخدام معدات وقائية للاحتياط. ومع أن الباحثين ليس لديهم أي دليل على أن الكُلب يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر، فإن دموع ولعاب الحيوانات المصابة بالكُلب تكون مملوءة بالفيروس. وتلوث الجروح أو الأغشية

العصبية غير معروفة، كما أن الباحثين لا يفهمون تماماً كيف يقتل الكُلب مريضاً. فقد يحدث الموت بطرق عدة: الصدمة أو توقف القلب أو الفشل التنفسي. وعلى ما يبدو فإن فيروس الكُلب قد يدفع الدماغ إلى تخريب أعضائه الحيوية، وهذه الملاحظة هي التي ألهمتنا علاج الفتاة «جيناً».

لقد تطور عند «جيناً» [الطالبة الموهوبة والنجمة في فريق مدرستها الثانوية للكرة الطائرة] مرضٌ شبيه بالأنفلونزا في الشهر 2004/10، بعد شهر من تعرضها لتلك العضة. وبعد ذلك عانت فقد الإحساس في يدها اليسرى وضعفاً في ساقها اليسرى وازدواج الرؤية أدخلت المستشفى المحلي في عطلة نهاية الأسبوع، ثم صارت نائمة lethargic وحركتها غير متناسقة، وهذه الأعراض نمطية لالتهاب الدماغ (وهو أمر شائع في الممارسة الطبية. ويحدث لدى عدة آلاف من المرضى سنوياً في الولايات المتحدة)، الذي تسببه أنواع مختلفة من الفيروسات والبكتيريا، ولكنه قد يُستثار بواسطة استجابة مناعية تسلك مسلكاً خفياً

المعالجة التي أنقذت «جيناً»^(١)

في يوم 2004/10/19، بعد يوم من وصول «جيناً كيسى» إلى مستشفى الأطفال في ميلووكي، أكد الأطباء أنها مصابة بالكلب واستخدموا الكيتامين والميدازولام لإبقائها في حالة سبات. وعلى مدى الأسابيع الستة



(الهديانية)، (والذين يستخدمون العقار بصورة غير مشروعة للاستمتاع بسمون الكيتامين K الفضل) والمثير للاهتمام أن الآثار الجانبية للكيتامين تقدم، على ما يبدو، ميزة أخرى محتملة لمرضى الكلب: فالكيتامين يعمل واقياً عصبياً عن طريق إحصار بروتينات غشائية تسمى مستقبلات كلوتامات NMDA glutamate receptors، وهذه بإمكانها قتل العصبونات بعد أن تصبح فائقة النشاط عقب سكتة دماغية أو أي نوع آخر من إصابة للدماغ. ونصّروا دهشتي عندما قرأت عن دواء قد يسهم في تثبيط الدماغ الذي به خلل، في حين ينشط، في الوقت ذاته، إزالة فيروس الكلب ويحمي الدماغ من المزيد من الأذى.

قرار يائس^(٢)

وبصفتي استشارياً للأمراض الخمجية (المعدية)، لم تكن عندي المهارة لوضع «جيناً» في حالة سبات بطريقة آمنة لذا فقد طبقتُ رَكيزةً أخرى من ركائز الطب: اطلبُ المساعدة. وقد كنتُ جديداً في مستشفى الأطفال، لذا فقد طلبتُ إلى «J.M. تشوسيد» (وهو استشاري للأمراض الخمجية أعلى مرتبة) أن يساعدي على إيجاد اختصاصيين في حماية الدماغ ولحسن الحظ كان جميع الخبراء موجودين في ذلك اليوم. فقد كانت «K. تيفيز» و«N. غنيم» (ولهما خبرة في تقليل أذى الدماغ عقب الرض وعقب جراحات القلب المفتوح) مناوبتين في وحدة العناية المشددة (الركزة) عندما وصلت «جيناً» وقد تضمن فريقنا أيضاً «C. إميلي ليفوند» (وهي طبيبة أعصاب متخصصة في خمج الفيروسات) و«M. شواب» (الخبير في الصرع والذي كان بمقدوره تزويدنا برصد مستمر لموجات الدماغ للتحكم في السبات) و«G. هوفمان» اختصاصي التخدير للفريق الذي تعرّف خططنا لإحداث السبات باعتبارها ممارسةً نمطية لحالات مرضية أخرى.

THE TREATMENT THAT SAVED JENNA (١)
A Desperate Decision (٢)

كشف طبي ما ونشره قد يطول إلى 5 أعوام. لقد اتصلتُ بـ«كاثلين هانلون» (وهي خبيرة في الكلب في المركز CDC) وتلقيتُ منها معلومتين مُحببتين: الأولى، أن تاريخ مرض «جيناً» وفحصها يبدو أن كما لو كانت حالة كلب خاصة «بهانلون»، والأخرى، أنه لم يطرح أي شيء واعد في اللقاءات العلمية أو التجارب السريرية الجارية حديثاً.

ولأن الوقت كان محدوداً، فقد قررتُ اتباع خطة بحث مختلفة، فتقريباً لم ينبُج أحدٌ من الكلب، لذا تجنبتُ ما نُشر عن كيفية معالجة المرض في الإنسان والأبحاث بخصوص العلاجات تبدأ عادةً بتأثير الأدوية في الفيروسات المزروعة في أنابيب الاختبار. ومع أنها خطوة أولى ضرورية، فإن الأدوية التي تبدو واعدة في الدراسات الأولية عادةً ما تكون سامة أو لا يمكن إعطاؤها بكميات كافية في موضع الخمج. والشئ الذي شد انتباهي عندما نظرت فيما تبقى من مقالات هو ذلك اللغز الذي حير خبراء الكلب لأكثر من 30 عاماً: فمرضى الكلب يموتون تقريباً دون أي علة ظاهرة في دماغهم. وبالقدر نفسه من الأهمية عندما يموت مريض الكلب بعد أسابيع من الرعاية المكثفة فإن الفيروس لا يمكن العثور عليه في أجسامهم، فالجهاز المناعي يتخلص من الفيروس مع الوقت، إلا أن الإزالة تحدث ببطء شديد بحيث لا تنقذ حياة المريض.

ومن هاتين الحقيقتين ارتجلنا استراتيجيتنا وخططنا، ففيروس الكلب يستطيع (على ما يبدو) أن يُكره الدماغ على قتل الجسد دون أن يؤذي نسيج الدماغ ذاته مباشرة. فإذا تمكنا من تعطيل الخل في وظيفة الدماغ بالاستخدام الحذر للأدوية، بحيث نضع الفتاة «جيناً» في حالة فقدان وعي طويلة، فقد نحد من الدمار المحقق بجسمها، وربما نبقياها حية مدةً طويلة كافية، بما يسمح لجهازها المناعي للحاق بالقيام بدوره كاملاً.

ولاختيار أي عقاقير لها مدلول أوضح، فتشتُ في الأدبيات الطبية عن دراسات تربط الكلب بالنواقل العصبية neurotransmitters (وهي تلك الكيماويات التي يستخدمها الدماغ لنقل الإشارة ما بين الخلايا) أو بالحماية العصبية neuroprotection (وهو ذلك العلم الذي يستخدم الأدوية أو غيرها من تدخلات لحماية الدماغ من الأذى) وقد كشف تفقيشي هذا عن بحثين مذهلين لـ«H. تسيانك» وزملائه [من معهد لويس باستور في باريس]. ففي أوائل التسعينات من القرن الماضي قدم «تسيانك» وزملاؤه تقريراً يفيد أن بمقدور الكيتامين (وهو مخدر) أن يثبط فيروس الكلب في العصبونات القشرية بالجرذان. وكان هذا البحث مطمناً لثلاثة أسباب: الأول، أن البحث بيّن أن الكيتامين يؤثر بشكل جوهري في دورة حياة الفيروس، في حين ينتسخ الفيروس مادته الجينية داخل العصبونات [انظر المظهر في الصفحة 32]، والثاني، أن الدواء يعيق فقط فيروس الكلب دون غيره من الفيروسات، وهذا يرجع أن تأثير العقار ليس نتيجة سمية عامة للحيوان، والأخير أن عقاراً مشابهاً، ولكنه أكثر سمية ويسمى MK 801، يثبط أيضاً الكلب في عصبونات الجرذان، لذا فإن هذه الفائدة تنطبق على الأرجح على صنف بأكمله من المركبات.

لقد استخدم الجراحون، لأكثر من 25 سنة، الكيتامين لإحداث حالة فقدان الوعي أو لإبقائها لدى مرضاهم. مع أنه قد تم استبدال العقار على نطاق واسع نظراً لآثاره الجانبية الهلوسية

المناعي ينتج كميات كبيرة من الأضداد المقاومة للكلب ولا سيما الأضداد المعجلة التي تمنع الفيروس من غزو خلايا جديدة. ولكن شفاهما كان بطيئا إلى أن أعطاهما الأطباء البيطريين وهو مركب شبيه بحمض الفوليك.

التالية اعطوها فينوباربيتال (مُرَكَّن) وامانتادين (عنصر مضاد للفيروسات يساعد على حماية الدماغ) وريبافيرين (دواء مضاد للفيروسات عموما). وعندما خرجت «جينا» من حالة السبات كان جهازها



جينا تجلس في السرير أكثر من 10 دقائق

تستخدم معاونة



نستفيد من إضافة المزيد منها باستخدام اللقاح المحتوي على الفيروسات المقتولة، بل قد يسبب ضررا بحرف الاستجابة المناعية الطبيعية بعيدا عن الفيروسات الموجودة فعلا في دماغ «جينا» وتوجيهها نحو التحولات الممثلة بصورة مبالغ فيها في اللقاح ولأسباب مماثلة فقد اخترنا الآن نغرز جهاز «جينا» المناعي بحقنها أضدادا نوعية للكلب أو الإنترفيرونات (وهي بروتينات تزيد النشاط المناعي). واخترنا أن تُحدث السبات في «جينا» لمدة أسبوع، وأن نحلل عينات من دمها وسائلها النخاعي على امتداد تلك الفترة للتأكد من أنها تنتج أضدادها الخاصة.

ومع أن الفوضى العارمة تميز الرعاية النهائية للكلب (بما فيها تارجع عنيف في معدل نبضات القلب وضغط الدم)، فإننا لم نصادف أي انتكاسات رئيسية أثناء سبات جينا. وبانتهاء الأسبوع بدأ جسمها بإنتاج كميات كبيرة من الأضداد المستعجلة neutralizing التي تمنع الفيروس من غزو خلايا جديدة وربما تزيل الميكروب بطرق أخرى غير معروفة. ولكن الاختبار الحقيقي سوف يأتي يوم نعيد «جينا» للوعي وكان اليوم الذي أخرجنا فيه «جينا» من السبات أسوأ يوم في حياتي: فقد كانت «جينا» مشلولة تماما وعديمة الاستجابة، ولم يكن لدينا أي فكرة عما إذا كانت حية أو ما الذي سيحدث بعد ذلك، ولكننا كنا نعلم أن مرضى الكلب قد يبدون خطأ موت الدماغ، لذا لم نفقد الأمل. وفي اليوم التالي حاولت «جينا» أن تفتح عينيها. وفي وقت لاحق تطورت لديها استجابة انعكاسية في ساقها. وبعد ستة أيام كانت تديم النظر إلى وجه أمها (مفضلة إياه على وجهي) وتفتح فمها لتساعد ممرضتها على تنظيفه. وبعد 12 يوما أمكنها الجلوس في سريرها.

إن الشلل التام يتسبب في حالة حادة من زوال التكيف في الجسم، فالقوة والقدرة على الاحتمال والتكيف تكون كلها مفقودة، إضافة إلى قابلية البلع والكلام لقد استحوذ شفاء «جينا» على قدر هائل من العمل الشاق. ففي الشهرين الأولين تعرضت لتأخير مريب:

لقد أوصى أعضاء الفريق بعلاجات أخرى لتخفيف الآثار الجانبية للكيتامين ومنع المزيد من الحماية العصبية وبلوغ السبات الذي هو هدفنا العلاجي. وكذلك أوصوا بالامانتادين، وهو مضاد للفيروسات وقد يساعد أيضا على إعاقة المستقبلات العصبونية NMDA، فيرتبط بها في موضع مختلف عن ذلك الذي يحصره الكيتامين. وكذلك الميدازولام (وهو مهدئ من مجموعة البنزوديازيبين) والفينوباربيتال، اللذان قد يساعدان أيضا على إيقاف نشاط دماغ «جينا». فيما بعد اقترح «روبريخت» [وهو خبير في الكلب بالمراكز CDC] إعطاء مضاد عام للفيروسات وهو الريبافيرين، مع أنه قد سبق تجربته على مرضى الكلب دون أي نجاح. ولكننا دائما نصغي للأشخاص البارعين.


إن وجود وفرة من الاستشاريين في كل تخصص أتاح لنا نقد الفرضية، والتقرير فيما إذا كان من الأمان أن نتابع فعندما تُجرَّب أشياء جديدة في الطب أو البيولوجيا (علم الحياة) فإنها عادة ما تقشل وغالبا ما تسبب ضررا. لذا يُفترض أن تبدأ العلاجات من أنبوب الاختبار. إلى الدراسة على الحيوانات، ثم إلى التجارب السريرية. لقد بدأت فرضيتي بسيطة جدا، وقد تسبب نتيجة طبية أسوأ حتى من الموت فأربعة من كل خمسة ناجين محصين من الكلب انتهوا بإعاقات خطيرة. لقد اجتمعنا مدة ساعة بعد أن أكد «روبريخت» أن «جينا» مصابة بالكلب. وقد أبلغنا والديها بالتشخيص وشرحنا لهما الخيارات التقليدية. ثم اقترحنا عليهما علاجنا. ولأن موت «جينا» كان محتملا فقد طلب والد «جينا» إلينا أن نجرب شيئا جديدا، بحيث يكون هناك المريد من المعرفة لصالح الطفل التالي المصاب بالكلب.

وقد قدرنا أن الجهاز المناعي لـ «جينا» قد يحتاج ما بين 5 و 7 أيام لإنتاج الأضداد التي تستهدف فيروس الكلب، ومن خبرتنا من حالات الكلب السابقة لدى البشر، علمنا أن الاستجابة المناعية العصبية ستكون عنيفة بمجرد أن سُتثار. وأخذنا في الاعتبار أن دماغ «جينا» مملوء فعلا بفيروس الكلب. لذا، فمن غير المحتمل أن

كبح فيروس مميت^(١)

نسخاً من نفسه، تتجمع مع البروتينات لتكوّن ميكروبات جديدة تنبثق من أغشيت العصبون لتهاجم العصبون المجاور. وتبين الدراسات أن الكيتامين (المرج)، وهو مركب استخدم طويلاً كمخدر، يثبط مرحلة الانتساخ في دورة حياة الفيروس.

بعد أن يخترق فيروس الكلب محوار عصبون فإنه ينزع غشاءه ويحرر بروتيناته والرنا RNA، التي ترتحل إلى جسم الخلية. ويولد رنا الفيروس الرنا المرسال (الانتساخ) الذي يستخدم بدوره الليات الخلية لإنتاج بروتينات الفيروس الخمسة (الترجمة). ثم يكون رنا الفيروس



أعراض الكلب عدا التأثيرات الأخيرة في الأعصاب المحيطية. لقد كان ذلك انفراجاً مذهلاً، لأن البيوبترين متاح كإضافة تؤخذ بالفم. وبعد حصولها على البيوبترين استطاعت «جينا» الكلام والبلع مرة أخرى. وقد أتاح التحسن السريع لها أن تغادر المستشفى يوم 2005/1/1، قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان متوقفاً لها. وأثبتنا من حينها أن عوز البيوبترين قد ظهر في مريض الكلب الوحيد الآخر الذي حُفظت منه عينات بطريقة مناسبة. ونحن نختبر احتمال وجود مستويات منخفضة من البيوبترين في الأنواع الأخرى من الحيوانات الأخرى المضموجة بالكلب. فإذا كان الأمر كذلك فإن العوز قد يساعد على تفسير الكيفية التي يخرب بها الفيروس الجسم. أما لماذا يخفّض الكلب

CURBING A DEADLY VIRUS (١٠)

فمثلاً أحرزت تقدماً سريعاً في المشي وأداء التمرينات ولكنها لم تكن قادرة على الكلام أو البلع. وتبقت لديها مشكلات أخرى، مثل تراكم حامض اللين في جسمها والذي جعلني أفكر في الاضطرابات الاستقلابية (الأيضية). وفي استشارة مع <w>ريبيد</w> [وهو المختص في علم الجينات بمستشفانا] شخّصنا الحالة على أنها عوز مكتسب للبيوبترين bioppterin. ويشبه البيوبترين كيمائياً حمض الفوليك وهو الفيتامين B الأساسي لنمو الخلية. والمركب موجود بكميات محدودة في الدماغ، حيث هي حاسمة لإنتاج النواقل العصبية، مثل الدوبامين والابينفرين والنورابينفرين والسيروتونين والميلاتونين. ويتحكم البيوبترين في كيفية صيانة أحد إنزيمات الدماغ (سينثيتاز أكسيد النيتريك العصبي) لتوتر الأوعية الدموية المغذية للدماغ. وفي الحقيقة أدركنا أن الكميات الضئيلة من البيوبترين بإمكانها أن تفسر معظم

يحملة الخفاش يبين أنه مختلف عن تلك السلالات الموجودة في الكلاب وعنده نزوع أكبر للتضاعف في الجلد عوضاً عن العضلات، ولكن فيروس الخفاش ليس أقل قتلاً من نسخة الكلبيات canine version

وربما تكون أفضل طريقة للرد على تلك التهم هي تطبيق علاجاتنا على الحيوانات المصابة بالكلب لتعيين الأجزاء الحاسمة في هذا البروتوكول (أحداث السبات أو الأنشطة المضادة للفيروسات أو تعطيل المستقبلات NMDA) من أجل مكافحة الكلب وقد طلبنا إلى ست كليات للطب البيطري أن تسمح بهذه الدراسات، ولكن المسؤولين في هذه الكليات كانوا يخشون معالجة حيوانات مصابة بالكلب في وحدات العناية المركزة لديهم. إن قلة مواصلة الأبحاث هي خسارة عالية، لأنه لا يمكننا معرفة فيما إذا كانت استراتيجيتنا فاعلة حتى يجربها الآخرون. فإذا ما أمكن تكرار نجاحنا فسوف يتمكن الباحثون من تعيين أي الأدوية هو فعال وبأي جرعة، وفيما إذا كان بإمكان البيوتريين تقليص فترة النقاهة بشكل ذي دلالة إضافة إلى ذلك، على الأطباء إيجاد طرق لتخفيض تكلفة العلاج وإعادة التأهيل (والتي بلغت 800 000 دولار على الأقل في حالة «جيناً») لجعلها ممارسة مقبولة في الدول النامية، حيث لا يزال الكلب أكثر شيوعاً. وسيكون أمراً غير معقول أن تتحول نسبة الوفيات من الكلب من 100% إلى 100%، ولكن لدينا الآن على الأقل الفرصة لتحسين هذه الاحتمالات.

(*) A Curable Controversy

(1) سابقا المضادات الحيوية probiotics، أو سابقا الصادات

(2) شبكة ميراكل (المعجزة) للأطفال The Children's Miracle Network هي الاتحاد الرئيسي لمستشفيات الأطفال الرئيسي، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى لتأمين الدعم المالي لمئة وسبعين مستشفى للأطفال في أمريكا الشمالية

المؤلف

Rodney E. Willoughby, Jr.

أستاذ مشارك في طب الأطفال بكلية الطب في ويسكونسن واستشاري الأمراض الخمجية (العدوى) بمستشفى الأطفال في ويسكونسن وهو خريج جامعة برينستون وكلية طب جون هوبكنز مع تدريب ما بعد الدكتوراه في طب الأطفال وأمراض الأطفال الحمجية والكيمياء الحيوية للكسريات والاستقصاءات السريرية وتتضمن اهتماماته البحثية الكلب والشلل الدماغي وتوزيع المضادات الحيوية (الصادات) وسابقا المضادات الحيوية "الأقلال من الحجم القوام للمضادات الحيوية في المستشفيات وتلقى في عام 2006 جائزة الإبحار من شبكة ميراكل للأطفال

مراجع للاستزادة

Inhibition of Rabies Virus Transcription in Rat Cortical Neurons with the Dissociative Anesthetic Ketamine. B. P. Lockhart, N. Tordo and H. Tsiang in *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, Vol. 36, No. 8, pages 1750-1755; August 1992.

Prophylaxis against Rabies. C. E. Rupprecht and R. V. Gibbons in *New England Journal of Medicine*, Vol. 351, No. 25, pages 2626-2635, December 16, 2004.

Survival after Treatment of Rabies with Induction of Coma. R. E. Willoughby, Jr., K. S. Tieves, G. M. Hoffman, N. S. Ghanayem, C. M. Amlie-Lefond, M. J. Schwabe et al. in *New England Journal of Medicine*, Vol. 352, No. 24, pages 2508-2514, June 16, 2005

More information about rabies and the Milwaukee protocol is available at www.mcw.edu/rabies

Scientific American, April 2007



شفاء استثنائي: «جيناً كيسى» (تظهر مع المؤلف) تخرج في المدرسة الثانوية هذا العام وتأمل أن تصبح طبيبة بيطرية. والأشياء التي تُذكر بصراعها مع الكلب هي خبز في إصبعها المعضوضعة وتغير في قوة ذراعها اليسرى وخطوة أوسع عندما تجري.

البيوتريين (ومعظم اخماج الدماغ تزيد) فهو أمر غير واضح وقد أعدنا العدة لاختبار ومعالجة عوز البيوتريين في مرضى الكلب المستقبلين الذين يتلقون بروتوكول ميلووكي

خلاف يمكن البحث فيه^(*)

في الذكرى السنوية الأولى لتشخيص الكلب لديها، حضرت «جيناً» لقاءً دولياً للباحثين العلميين عن الكلب (عُقد في كندا) كضيفة شرف في حفل العشاء الاحتفالي، حيث ألفت كلمة وقد عادت للالتحاق بزملائها الأصليين في السنة الأولى بمدريستها الثانوية وحصلت على علامات ممتازة، وكذلك حصلت على تصريح قيادة سيارة مؤقت. وكانت الأشياء التي تخلقت من صراعها مع الكلب هي: رقعة صغيرة من الخدر في إصبعها التي عضها الخفاش وتغير في توتر ذراعها اليسرى وخطوة أوسع عندما تجري وقد تخرجت في مدرستها هذا العام، وتأمل أن تصبح بيطرية.

ولكن هل بإمكان بروتوكول ميلووكي إنقاذ أي أرواح أخرى؟ لقد استخدمت هذه المعالجة ست مرات خلال العامين الماضيين من دون أي نجاح يذكر في ألمانيا وإيطاليا والهند وتايلاند والولايات المتحدة. ولأسوء، الحظ فإن العديد من المحاولات خالفت افتراضات جوهرية في نظريتنا أو أنها لم تستخدم معظم الأدوية في نظام «جيناً». إن المجتمع الطبي كان ممانعاً لتكرار علاجنا. وكان هناك بعض الخبراء الذين عارضونا علانية. إن هذه المقاومة مفهومة، لأن بقاء «جيناً» على قيد الحياة كان يعارض الدراسات المختبرية التي تبين أن فيروس الكلب يقتل خلايا الدماغ، ولكن هذه الدراسات قد تكون مضللة لأن سلالات الكلب في المختبر قد تكون أكثر قابلية لإحداث موت الخلايا من الفيروسات التي تجول في الطبيعة.

وقد جادل خبراء آخرون بأن «جيناً» بقيت حية لأنها خُجعت بسلالة ضعيفة على نحو غير عادي من الكلب. وهذا النوع من الجدل من الصعب الرد عليه. لأننا لم نعزل عينات من الفيروس من جسم «جيناً» (وقد حصلت المراكز CDC على أضداد نوعية للكلب من «جيناً» وليس على الفيروس نفسه، لأنه من الصعب عزله) وتحليل فيروس الكلب الذي

تدريبات أمريكا الجنوبية المفقودة⁽¹⁾

توضح الاكتشافات الأحفورية المدهشة في جبال الأنديز التشيلية وجود مجموعة غير متوقعة من تدريبات فريدة كانت يوما ما تتجول في أمريكا الجنوبية. وقد قلبت هذه الاكتشافات معرفة كانت راسخة حول التاريخ الجيولوجي لهذه القارة.

(J.L. ملان) - R.A. وايس - <R> تشاربير

المدهش أن عمر الأحافير التشيلية يراوح بين 40 مليون و 10 ملايين سنة - وهو أحدث كثيرا مما توقعناه. وبالفعل، فإن الكثير من العينات يمثل البقايا الثديية لأجزاء فقط من تلك الفترة الزمنية الموجودة في كل مكان في أمريكا الجنوبية وقد أضاعت بعض هذه الأحافير الفريدة فترة مظلمة سابقا من تاريخ سلاسل الثدييات الأصلية في هذه القارة؛ في حين ساعدت أحافير أخرى على حل الجدل المديد حول منشأ الجماعات المهاجرة الأساسية. وقد صحح هذان النوعان من الأحافير فهمنا للزمن الذي ظهرت فيه بعض النظم البيئية والزمن الذي تشكلت فيه الجبال نفسها - في هذا الجزء من العالم.

اكتشاف مضن⁽²⁾

يستند معظم ما يعرفه العلماء عن الثدييات القديمة في أمريكا الجنوبية إلى إشارات اكتشفت في الأطراف الجنوبية البعيدة من القارة وبخاصة في منطقة باتاغونيا Patagonia تحوي هذه المناطق

وعمليات التحات التي تيعتها قد عرّت بقايا هياكلها الأحفورية فأصبحت واضحة في ضوء النهار في مرتفعات جبال الأنديز بأواسط تشيلي. وقد اكتشف فريقنا أول هذه العظام في عام 1988 بينما كنا نقتش عن بقايا الدينصورات في أحد الأودية الرافدة لنهر تنكويريريكا Tinguiririca River قرب الحدود مع الأرجنتين وثبت أن الاكتشاف الأولي لعظام الثدييات كان مثمرا إلى أبعد الحدود. فقد عدنا إلى المنطقة من حينها كل عام تقريبا. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن اكتشفنا أكثر من 1500 أحفورة من الثدييات القديمة من عشرات المواقع في أواسط جبال الأنديز التشيلية.

لقد أدّى التحليل المختبري المضني لمجموعة عيناتنا المتنامية إلى إظهار أسرار رئيسية من تاريخ الثدييات القديمة لأمريكا الجنوبية والشيء

على أطراف سهل عشبي منبسط يرعى بهدوء وفي غفلة عن قدرها المهدّد، زوج من الحيوانات الحافرية hoofed grazers التي تشبه الخيول وأحد الحيوانات الحافرية القديمة التي تشبه الظباء والكسلانيات الأرضية ground sloth ويشاركها الغفلة في الجوار حيوان الشينشيللا chinchilla وحيوان كيسى marsupial صغير كالجرذ يقضم البذور وفجأة ينفجر في الأفق بصورة كارثية بركان مغطى بالثلوج، مرسلا فيصا من الرماء الطيني نحو منحدراته الشديدة. وبعد ذلك يتدفق هذا الطين المضطرب بسرعة عبر الأراضي المنبسطة دافنا في طريقه الحيوانات غير المنتبهة له ويقدر ما كان الخراب الناتج من هذا التدفق البركاني مدمرا للكائنات التي دفنها، فإنه قد أصبح هدية لعلم الأحافير (الباليونتولوجيا). وبعد عشرات ملايين السنين من الموت غير المتوقع لهذه الثدييات، فإن القوى البانية للبحال

نظرة إجمالية/ فيض من الأحافير⁽³⁾

- إن عينات أحافير الثدييات، التي تربو على 1500 عينة، المكتشفة في أواسط جبال الأنديز التشيلية تتضمن مجموعة استثنائية من الأنواع الجديدة، إضافة إلى أقدم بقايا القوارض المعروفة في قارة أمريكا الجنوبية.
- تُجسّر هذه الأحافير، التي يراوح عمرها بين 40 مليون و 10 ملايين سنة، الثغرات في التاريخ المعروف لثدييات أمريكا الجنوبية الاستثنائية.
- تؤثّق بعض هذه الأحافير وجود مراعى يعود عمرها إلى 32 مليون سنة، وهي تسبق أمثال هذه الانظمة البيئية في أي مكان آخر في العالم بنحو 15 مليون سنة.

(1) South America's Missing Mammals Overview/ Fossils Galore Tantalizing Discovery

(2) الكسلانيات ثدييات تعيش على الأشجار وتنتمي إلى رتبة الرئيس

(3) حيوان من القوارض بحجم أرنب وله ذنب طويل يعيش في أمريكا الجنوبية

(4) الجزء الجنوبي من الأرجنتين (التحرير)



في هذه اللوحة الفنية تبدو ثدييات عربية فطنت يوما امريكا الجنوبية، وهي نرعى غافلة عن فيض عنيف من الرماد البركاني الطيني سباني فجأة من مركان مجاور وبؤدي إلى هلاكها.

وراقبنا الأرض جيدا، فانا قد نحد أحفورة من الثدييات الصغيرة التي عاصرت الدينوصورات والتي لم تكن اكبر من الزبابة shrew (ثديي من اكلات الحشرات)

وفي اليوم الأخير من رحلة استطلاع دامت أسبوعا عام 1988، انقسم فريقنا المكون من اربعة باحثين لاستكشاف المنحدرات الشديدة المحيطة بجاني نهر «تكويريريك» ومباشرة تقريبا، وصل الاثنان اللذان يعملان شمال النهر إلى طبقة

١. لابة Lava جمعها لابات

٢. حقب الحياة المتوسطة

(التحرير)

أقدام الدينوصورات فيه كان عمر الصخور هو العمر الصحيح نفسه - فقد افترض الجيولوجيون حينذاك أن عمر معظم الصخور على امتداد سلسلة جبال الأنديز التشيلية يعود على الأقل إلى ما قبل 65 مليون إلى 100 مليون سنة. أي إلى الجزء الأخير (الأحدث) من حقب الميزوزوي Mesozoic، وهو الزمن الذي وصلت فيه الدينوصورات إلى أوج تطورها لقد علمنا أن أبا من الرواسب التي تحوي اثار أقدام لا بد وأن تحوي أيضا بقايا عظمية من الحيوانات التي تركت اثار أقدامها فإذا كنا محظوظين جدا

تكشفات كثيرة لصخور مثالية حاملة للأحافير كالغضار والحجر الرملي وتشكلات أخرى متصلة ترسبت في بيئة الأنهار وسهولها الفيضية وقبل زيارتنا الأولى إلى تشيلي، لم يفتش الباحثون بصورة منهجية عن أحافير الحيوانات البرية في المناطق الجبلية لذلك البلد، لأن معظم صخورها صخور بركانية (إذ من المفترض أن تكون اللابات والمواد المدفوعة من البراكين حارة جدا ومخرية لا تتيج حفظ البقايا العضوية)

ومع ذلك قررنا أن نجرب حظنا في أن وادي «تكويريريك» يمكن أن يحوي أحافير خاصة عندما علمنا من تقرير عن وجود اثار

مجموع حيواني جزيري

يعد اكتشاف أي نوع من الأحافير أخباراً عظيمة لنا فإن كانت من الثدييات - وبصورة غير متوقعة من الثدييات الحديثة - كان ذلك أكثر من كاف لحفزنا إلى أن نركز موسمنا الميداني التالي على تلك البقعة بعينها لقد عدنا ثانية إلى وادي تنكويريركا في الصيف الجنوبي من عام 1989، بعد أن ذابت ثلوج الجبال العالية بصورة تتيح للسلطات المحلية إعادة بناء طريق الوصول الضيقة التي تتهدم كل فصل ربيع تقريباً. وفي هذه الرحلة وصلنا إلى موقع الأحافير صباح يوم مشمس صاف من أيام الشهر الأول من العام، مع طاقم مؤلف من سبعة علماء وتجهيزات حملة كاملة. وبسرعة أنزلنا حمولة الحيوانات ونصبنا الخيام بالقرب من نهر صغير وبدأنا بالتفتيش عن الأحافير.

ومما أبهجنا ظهور كُسارات عظمية رائعة وأسنان، وكان ذلك بعد دقائق من بداية تمشيط منحدر التل. فقد برزت، عند طرفي عقيدة من الصخر بحجم حبة البطاطا، جمجمة أكيدة لحيوان ثديي، بدليل وجود عظمتي فكها السفلي المفردتين، من بين صفات أخرى. (تتألف الفكوك السفلي في الزواحف من عظام منفصلة كثيرة). وفيما بعد، سنصف ذلك الكائن رسمياً بأنه نوع جديد من الحافريات القديمة notoungulate، وهي مجموعة غير متجانسة من الحافريات العاشبة يتراوح حجمها بين الأرنب وقرس النهر، وقد انقرضت قبل أقل من مليون سنة. ويحتمل أن هذا النوع الجديد يشبه قليلاً الظبي antelope. فقد كشفت الأسنان التي وجدناها في السنة السابقة أنها تعود إلى أحد الحافريات القديمة الشبيهة بوحيد القرن. ومجمل القول، إنه في أثناء الفصول الثلاثة الأولى من العمل الحقل في تنكويريركا، أحضرنا أكثر من 300 عينة تتضمن جرابيات (كيسيات) marsupials واول كسلانيات early sloth

(١) Finding Fossils (٢) Island Menagene (٣) ننمي إلى حقبة الحياة المتوسطة (٤) حقبة الحياة الحديثة (التحرير)




يجب أن تكون دينوصورات أو وحوش ميروزوية^(١) غريبة أخرى. ولكن ثمة قصة مختلفة يكشف عنها وجود الأسنان المتميزة المعقدة مع طواحن (أضراس) ذات تيجان مرتفعة مستوية القمة ومتعددة الوجوه التي تمتاز بها بعض الثدييات. لقد كانت هذه الثدييات بكل وضوح كبيرة ومتطورة إلى حد بعيد لا يمكن معه أن تكون قد عاشت قبل 50 مليون سنة. ويبدو أن الجيولوجيين كانوا بعيدين كل البعد في تقديرهم لعمر هذه الصخور. وبالفعل، فقد أثبتت التحاليل اللاحقة أن الأحافير الجديدة قد جاءت من حقبة السينوزوي^(٢) Cenozoic، وهي الفترة الزمنية الراهنة من تاريخ الأرض التي بدأت عندما انقرضت الدينوصورات اللاطيرية nonavian قبل 65 مليون سنة. (تُعرف الطيور الحالية بأنها تيرابودات theropods، وبذلك فإنها تمثل مجموعة من الدينوصورات التي لاتزال على قيد الحياة).

الرواسب التي تحمل آثار الدينوصورات، وتابعا بعد ذلك المسير نحو أعالي الوادي بحثاً عن رواسب أخرى يحتمل أن تحوي أحافير. ولكن ما خيَّب آمالهم أن الأحافير الوحيدة التي وجدوها كانت أحافير الأسماك والامونيتات ومخلوقات بحرية أخرى - ولكنهم لم يجدوا زواحف أو ثدييات. وفي الوقت نفسه عاش أعضاء الفريق الذين يعملون جنوب النهر يوماً عصيباً مشابهاً ولكن ارتفعت معنوياتهم عند عصر ذلك اليوم عندما لحوا بضعة أجزاء من العظام والاسنان من بقايا الأحافير تبرز من بقعة كبيرة من رواسب بركانية بنية اللون مائلة إلى الاحمرار تقع على ارتفاع 1000م فوق قاع الوادي. وقد أوضح الفحص أن الأحافير كانت لحيوانات فقارية برية بحجم الحصان الصغير تقريباً.

في البداية، حاولنا أن نقحم هذه الأجزاء الأحفورية في الفكرة السائدة عن عمر الصخور - حيوانات بهذا الحجم

جماعة ممثلي^(١)

في أثناء خمسة فصول من استكشاف وادي «تنگويريريك» باواسط تشيلي، اكتشف فريقنا أحافير 25 نوعا تقريبا من الثدييات. عاشت هذه الحيوانات القديمة قبل نحو 32 مليون سنة، ومعظمها جديد على العلم. وتعرف كمجموعة باسم حيوانات التنگويريريك، وتضم أكثر من 300 عينة فريدة تمثل قوارض أمريكا الجنوبية الأقدم بما في ذلك شكل شبيه بحيوان الشينشिला لم يُسم بعد (1)، وتعد أحافير نوع جديد من حيوان شبيه بالحصان إيومورفيوس (2) *Eomorphippus* وسانتياكوروثيا تشيليانسيس (3) *Santiagorothia chiliensis* الممثل الأقدم لمجموعتين صغيرتين من الحافريات القديمة، أكلات عشب حافرية أصبحت منقرضة في العشرين ألف سنة الماضية. ويتضمن المجموع الحيواني أيضا أكبر تنوع في أمريكا الجنوبية من الحافريات القديمة المعروفة باسم أركيوهيراكوليدس *archaeohyracoids*، من بينها أركيوتيبوتيريوم تينكويريريكينس (4) *Archaeotypotherium tinguiricaense*، تنفرد منطقة تنكويريريك بوجود بسيدوكليبتودون تشيلنسيس (5) *Pseudoglyptodon chilensis* النسب الأقرب المعروف للكسلانيات والحيوان الشبيه بالزبابة: كلوهنيا شاريري (6) *Klohnia charrieri* الجرابي الوحيد من نوعه.



القوارض التي ركبت البحار^(١١)

ومن بين اكتشافاتنا الأكثر أهمية في وادي تنكويريريك، أحفورة أقدم قارض عُرف في أمريكا الجنوبية. هذه اللقبة تعطي دليلا قويا للجدل الدائر حول منشأ خنازير الماء والشينشيليات الحالية وهذه المخلوقات، المعروفة برتبة قوارض كافيمورفا^(١٢) *Caviomorpha*، وأقرباؤها المباشرين، تُولف سلالة قوارض أمريكا الجنوبية الأكثر قدما (وهي متميزة من سلالة القوارض الأحدث المكونة من الجرذان والفئران والمخلوقات ذات

Cast of Characters (١٠)

Seafaring Rodents (١١)

(١) رتبة في الثدييات تتضمن بواكر السنايس والنسانيس والقرود والإنسان
(٢) رتبة من القوارض عاشت في أمريكا الجنوبية من عصر الأوليوسين حتى العصر الحالي (التحير)

القليلة الأولى من عملنا، كان في تنامي تحقيقنا من أن الحيوانات التي وجدناها في وادي تنكويريريك عاشت في أثناء هذه الفترة من تاريخ مجهول سابقا
لقد ساور علماء الأحافير الشك في أنه في أثناء هذه الشفرة الغامضة في السجل الأحفوري، فإن الكثير من السلالات الفريدة بأمريكا الجنوبية دخلت في عملية تنوع سريع جدا وبالفعل، تحوي عيناتنا أقدم تسجيل لعدة مجموعات من الحافريات القديمة وتمثل على الأقل 25 نوعا من الثدييات وجميعها تقريبا أنواع جديدة لم يكتشفها العلم من قبل [انظر المؤطر في هذه الصفحة] وقد شهدت هذه الفترة أيضا وصول القوارض والرئيسات^(١٣)، وكلاهما لم يكن من الثدييات الأصلية التي كانت تقطن أمريكا الجنوبية

ومدرعا *armadillos* وأحد القوارض الشبيه بالشينشिला *chinchilla-like*.
قد تحتاج معرفة الأهمية الكاملة لكشفاتنا إلى سنوات، ولكننا عرفنا مباشرة أننا أمام شيء عظيم احتوت هذه الأحافير الجديدة بكل وضوح على الكثير من المعلومات حول تاريخ ثدييات أمريكا الجنوبية الحالية المتميزة - من بينها الكسلانيات والنسانيس وأكلات النمل والشينشيلانيات. وقد تطورت أسلاف هذه الحيوانات الحالية التي تشمل الكثير من المخلوقات التي وجدناها في وادي تنكويريريك، عندما كانت قارة أمريكا الجنوبية جزيرة. وبسبب حركة الصفائح الأرضية، بقيت أمريكا الجنوبية منفصلة عن الكتل القارية الأخرى معظم 80 مليون سنة التي أعقبت تقطع قارة بنجيا *Pangaea* العملاقة وقسمها الجنوبي، قارة غوندوانا *Gondwana*.
وقد شجعت فترة الانعزال الجغرافي هذه على تطور ثدييات أصلية تكيفت مثاليا مع ظروف هذه الجزيرة وكل شيء غريب مثل الحيوانات الفطرية (الأصلية) *indigenous* في الجزر الحديثة كنسترايا (مثال الهلاتيبوس ذي منقار البط وذب الكوال) ومدغشقر (المشهورة بليمورياتها). وتتضمن أسلاف مجموعات أمريكا الجنوبية الحديثة الاستثنائية الجرابيات القافزة والجرابي السيفي الأسنان «القطط الزائفة» *pseudocats*، وأقرباء المدرع الجهنز بذيل ضخم على شكل هراوة مرصع بأشواك وقوارض بحجم الدببة، وكسلانيات كبيرة بحجم الفيلة، وكسلانيات تسبح في البحر (الكسلانيات السباحة)

جُمعت المعلومات عن أسلاف الثدييات الحالية التي تعيش في أمريكا الجنوبية، من الاكتشافات الأحفورية السابقة في بتاغونيا *Patagonia* ومناطق أخرى، غير أن المعلومات الحاسمة عن الكثير من هذه الأسلاف بقيت محيرة. فقد عرف علماء الأحافير مثلا أن الكسلانيات وأكلات النمل قد بدأت قبل 40 مليون سنة كما فعلت عدة سلالات شاذة هي الآن منقرضة (تتضمن بعض الجرابيات والحافريات القديمة). ولكن لم تكتشف على الإطلاق أحافير تمثل الانتقال إلى المرحلة الثانية من تاريخ الثدييات في أمريكا الجنوبية - منذ قرابة 40 وحتى 30 مليون سنة. والشيء الأكثر إثارة لنا في السنين

مهاجرون أفارقة^(١)

لم تكن نسانيس العالم الجديد ومجموعة قوارض «الكافيومورفا» (تشمل في الوقت الحاضر خنازير الماء والشينشيليات وأقرباءها) من سكان أمريكا الجنوبية الأصليين. ولكنها وصلت قبل 25 مليون سنة عندما كانت أمريكا الجنوبية جزيرة. وقد جادل بعض الباحثين في أن أسلاف الحيوانات عبرت الممر المائي الأقصر نسبياً، أي من أمريكا الشمالية؛ غير أن الأحافير الجديدة المكتشفة في أواسط تشيلي دلت بوضوح على أن حيوانات المجموعتين أكثر انتماء إلى أسلاف في إفريقيا. ومن المحتمل أن الحيوانات الأصلية التي استعمرت أمريكا الجنوبية قد هاجرت من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية على جزر عائمة من النباتات، أو بالية انتشار أخرى نادرة لا نعتقد أنه يمكن تعرفها.



نسانيس: شلسيبوس كاراسكوانسيس^(٢)

جمجمة صغيرة (طولها 5 سم وعمرها 20 مليون سنة) لنسانيس صغير يزن كيلوغراماً واحداً أو أقل، ويمكن أن يشابه القرد الأمريكي الصغير (في اليسار).



قارض: نوع جديد لم يصنف بعد

جزء من فك (طولها 2 سم) لقارض عمره 32 مليون سنة، وهو أحد أقدم اثنين من أحافير القوارض التي وجدت في أمريكا الجنوبية، وهو قد يشابه الأكوتي agouti الحالي (حيوان بحجم الأرنب قصير الشعر والاثنين (في اليسار).



القوارض القديمة في أمريكا الشمالية بها أربع حداثات فقط وتوحي هذه المقارنات بوجود علاقة وثيقة وقوية بين قارض التنكويريريكيا وحيوانات إفريقيا. ويعد عدم وجود أسلاف حيوانات «الكافيومورفا» في طبقات الأحافير الأقدم في أمريكا الشمالية، الذي يبدو مقبولاً، دليلاً داعماً أيضاً لنظرية المنشأ الإفريقي لهذه الحيوانات.

يبدو أن مستعمرة «الكافيومورفا» الأصلية قد ارتحلت من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية على أجزاء من جذوع الأشجار أو أطواف من كتل الأخشاب - للأطلاع على أفضل تخمينات العلماء عن كيفية ارتحال حيوانات ونباتات استثنائية متنوعة إلى الكثير من المناطق المنعزلة جغرافياً [انظر «أسرار حقبة الحياة الوسطى في مدغشقر»، **العلوم** - العددان 5/4 (2003)، ص 56] قد تكون فكرة الرحلة عبر المحيط، التي يصعب تصديقها، غير محتملة الحدوث، ولكنها أكثر احتمالاً في إطار البيئة العالمية قبل نحو 32 مليون سنة وفي ذلك الزمن، كان عرض المحيط الأطلسي الجنوبي في أضيق نفاذه نحو 1400 كم - أي نصف عرضه الحالي - وكانت التيارات البحرية من الشرق نحو الغرب في المناطق المدارية قوية بصورة عرضية.

ربما تكون هذه الظروف قد سمحت برحلة مدتها قرابة أسبوعين ويمكن أن تكون الحيوانات قد دخلت خلالها في سبات (سكون) وبيض منخفض إلى أبعد الحدود خلال أوقات الاجهاد. إضافة إلى ذلك كان مستوى سطح البحر في ذلك الزمن ينخفض (بسبب تشكل مسطحات جليدية على القطب الجنوبي وما حاوره)، ومن ثم، يمكن أن تكون جزيرة بركانية أو أكثر قد شكلت نقاط ارتكاز، وهي الآن مغمورة، مما جعل عملية العبور أكثر سهولة.

أنظمة بيئية واعدة^(٣)

باستخدام طريقة تحديد أعمار جديدة ودقيقة جداً تعتمد على تحليل كميات ضئيلة من غاز الأركون المحتبسة داخل بلورات الصخور المحتوية على الأحافير، حددنا أن قوارض وثدييات «تنكويريريكيا» الأخرى تعود إلى ما قبل 33 مليون إلى 31.5 مليون سنة.

African Immigrants (١)
Emerging Ecosystems (٢)
Chileobius carascoensis (٣)

وللمساعدة على حل هذا النقاش، قارنا التفاصيل التشريحية لحيوان التنكويريريكيا ببقايا القوارض التي وجدت في أمكة أخرى من العالم. وقد جاءت المعلومات الأكثر دلالة من شكل الأسنان الصغيرة التي لا تزال في أمكنتها على الفك السفلي (الفك العلوي والأضراس - الطواحن، لم يعثر عليها حتى الآن) ويدل ذلك الشكل على أن أضراس الفك العلوي لحيوان التنكويريريكيا تحوي خمس حداثات متميزة على سطحها - كما هي الحال في أضراس الفك العلوي في القوارض الإفريقية التي عثر عليها في الفترة الزمنية نفسها وبالمقابل فإن الأضراس العليا لأنواع

القرابة التي وصلت من الشمال (أمريكا الشمالية) قبل نحو 3.5 مليون سنة عندما اتصلت الأمريكتان لأول مرة ببرزخ بنما) ويتفق علماء الأحافير على أن قوارض «الكافيومورفا» الأولى قد وصلت في وقت ما في أثناء الفترة الزمنية الطويلة (من 5.5 مليون إلى 2.5 مليون سنة)، بينما كانت أمريكا الجنوبية جزيرة. ولقد لُحِت أحافير «الكافيومورفا» الأحدث إلى أن الأسلاف أتت من إفريقيا، غير أن الكثير من الباحثين وجدوا أنه من الأسهل أن نتصور أن القوارض المهاجرة قامت برحلة أقصر، أي من أمريكا الشمالية، وربما عن طريق سلسلة من الجزر الكاريبية.



أسنان طويلة التاج

يوضح الفك الأيمن المكسور لعاشب تنكويريريكي بحجم الخروف، الأسنان المقاومة للاهتراء النموذجية للحيوانات التي ترعى في مروج العشب. تمتد التيجان المغطاة بطبقة واقية من المينا بعيداً تحت اللثة نحو نهايات جذور الأسنان - مما يؤمن مواد إضافية لتعويض الاهتراء في أثناء نمو السن.




أسنان قصيرة التاج

يوضح الفك الأيمن السفلي لعاشب تشيلي قديم لم يسم بعد، أن طبقة المينا الواقية تغطي فقط أجزاء التيجان التي تغلق خط اللثة. ومثل هذه الأسنان لا تلائم النظام الغذائي المحتوي على الرمل؛ فهي عادة لحيوانات ترعى الأوراق أو الأعشاب الطرية.

أسنان «تخبر» بكل شيء^(١)

تمتلك معظم أحافير الحيوانات العاشبة المكتشفة في وادي تنكويريريكا بتشيلي، التي عمرها 32 مليون سنة، أضراساً طويلة التاج Hypsodont تشابه أضراس المواشي (الأبقار والأغنام...) الحالية التي تستخدمها في طحن النباتات اللينة الرملية. وتشير هذه الأضراس المتخصصة إلى أن منطقة تنكويريريكا كانت أرضاً عشبية جافة عندما كانت تلك الحيوانات تعيش فيها. وفي زمن أبكر، كانت معظم أمريكا الجنوبية مغطاة بغابات كثيفة وكانت نسبة الأنواع العاشبة فيها ذات الأضراس الطويلة التاج أقل (الخط الأحمر في الرسم البياني). إن تغير المناخ (الخط الأزرق القاتم) إلى مناخ أبرد، ومن ثم أكثر جفافاً، قبل نحو 34 مليون سنة (الخط الأفقي العريض الأزرق الفاتح) يمكن أن يفسر تجفاف الغابات المورقة.



ويشير نمو مسطحات جليد القارة الجنوبية وظواهر أخرى إلى أن المناخ العالمي قد صار أكثر برودة وجفافاً. فإذا عرفنا أن تغيراً مناخياً رئيسياً قد حدث تماماً عندما كانت ثدييات تنكويريريكا تزدهر، فقد دفعنا ذلك إلى تحري ما إذا كانت الحيوانات وبيئاتها قد تجاوبت مع تلك التغيرات.

لقد سمحت لنا قرائن متعددة من الأدلة غير المباشرة بإعادة بناء موطن ثدييات التنكويريريكا، مع أننا لم نجد قط أحافير نهائية من الصخور نفسها وكشف التحليل المبكر لأسنانها عن أن حيوانات «التنكويريريكا» لا بد وأنها عاشت في نظام بيئي مختلف تماماً عن النظام الذي عاشت فيه أسلافها المباشرة ومعظم ثدييات أمريكا الجنوبية الأقدم والمعروفة في الفترة الواقعة بين 65 و 34 مليون سنة حيوانات من أكلات العشب كانت ترعى النباتات الغابية الخضراء النموذجية، مثل أوراق الأشجار والأعشاب (في الواقع، تؤكد الأحافير النباتية أن الغابات المورقة كانت تغطي على ما يبدو مساحات واسعة من أمريكا الجنوبية في أثناء تلك الفترة). فالثدييات التي تاكل هذه الأغذية الطرية، بما فيها البشر، تتمتع بأسنان قصيرة التاج مع غطاء رقيق من المينا الواقية يغطي السن إلى الخط الفاصل مع اللثة.

وعلى النقيض من ذلك، تمتلك معظم حيوانات «التنكويريريكا» العاشبة أسناناً ذات تاج طويل جداً مع مينا يمتد ما بعد الخط الفاصل مع اللثة إلى نهاية الجذر تقريباً، وهذه حالة معروفة باسم **الأسنان الطويلة التاج** hypsodonty. ويجعل مينا السن الإضافي (مينا السن أقسى من عاج السن في باطنه) الأسنان طويلة التاج أكثر مقاومة للاهتراء من **الأسنان القصيرة التاج** brachyodonty. وبكل تأكيد تقريباً طوّرت حيوانات «التنكويريريكا» العاشبة مثل هذه الأسنان استجابة للجسيمات الساحجة الموجودة ضمن الأغذية التي كانت تأكلها، كما فعلت الماشية والظباء والخيول والحيوانات الأخرى التي تاكل العشب الرمل في المروج المفتوحة والسافانا في أمكنة أخرى من العالم. ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن أسنان ثلثي جميع أنواع

مستقلين آخرين حول كمية الأمطار السنوية والغطاء النباتي اللذين كانا سائدين في النظام البيئي القديم في وادي «تنكويريريكا» فقد كشفت التحاليل الإحصائية (تحاليل سينوكرام والموطن الكبير) لعدد من الأنواع مصنفة حسب أحجامها في مجموعات، أن حيوانات «التنكويريريكا» تشابه، إلى حد بعيد، مع المجموع الحيواني الحالي الذي يعيش في سهول العشب الجاف مع رفع من الغابات مثل أجزاء السافانا في إفريقيا أو مواطن «كاتينغاز» Caatingas (منطقة شمال شرق البرازيل) و«شاكو» Chaco (منطقة شمال شرق الأرجنتين) في أمريكا الجنوبية.

وبشيء من الاستغراب، قوبل استنتاجنا بأن موطن «تنكويريريكا» القديم كان مفتوحاً

حيوانات «التنكويريريكا» كانت ذات تاج طويل، وترداد نسبة الكائنات التي تيجان أسنانها طويلة مقارنة بالأنماط السنية الأخرى.ازدياد نسبة الموطن المفتوح، ثم إن نسبة أسنان حيوانات «التنكويريريكا» ذات التيجان الطويلة قد تجاوزت حتى المستوى الملاحظ لدى الثدييات الحالية في الموطن المفتوحة مثل «السهول العظمى» Great Plains في أواسط أمريكا الشمالية.

تقصي هذه النتائج أن العواشب في «تنكويريريكا» كانت ترعى في مروج العشب المفتوحة وليس في الغابات، ولكن الأسنان ليست هي الدليل الوحيد في هذا الاستنتاج فقد رويدنا خريجتنا السابق في الدراسات العليا > > كروفت < > (وهو حالياً استاذ في جامعة كيس وسترن ريزرف) باستنتاجين

The fossil mammals of the Chilean Andes (٢٠٠١)

(التحرير)

(١) ذات ناح سي قصير

أحافير الثدييات في الأنديز التشيلية⁽¹⁾

إن ما أعطى هذه الأحافير كل هذه الأهمية هو ما قدمته من وسائل متقدمة لفهم التاريخ الجيولوجي في هذا القطاع من جبال الأنديز. فالعمر الأحدث غير المتوقع للثدييات القديمة أبطل الافتراضات السائدة حول عمر صخورها المضيفة، مشيراً إلى أن ذلك الجزء من الأنديز قد تشكل على الأقل بعد 70 مليون سنة مما كان يُظن سابقاً، وكان يعتقد لمدة طويلة أن عمر معظم الصخور التي تشكل العمود الفقري للسلسلة الرئيسية لأواسط جبال الأنديز التشيلية، التي سماها ووصفها للمرة الأولى تشارلز داروين، يعود على الأقل إلى 100 مليون سنة؛ كما أن المراحل الأولى لرفعها كانت قديمة بصورة مماثلة. وقد مكن تحديد عمر الرواسب المحتوية على الأحافير فريقنا من أن يحسب، لأول مرة وبدقة، الزمن الذي بدأ فيه هذا الجزء من جبال الأنديز بالارتفاع والتشكل: بين ما قبل 15 مليون و 18 مليون سنة. استمر الرفع على فترات، وما زال يحدث حتى الآن. ومن الواضح حالياً أن الأحواض الواسعة المملوءة بالرواسب قد تشكلت في أثناء المراحل البركانية من التاريخ الجيولوجي للسلسلة الجبلية، وذلك بتشكيل الأنظمة البيئية القديمة في المنطقة، الفريدة من نوعها، وتوفير الوسيلة الكفيلة لحفظ سجل الثدييات القديمة المثير.



تعد الطبقات الحاملة للأحافير التي دُفعت نحو الأعلى وأصبحت شبه شاقولية تقريباً، دليلاً مثيراً على القوى التكتونية التي ضغطت أواسط تشيلي عبر ملايين السنين. وتقع هذه المنحدرات الشديدة بالقرب من بحيرة لاجا Lake Laja الواقعة على بعد 300 كم إلى الجنوب من وادي تنكويريكا.

وبسرعة قادنا عائق غير متوقع إلى الجواب كانت إعادة بناء الطريق المؤدية إلى وادي «تنكويريكا» في ربيع عام 1994 بطيئة على نحو استثنائي، ولكننا لم نعلم شيئاً عن هذا العائق حتى وصولنا إلى مسرح الحدث. لقد تحولنا من الإحباط إلى اغتنام الفرصة. وبداناً بالاستكشاف خارج الوادي.

فقد استكشفنا أودية رئيسية أخرى تُبدي التكتشفات نفسها من الصخور الرسوبية البركانية المنشأ التي تغطي آلاف الكيلومترات المربعة من المناطق الجبلية. لقد حددنا خلال السنوات المتتالية من العمل الحقل أن أحافير الثدييات لم تكن في الحقيقة مقتصره على وادي «تنكويريكا» وأن سيل الحمم البركانية الذي أغرق المروج القديمة لم يكن كارثة منعزلة ولمرة واحدة. وفي الواقع، إن أحداثاً مدبرة كهذه حصلت بصورة متكررة إذا نظر إليها عبر ملايين السنين وفي كل حادثة. تُدفن الرواسب الأقدم تحت طبقات كثيرة من المواد البركانية الانفجارية الإضافية (وما تحويه من عظام) بصورة دائمة إلى أعماق أكبر. وفي النهاية فإن ثخانة هذا التراكم المتطيق من الرواسب (وتحولت إلى صخور) مع الحمم البركانية (اللابات) تربو على 3 كم وفيما بعد ضغط تقارب صفائح القشرة الأرضية (التكتونية) هذا الركام الصلب بشدة نحو الأعلى.

وإن تحاليلنا المستمرة للمجموعات الحيوانية المتعددة التي يراوح عمرها بين 10 ملايين و 40 مليون سنة، تكشف عن أفكار جديدة حول تاريخ المنطقة وأحد مكتشفاتنا الحديثة والاكثر أهمية، من موقع يبعد 100 كم شمال منطقة «تنكويريكا» في حوض نصريف نهر كاشايبوال Cachapoal River، كان الجمجمة الأكثر كمالاتاً حتى الآن لنسنان مبكر من العالم الجديد وهذه الجمجمة التي يبلغ طولها 8 سم، مع ما تحمله من أوقاب وأسنان كاملة محفوظة حفظاً جيداً في الفك العلوي، تنتمي إلى نسنان صغير يزن على الأكثر نحو 1 كغ وهذا المخلوق، الذي دعي شيليسيناس كاراسكوانسيس Caracarasensis، كان يشابه نسنانيس العالم الجديد الحالية، مثل نسنانيس المارموسيت marmoset.

وحتى الآن، ومع ذلك، فإن الاشتباه في أن السهول العشبية نتجت من التبريد العالمي يحتاج إلى إنعام أكثر للنظر ويشكل اختبار إضافي للعلاقة السببية المباشرة وسيلة للبحث في المستقبل.

لا توجد نسنانيس هنا وهناك⁽²⁾

بعد أن تم اكتشاف مثل هذا الكنز الدفين والغني بالمعلومات الأحفورية والبيئية في مواقع متعددة من وادي «تنكويريكا»، بدأنا نفكر فيما إذا كان هذا الجزء من جبال الأنديز «ضربة حظ» أحفورية. وبعد ذلك

وجافاً نسبياً ويحتري على أعشاب وفيرة، ذلك لأن جميع الأدلة السابقة تشير إلى أن السهول العشبية المفتوحة الأولى (الأقدم) على القارات الأخرى لم تظهر إلا قبل نحو 18 مليون سنة. وظهر سهول تنكويريكا العشبية قبل ذلك بنحو 15 مليون سنة قد يكون نجم عن اتجاه المناخ العالمي ليصبح جافاً وبارداً في ذلك الزمن - وربما ازداد الوضع حدة بسبب ظاهرة ظل المطر الناتجة من ارتفاع جبال الأنديز. ويبدو أن السهول العشبية كانت أفضل تلاؤماً مع المناخ الأكثر برودة وجفافاً من الغابات المورقة التي عاشت في أثناء آلاف السنين السابقة

⁽¹⁾ The fossil mammals of the Chilean Andes - No Monkeying Around. -

⁽²⁾ ج وقت eye socket وهو نظرة العين (التحرير)



ونلاحظ بصورة خاصة على العينة (اليمنى) الأسنان الطويلة الناجمة المميزة للحيوانات العاشية. أما المجموعة الأخرى التي تعود لحيوان حافري آخر أكل للأوراق الطرية، يدعى نوتوبيتيسين *notopithecine*، فقد اكتشفت حديثاً بالقرب من نهر تينو *Teno*.



جماجم العواشب، كما شوهدت أول مرة في الحقل، كُفّلت في أرضية خشنة متحجرة مكونة من رماد وطين من اندفاعات بركانية قديمة. وحتى قبل إخراج العظام من الصخر، حدد الباحثون العيشتين كنوعين من الحيوانات الحافرية العاشية المعروفة بالحافريات القديمة *notoungulates*.

إن الأحافير التي اكتشفت في جبال الأنديز التشيلية في طبقات يعود عمرها إلى حقبة السينوزوي، تساعد على توضيح تطور الثدييات. إضافة إلى توضيح التحولات البينية في أمريكا الجنوبية، وهي القارة التي يمثل انعزالها المديد على شكل جزيرة اختباراً طبيعياً رائعاً لدراسة الظواهر التطورية الكبيرة.

الأبعد سير طويل على الأقدام أو ركوبا على الخيول أو حتى باستخدام الطوافة (الهليكوبتر) ونشير هنا، مازحين، إلى «مقولة «اندي»» (سميت كذلك تكريماً لـ «اندره وايس») التي تذكر أنّ الصعوبة في الوصول إلى موقع تكون متناسبة مع كمية ونوعية الأحافير التي سوف نجدها.

والتامارين *tamarin* وكما حدث مع قوارض «الكافيمورفا»، فالخبراء يناقشون منذ مدة طويلة فيما إذا كانت نسانيس العالم الجديد قد نشأت في أمريكا الشمالية أو في إفريقيا ولكن التفاصيل التشرحية لجمجمة النسانس «شيليسيباس» وأسنانه تدم عن إرثه المشترك مع مجموعة الرئيسات التي نشأت في إفريقيا. ومثل ما حصل مع قوارض «الكافيمورفا» يبدو أنّ أسلاف النسانس «شيليسيباس» قامت بطريقة ما بعبور المحيط الأطلسي قادمة من إفريقيا.

بدءاً من المجموع الحيواني في منطقة «تكويريريك» وانتهاءً بالنسانس «شيليسيباس» والمكتشفات المستمرة الأخرى عبر أواسط تشيلي، تُبرهن الرواسب البركانية، التي أهملت في السابق عند التنقيش عن الأحافير، أنّها تحوي عظاماً محفوظة حفظاً جيداً، وأنّها تتضمن الآن السجل الرئيسي لتطور ثدييات أمريكا الجنوبية. ومع مر السنين، توصلنا إلى إدراك واضح لظهور الصخور الواعدة. حتى إنّنا كنا قادرين أحياناً على تعرفها من عدة كيلومترات. لقد حصلنا على هذه الجهود لتخطي صعاب التضاريس الشديدة الانحدار والمسافات البعيدة للكثير من المواقع. وتقع بعض المواقع ضمن بضعة كيلومترات من الطرق الحصى والممرات الرملية، ولا يمكن الوصول إلى معظم الآخر

المؤلفون

John J. Flynn - André R. Wyss - Rwyinaldo Charrier

في العشرين سنة الماضية، تحرّى المؤلفون مع التاريخ الأحفوري المدفون في جبال الأنديز التشيلية «غلاين» هو رئيس وأمين متحف فريك *Frick* التابع لقسم علم الأحافير في متحف التاريخ الطبيعي الأمريكي بمدينة نيويورك وعميد مدرسة الدراسات العليا الجديدة التابعة لهذا المتحف «وايس» أستاذ علوم الأرض في جامعة كاليفورنيا، أما «شاريير» فهو أستاذ الجيولوجيا في جامعة تشيلي سانتياغو ويشكر المؤلفون معلمي الأحافير المتخصصين لدعمهم الاستثنائي لهذا البحث. كما يشكرون المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في سانتياغو والجلس الوطني للنصب التذكارية في تشيلي ومؤسسة العلوم الوطنية في الولايات المتحدة وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) واللجنة الوطنية للأبحاث النقاوية والعلمية في تشيلي.

مراجع للاستزادة

Splendid Isolation: The Curious History of South American Mammals. George Gaylord Simpson. Yale University Press, 1980.

Cenozoic Environmental Change in South America as Indicated by Mammalian Body Size Distributions (Cenograms). Darin A. Croft in *Diversity and Distributions*, Vol. 7, No. 6, pages 271-287; November 2001.

The Tinguiririca Fauna, Chile: Biochronology, Paleoeecology, Biogeography, and a New Earliest Oligocene South American Land Mammal "Age." J. J. Flynn, A. R. Wyss, D. A. Croft and R. Charrier in *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, Vol. 195, No. 3/4, pages 229-259; June 15, 2003.

For more details about the mammal lineages that inhabited South America when it became geographically isolated, visit www.dcpaleo.org/Research/SAMammals/SAMammals.html

Scientific American, May 2007



الحدود المنطقية والرياضياتية

كانت التحديات التي واجهت علماء الرياضيات عبر التاريخ عديدة، بل إن بعضها تطلب قرونا من الجهد للتغلب عليها. ويرى <P. J. دولاهاي> أن اكتشاف استحالات أساسية وإثباتها يعدان جزءا من أبرز عناصر التقدم.

بالمسطرة والفرجار فإن π حل لمعادلة جبرية معاملاتها أعداد صحيحة (مثل المعادلة: $11x^3 - 2x^2 - 3 = 0$) غير أن ليندلمان تمكن من إثبات أن π ليس حلا لاية معادلة جبرية معاملاتها أعداد صحيحة (نقول عن π إنه متسام transcendant وليس جبريا algeb). وهذا يؤدي إلى استحالة تربيع الدائرة. ونلاحظ هنا أن لدينا نتيجة طبيعتها مماثلة لتلك المتعلقة بصمم $\sqrt{2}$ فكما تبين لنا أنه من الخطأ القول إن جميع الأعداد مُنطقَة (أي تكتب على شكل نسبة عددين صحيحين)، فإنه من الخطأ القول أيضا إن كل عدد يمكن كتابته بصيغة حل لمعادلة جبرية معاملاتها صحيحة.

إن الموضوعات الخامسة لإقليدس، وهي مسئلة المتوازيات، حيرت الرياضياتيين خلال زمن طويل. فهل ظهرت هنا أيضا حدود لا يمكن تجاوزها؟

لنذكر بما جرى كان إقليدس قد نصر في كتابه «الأصول» The Elements على مسلمة الهندسة الأساسية، وكانت إحدى هذه المسلمات تكافئ القول إنه «من نقطة مفروضة خارج مستقيم مفروض يمر مستقيم واحد - واحد فقط - يمر من مواز للمستقيم المفروض والغريب، بالنسبة إلى على الأقل، أن الرياضياتيين كانوا يعتقدون بأن هذه المسلمة ليست مستقلة، وأنه ينبغي استنتاجها من باقي المسلمات. وهكذا قضى الرياضياتيون نحو عشرين قرنا محاولين البرهان على مسئلة المتوازيات إلى أن دب

(*) Les limites logiques et mathématiques عنوان مقالة القاهما <P. دولاهاي> في فصر الاكتشاف بباريس، وقد طُرحت عليه الأسئلة الواردة في هذه المقالة من قبل مجلة Pour La Science، وبشرت في العدد 352 من هذه المجلة

وهي الأخت الفرنسية لـ العلوم

(*) انظر أيضا «مواجهة الحدود المنطقية للعلم»، العلوم، العدد 2 (1997)، ص 4

(*) <P. دولاهاي> أستاذ المعلوماتية في جامعة ليل الفرنسية Lille

أبحاثه في مختبر المعلوماتية الأساسية في مدينة ليل

(*) irrational أو غير نسبي، rational منطوق أو نسبي

(*) أو نسبية

(*) هو مؤلف شهير وضعه إقليدس في الهندسة، أسس من خلاله ما يعرف اليوم

بالهندسة الإقليدية (التحرير)

متى تم اكتشاف وجود حدود رياضية

منذ القديم فمن أبرز النتائج التي توصل إليها قدماء الرياضياتيين الإغريق، نحو القرن الخامس قبل الميلاد، اكتشاف أن $\sqrt{2}$ أصم (*) وهذا يعني أنه لا يمكن كتابة $\sqrt{2}$ على شكل نسبة عددين صحيحين. إنها نتيجة بسيطة البرهان (انظر الموطر في الصفحة المقابلة)، وهي تكافئ القول: إن قطر المربع لا يمكن قياسه بضلع المربع كوحدة طول - أي إن وحدة الطول المحددة بضلع المربع لا تسمح بالتعبير عن طول القطر كنسبة عددين صحيحين. في حين كان الاعتقاد السائد يعتبر أن جميع المقادير الهندسية أو الفيزيائية تقبل القياس، ولذا كان اكتشاف أن $\sqrt{2}$ عدد أصم (غير نسبي) بمثابة صدمة.

هل لمحدودية سلطة الأعداد الصحيحة صلة بمسألة تربيع الدائرة التي وضعها أيضا قدماء الإغريق؟

هناك صلة، لكنها صلة ذات طابع رجعي لا أكثر، وذلك عندما ننظر للمسألة بمنظار اليوم. لنذكر أن مسألة تربيع الدائرة التي طرحها «أناكساغور» على نفسه، في القرن الخامس قبل الميلاد، كانت تتمثل في إنشاء مربع، باستعمال المسطرة والفرجار، مساحته تساوي مساحة فرص تحيط به دائرة معلومة، وبعبارة أخرى، يتعلق الأمر بإنشاء مربع مكتفين باستخدام فرجار ومسطرة غير مُدرّجة، أي برسم مستقيميات بالمسطرة وينقل الأطوال بواسطة فتحة رأسي الفرجار. وهكذا تُرَدُّ مسألة تربيع الدائرة إلى الانطلاق من طول معلوم بوصفه وحدة (وهو نصف قطر الدائرة) وإنشاء طول يساوي $\sqrt{\pi}$ وحدة (وهو طول ضلع المربع الذي تساوي مساحته مساحة الدائرة). لقد ظل الجواب النهائي عن هذا السؤال عالقا أكثر من 20 قرنا، ذلك أن الرياضياتي الألماني «P. فون ليندلمان» قدّم الإجابة عام 1882، وكانت الإجابة بالنفي: تربيع الدائرة بالمسطرة والفرجار مستحيل. وقد جاء الجواب عن هذه المسألة الهندسية عام 1837، بعد أن تم إدراك أن الإنشاءات بالمسطرة والفرجار متصلة بسلسلة من العمليات الجبرية الأولية: الجمع والطرح والضرب والقسمة واستخراج الجذر التربيعي. ومن ثم اتضح أنه إذا كان الطول $\sqrt{\pi}$ قابلا للإنشاء،

الشك خلال القرن التاسع عشر في إمكانية تحقيق هذا الهدف وكانت فكرة البرهان على هذه الاستحالة لافتة لأنها أوجت بمفهوم النموذج الذي كان بالغ الأهمية في المنطق الرياضي. ويتعلق الأمر باختيار مجموعة كينونات (رياضياتية) entities، بعضها يسمى نقاطا وبعضها الآخر يسمى مستقيمات: ثم اختيار علاقات بين تلك الكائنات الموافقة لمسلّمات الهندسة وإذا انشأنا مثل هذا «النموذج» الذي تكون فيه جميع مسلّمات الهندسة محققة، باستثناء مسلّمة المتوازيات، وبرهنا على أن هذا النموذج لا يؤدي إلى تناقضات، فإننا نكون بذلك قد أثبتنا بأن مسلّمة المتوازيات مستقلة عن المسلّمات الأخرى. كان «بئترامي» عام 1868 أول من قدم مثل هذا الإنشاء وهو يتمثل في اعتبار (سطح) كرة وتسمية «نقطة» كل ثانية من نقطتين متقابلتين قطريا على سطح هذه الكرة، وتسمية «مستقيم» كل دائرة لها قطر أعظمي على هذا السطح يمكننا عندئذ أن نرى أن جميع مسلّمات إقليدس محققة على هذه الكرة باستثناء مسلّمة المتوازيات. لا يمكن رسم «مستقيم» يمر بـ «نقطة» خارج «مستقيم» D ويوازيه، أي لا يلتقي بـ D. لقد كان هذا الاكتشاف شأنه شأن اكتشاف الاستحالات الأخرى، مثمرا لأنه ولّد هندسات غير إقليدية.

هل توجد حدود لا يمكن للاستدلال الرياضي ذاتها أن يتجاوزها ؟

يمكن أن يمس المنطق الرياضي النظريات الرياضية ذاتها، أي القضايا التي يمكن البرهان عليها انطلاقا من بعض المسلّمات وهذا شأن تطور المنطق الرياضي وفي هذا السياق هناك نتيجة استحالة شهيرة هي اللاحسمية the undecidability التي توصل إليها «كوديل» ما بين عامي 1930 و 1931. كان عالم المنطق النمساوي «كوديل» قد برهن أنه إذا أخذنا مجموعة من المسلّمات نتيج تطوير حساب الأعداد الصحيحة فإنه توجد خواص صحيحة تتعلق بهذه الأعداد سنكون لاحسمية، أي خواص صحيحة إلا أنه من المستحيل إثباتها اعتمادا على مجموعة المسلّمات التي انطلقنا منها. لقد صادفتنا حالة مماثلة في الهندسة أن مسلّمة المتوازيات مسلّمة لاحسمية. إذ إننا نستطيع إضافة هذه المسلّمة، أو إضافة نقيضها، إلى مجموعة المسلّمات الهندسية من دون أن يترتب على ذلك تناقضات. والواقع أن نظرية «كوديل» أقوى من ذلك فهي تنصّ على أن كل نظام مُسلّم مُتَمِّم متين بحيث يمكن تطوير الحساب الأولي، فإن هذا النظام ينحوي حتما على عبارة صحيحة لكنها لاحسمية. وحتى إن رفعت هذه العبارة إلى مرتبة المسلّمة، فإن النظام المُسلّم الحاصل عليه بهذه الطريقة سيخضع بدوره لحكم نظرية «كوديل»، حيث ستظهر مجددا عبارة أخرى صحيحة، لكنها لاحسمية (يوضّح برهان «كوديل» كيفية إنشاء هذه العبارة الجديدة) وهكذا دواليك. ومن ثم يتبيّن أنه لا يوجد نظام مُسلّم كامل إنها نتيجة مُحَدِّدة محيرة جدا، وقد تمت مناقشتها كثيرا. وهي نتيجة مركزية في كل تفكير حول طبيعة الرياضيات

(4) Prouver l'irrationalité de $\sqrt{2}$

(5) l'indécidabilité ou «عدم قابلية البت»

(6) انظر «كوديل وحدود المنطق» العلوم العدد 10 (2001)، ص 40



حسب مبرهنة الألوان الأربعة التي تم البرهان عليها عام 1976 فإن أربعة ألوان تكفي لتلوين أية خريطة مستوية بحيث يكون لونا كل بلدان متجاورين (بافتراض أن كلا منهما بشكل منطقة واحدة) مختلفين (هنا المحيط يحيط بخريطة ولا يمثل لونا خامسا). كان إثبات هذه المبرهنة أول برهان اعتمد بشكل أساسي على عمل الحاسوب.

البرهان على أن $\sqrt{2}$ عدد أصم (غير نسبي)

لإثبات أن $\sqrt{2}$ لا يكتب على شكل نسبة عددين صحيحين، يمكننا الاستدلال بالخلف proof by the absurd: نفترض أن هذا العدد يكتب على الشكل p/q ، حيث p و q عددان صحيحان، ثم نبرهن على أن ذلك يؤدي إلى تناقض. نستطيع اختيار p و q بحيث لا يكون الاثنان زوجيين معا (ولا اختصرنا 2 في الكسر) نربّع طرفي المساواة المفترضة، وهي $\sqrt{2} = p/q$ ، فنحصل على المساواة $p^2 = 2q^2$ التي نستنتج منها أن p زوجي (لأن مربع عدد فردي يساوي عددا فرديا) يسمح ذلك بكتابة $p = 2p'$ ، حيث p' عدد صحيح وهكذا نحصل بعد التعويض على $4p'^2 = 2q^2$ ، أي $2p'^2 = q^2$ ومن ثم نستنتج أن q زوجي أيضا. وهذا تناقض لأننا انطلقنا من كون p و q ليسا زوجيين في آن واحد. وعليه فالفرضية الأولى القائلة بأن $\sqrt{2}$ يكتب على الشكل p/q ، هي فرضية خاطئة

ومع ذلك كانت هناك معوقات في الرياضيات قاومت طويلا، لكنها استسلمت في نهاية المطاف. هل بالإمكان أن نعطينا أمثلة على ذلك ؟

هناك في جميع مراحل تاريخ الرياضيات، مُخَمَّنَات conjectures - وهي خواص تبدو صحيحة ومهمة، غير أننا لا نستطيع البرهان عليها. وقد قاوم بعضها عدة قرون قبل أن يتم البرهان عليها، في حين ظل بعضها الآخر يتحدى الرياضياتيين إلى يومنا هذا. رأينا مثلا على ذلك في العدد π وتربيع الدائرة: كان التخمين في مطلع القرن التاسع عشر يرى أن العدد π عدد متسام transcendant، ومن ثم فتربيع الدائرة قضية مستحيلة. وهذا ما أثبتته فعلا «ليندلمان» بعد نصف قرن، وكان ذلك عام 1882. وهناك مثال آخر يتعلق بمخمنة الأعداد الأولية تعطي تقديرا لندرة الأعداد الأولية (وهي الأعداد التي

تمثل نظرية كوديل نتيجة مُحَدَّدة محيرة جدا، وهي نتيجة مركزية في كل تفكير يتعلق بطبيعة الرياضيات.

لا تقبل القسمة إلا على 1 أو على ذاتها) عندما تتزايد (هذه الأعداد) في الكبر وكان «كاوس» قد تنبأ بالنتيجة عام 1792، لكن البرهان عليها أتى بعد أكثر من قرن (كان ذلك عام 1896) على أيدي «آدامار» و«دي لافالاي بوسين» (كلُّ على حدة). والثالث للانتباه أنه توجد مخمنة أخرى تقدم توضيحا إضافيا بخصوص تناقص كثافة الأعداد الأولية، إنها «فرضية ريمان Riemann». وقد تمت صياغة هذه المخمنة عام 1850، ومازالت حتى الآن من دون برهان، وهي تشكل اليوم إحدى أهم مخمنات الرياضيات ويبقى أن نعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بعائق ظرفي أو أنه يعكس صعوبة أكثر عمقا

هل تُطرح هذه القضية بخصوص مخمنات أخرى عصية ؟

نعم، لقد طرحت على سبيل المثال في حالة مخمنة فيرما Fermat التي أصبحت نظرية عام 1994، بفضل «أ. ويلز»⁽¹⁾، وذلك بعد مضي 350 سنة على ظهور نصها (تقول النظرية إن المعادلة $x^p + y^p = z^p$ لا تقبل حلا لـ x, y, z من الأعداد الصحيحة الموجبة إذا كان العدد الصحيح p أكبر من 3 أو يساويه). وفي العصر الحديث تسأل بعضهم، أمام عناد مخمنة فيرما - وقد حدث هذا أيضا مع مخمنات أخرى - عما إذا كان الأمر يتعلق بعبارة لاحتمية لكن هذا القول لا يحمل معنى إلا إذا وضحنا نظام المسلمات الذي نعتقد أن فيه عبارة لاحتمية. ذلك أنه لا توجد عبارات لاحتمية بصفة مطلقة، فليس هناك سوى لاحتمية نسبية، أي بالنسبة إلى نظام مسلمات معين.

هناك نظريات لم يتم البرهان عليها إلا باستخدام الحاسوب، ألا توجد هنا محدودية لسلطة الرياضياتيين ؟


سوف أعرض مثلا يوضح ما هو الوضع اليوم. لقد كانت أول مسألة تم حلها باستخدام الحاسوب استخداما أساسيا هي مسألة الألوان الأربعة four colour problem. تنص هذه المسألة على أن كل خريطة جغرافية مستوية (مهما كانت تعقيداتها، شريطة أن يتشكل

كل بلد من منطقة واحدة) تتطلب فقط أربعة ألوان لتلوينها بشكل يكون فيه لونا كل بلدين متجاورين مختلفين. وقد لاحظ هذه الخاصية أحد علماء الخرائط الإنجليز عام 1852، لكن البرهان لم يقدّم إلا عام 1976 على أيدي الرياضياتيين الأمريكيين «ك. أيل» و«W. هاكن» غير أن برهانهما تطلب، فيما تطلب، استعراض عدد ضخم من التشكيلات، وهو العمل الذي كُفّف بإنجازه الحاسوب، ذلك أنها مهمة شاقة لا يمكن القيام بها يدويا. وعليه كان لزاما أن ننق في الحاسوب لتصديق برهان هذه المسألة وهنا كان البعض منزعجا من عملية تحويل السلطة للآلة، إلا أن عمل الحاسوب يمكن أن يراقب من خلال حاسوب آخر. وقد تمّ بعد سنوات إدخال بعض الاختصار على البرهان. ومن ثم، صارت اليوم بعض البراهين التي ساعد على إنجازها الحاسوب براهين مقبولة في معظم الأحيان، شأنها شأن البراهين التي يقوم بها الرياضياتيين يدويا من أولها إلى آخرها. والملاحظ أن هناك وضعيات لم تُثر الكثير من التردد. مثال ذلك المخمنة المسماة مخمنة روبينس Robbins التي صيغت عام 1933، وحُلّت عام 1996 بواسطة الحاسوب غير أن البرهان المقدم من قبل الحاسوب كان قصيرا نسبيا، فتم التأكيد منه يدويا، ومن الواضح أن ذلك أفضل.

هناك أيضا حالات تظل فيها مسألة تصديق البرهان عالقة...

هذا صحيح، وهو ما حدث في مخمنة كيبلر Kepler التي تقول إن التكديسات الأكثر كثافة لكرات منطابقة لها (التكديسات) الكثافة نفسها التي نجدها بوجه خاص لدى باعة البرتقال تعتبر تنصيذا طبقيًا توضع فيه الكرات وفق شبكة مربعة، وتنصيذا طبقيًا آخر وفق شبكة مثلثية. إن لهذين التنصيدين الكثافة نفسها، وهي تساوي $\pi/\sqrt{18}$. والمطلوب هو إثبات أنها تمثل الكثافة الأعظمية كانت هذه المسألة مطروحة منذ مطلع القرن السابع عشر. وفي عام 1998 قدم الرياضياتي الأمريكي «T. هيلس» برهانا على مخمنة كيبلر، وهو عمل تطلب الكثير من الحسابات المعقدة قام بها الحاسوب، ولا يمكن التأكيد منها يدويا. ثم إنه لا يستبعد أن ترتكب البرامج الحاسوبية المستخدمة في هذه الحالة أخطاء حسابية، لذا ثمة صعوبة في التحقق من البرهان. والجدير بالذكر هنا هو أن لجنة الخبراء التي كُلفت بفحص برهان «هيلس» قبل الموافقة على نشره لم تبت بشكل نهائي في صلاحية البرهان، لأن هؤلاء الخبراء لم يقوموا بما يكفي من الحسابات التي تمكنهم من التحقق من البرهان ولحل هذا الإشكال، اقترح «هيلس» حلا تمّ العمل به عام 2005 بخصوص مسألة الألوان الأربعة. يتمثل ذلك في إعداد صيغة للبرهان (تكون فيها جميع مراحل الاستدلال والحسابات معروضة على شكل قواعد منطقية صورية تعمل ضمن نظام مسلماتي مفروض). ثم التحقق من البرهان بواسطة الحاسوب. إن جعل العمل على شكل قواعد أمر ليس بالسهل، لكنه سيسرّ التأكيد من صحة البرهان من خلال الاداة المعلوماتية. وهنا لدينا ناحية ذات أهمية خاصة: إن الحاسوب لا يساعد على إثبات النتائج فحسب بل يساعد أيضا على التأكيد من براهين طويلة ومعقدة. وفي بعض الحالات الخاصة يبدو الحاسوب الاداة الوحيدة التي يمكنها توفير ضمان أخير للمصادقية.

(1) انظر «ميرمنة فيرما الأخيرة»، العدد 1 (1999)، ص 26



مربعة في اليسار). وفي عام 1998، اقترح برهان طويل ومعقد على هذه المخمئة، لكنه لم يتم التصديق عليه لغاية الآن: بعض أجزاء هذا البرهان تستخدم برامج حاسوبية يعتبر النأكد من صحتها بالغ الصعوبة.



نص مخمئة كيبلر Kepler على أن التكدسات الأكثر كثافة لكرات متطابقة، لا تتجاوز كثافتها (التكدسات) $\pi/\sqrt{18}$ وهي كثافة التكدسين المنتظمين المثلثين هنا (شبكة مثلثية في اليمين، وشبكة

لنأخذ على سبيل المثال مربعات السودوكو "sudoku" التي تكون شبكاتها بحجم $3^2 \times 3^2$ (9 x 9)، والتي يمكن تعميمها إلى حجومات أكبر، مثل $4^2 \times 4^2$ ، $5^2 \times 5^2$ ، إلخ. ويمكن أن يكون حل مسألة من مسائل السودوكو بالغ الصعوبة، والشائع أن الصعوبة تتزايد مع ازدياد حجم الشبكة. فقد تم بالفعل البرهان على أن حل مسألة السودوكو ذات الحجم $n^2 \times n^2$ بالغ الصعوبة، بمعنى أنها مسألة NP-تامة⁽¹⁾. NP-complete ويدل الانتماء إلى هذا الصنف من الصعوبة على أن المدة اللازمة لحل مسألة سودوكو $n^2 \times n^2$ تتزايد أسياً مع n . غير أننا لن نكون متأكدين من ذلك إلا عندما نبرهن على أن كل مسألة «NP-تامة» مسألة صعبة أسياً. ذلك هو بالضبط موضوع المخمئة $P \neq NP$. وثمة العديد من الرياضياتيين والمعلوماتيين الواثقين من صحة هذه المخمئة، لكن لا أحد منهم استطاع الإتيان ببرهان عليها. والخطر من ذلك أن هناك من يدرس بجد احتمال أن تكون المخمئة $P \neq NP$ لاحتمية ضمن النظام المسلماتي المعتاد للحساب، إلا أنه لا يتوافر لدينا حتى اليوم أي مسلك قد يؤدي إلى برهان هذه المخمئة، إذ إن جميع الطرائق فشلت في هذا المضمار. إننا أمام لغز كبير، طرحته دعوى ($P \neq NP$) تبدو بديهية، لكننا لا نرى سبيلاً إلى إثباتها ■

(1) طرح الألماني «D» هيلبرت (1862 - 1943) عام 1900 في المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات 23 مسألة رياضية معقدة شغلت منذ ذاك التاريخ جميع الرياضياتيين وقد أدى ذلك إلى ظهور فروع رياضية جديدة. وفي عام 2000، وأسوة بـ «هيلبرت»، يادر الأمريكي «دا كلاي» [مؤسس معهد كلاي للرياضيات] إلى تمويل جائزة بسبعة ملايين دولار من أجل حل سبع مسائل رياضية مستعصية سميت مسائل القرن الحادي والعشرين.

(2) لعبة السودوكو السودوكو مربع يحمل جدولاً يتكون من 9 أسطر و 9 أعمدة، ويُقسم المربع إلى مربعات صغيرة تحمل جدولاً ب 3 أسطر و 3 أعمدة صغيرة يمثل أجزءاً من الخانات بالأعداد من 1 إلى 9، ويطلب أن نملأ باقي الخانات بالأعداد من 1 إلى 9 بحيث لا يتكرر العدد نفسه في العمود نفسه، ولا في السطر نفسه، ولا في أي مربع من المربعات الصغيرة. ثم تطورت هذه اللعبة وأصبح المربع الكبير يحمل أكثر من 9 خانات عمودياً وأفقياً. انظر «العلم وراء لعبة سودوكو» - «العلوم» - العددان 7/6 (2005)، ص 22.

(3) انظر: «حدود البحث عن سبب» - «العلوم» - العددان 4/3 (2006)، ص 11.

هل بإمكانكم تقديم بعض الأمثلة حول مخمئات كبرى تعتبر مهمة. ومع ذلك ظلت بمثابة مسائل مفتوحة ؟

ثمة أنواع متعددة من المخمئات الرياضية، بل وضعت كتب خصصت بأكملها لعرض مسائل غير محلولة كما توجد بعض المسائل الشهيرة المتميزة ببساطة طرحها أو بأهميتها البالغة. وقد أشرت أنفاً إلى فرضية ريمان. وهناك أيضاً مخمئات حسابية من مميزات سهولة طرحها، وهي تبدو كالنواذر، لكنني لا أعتقد أنها كذلك. وإحدى هذه المخمئات مخمئة الأعداد الأولية التوائم ثمة

كأن للحاسوب المساعدة على إثبات بعض النتائج، لكنه يستطيع أيضاً المساعدة على التحقق من براهين طويلة ومعقدة.

اعتقاد بأنه يوجد عدد غير منته من أزواج الأعداد الأولية التوائم، أي أزواج الأعداد الأولية التي يساوي الفرق بين عددي هذه الأزواج 2 (مثل الأزواج 17 و 19؛ 59 و 61؛ 827 و 829؛ ...)، وفضلاً عن ذلك يلاحظ أن تناقص الأعداد الأولية التوائم في مجموعة الأعداد الأولية هو من المرتبة نفسها التي تناقص وفقها الأعداد الأولية في مجموعة الأعداد الصحيحة جميعها. غير أنه لم يتم البرهان على وجود عدد غير منته من الأعداد الأولية التوائم، ولا على تناقص كثافتها وفق القانون الذي توحي به المشاهدات. كما أن هناك مسألة حسابية شهيرة، هي مخمئة كولدباخ Goldbach التي تنص على أن كل عدد زوجي صحيح أكبر من 2 يكتب دائماً على شكل مجموع عددين أوليين (مثال: $44 = 7 + 37$).

هل هناك وعود بمكافأة مالية لحل بعض كبرى المخمئات...

نعم، وهذه هي حال المخمئة المسماة $P \neq NP$ ، التي تعتبر واحدة من المسائل الرياضية السبع التي خصصت لها عام 2000 مكافآت (مليون دولار لكل منها) من قبل معهد كلاي Clay⁽¹⁾، ومخمئة $P \neq NP$ قضية عميقة تتناول موضوع الصعوبة في المسائل المطروحة.

قوة المحولات الريبية⁽¹⁾

إن اكتشاف بقايا من عالم منسي تُسيّره جزيئات
الـ RNA قد يقود إلى وسائل جديدة لمكافحة الأمراض.

Dr. E. Barilko - R. K. Brikar

القواعد (الأسس) الفتروجينية الأديني والتايمين والسيورين والكوانين، التي تنتظم مرتبطة بعمود فقري يتعاقب فيه السكر والفسفات إن ما يبلغ تسعين في المئة من دنا بكتيرية نمطية مكرس لتعليمات تكوّن وتجميع قطع ماكينة البروتين، التي تسرع وتنظم الخطوات الكيميائية للاستقلاب الضروري لبناء خلية جديدة من لاشي.

وتُستهلك تلك السيورورة في أرضية المصنع الخلوي، عندما تشرع إنزيمات بوليميراز الرنا في الإمساك بالدنا الجينومي، وتبدأ بنسخ أجزاء من مثله على شكل الجزيئات الكيميائية المماثلة من الرنا (الحمض النووي الريبسي المرسال) (mRNA) وتكون الخلايا البكتيرية على عجلة من أمرها لدرجة أنه ما إن يكاد يشرع جزيء من البوليميراز في قراءة رسالة الدنا وفي نسخها، حتى يزحمه جزيء آخر من الإنزيم، متلف لبدء النسخة التالية من الرنا ويكوّن معظم الرسائل بروتيناً مفرداً، مع أن بعضها، ويُعرف بالـ **أوبيرونات** (المشغلات) operons، يصف كيفية صنع طاقم تام من البروتينات المتصلة تشغيلاً بعضها ببعض ويُعدّ الرنا من الناحية الكيميائية أقل شيئا من الدنا، وتتعامل الخلية البكتيرية مع هذه النسخ المتعددة من الرنا المرسال (mRNA) وكأنها صور ضوئية ورقية فسرعان ما تُمزق نسخ الرنا المرسال غير المستعملة وتعيد دورتها. وبذلك تُورع فقط

المُمرضات البكتيرية على المحولات الريبية كي تضبط أوجها مختلفة من الاستقلاب الأساسي الحاصرها إن استمرار هذا الشكل القديم من التنظيم الذاتي في الكائنات الحية الحالية يشهد على أهمية هذا التنظيم فالخلايا البكتيرية تتمتع بتلاؤم مدّش ويكونها مصانع كيميائية ذاتية الاعتماد مكرسة لصنع منتج واحد نهائي نسخ لانهاية (متصلة) من ذاتها لكن فقط الذراري - التي نمكنت من الحفاظ على هذه السلسلة السريعة من السُّلالات - في وجه ذلك التنافس المهلك على الموارد في نباتات متغيرة - هي التي بقيت حية هذا الأجل

ضبط المخزون⁽²⁾

إن مقدرة البكتيرية على صنع منات الجزيئات المعقدة المطلوبة لتضاعف (تتنسخ) ذاتيا خلال فترة تبلغ في قصرها عشرين دقيقة، تبدأ بجينوم الدنا DNA المزوج الشريطة، الذي ينسخه كل كائن حي، جيلا إثر جيل، نسخا صحيحا مطابقا للأصل. إن كتيب التشغيل هذا مكتوب بالـ **ألفا**، النكليوتيدات الأربعة للدنا، أي

في خريف عام 2000، أثار فضولنا لغز يتعلق بالطريقة التي تتدبر بواسطتها البكتيرات أمر فيتايميئاتها فاضافة إلى الدليل المتزايد الذي يدعم النظرية المثيرة للتحدي المتعلقة بالحياة الباكّة على الأرض: جنبا إلى جنب مع جهودنا الخاصة لبناء **محولات** switches، بدءا من جزيئات بيولوجية، فإن الاحية البكتيرية وجهة مجموعتنا المخبرية في جامعة ييل للبحث عن حل لهذا اللغز. وما وجدناه كان مفاجأة تفوق كثيرا في غرايتها ما توقعناه. كان شكلا جديدا من أشكال الضبط الخلوي الذاتي، عماده واحد من أقدم أنماط الجزيئات المعروفة في الخلية، إنه الحمض النووي الريبسي، أو الرنا RNA.

ومع أنه عُذ بصورة أساسية ولروح طويل من الزمن **مرسالا** متواضعا، فقد كان يمكن أن يصير للرنا، كما اتضح فيما بعد، سلطان مهم واليات معقدة كي يفرص الاعتراف بحقوقه ومع أن وظائف هذا الصنف الحديث الاكتشاف من جزيئات الرنا التي أطلقنا عليها اسم **المحولات الريبية** riboswitches لا تزال قيد التوصيف، فمن الواضح فعلا أنها قد تقدم طرائق جديدة لمكافحة الأمراض البشرية فمثلا، تُعول كثرة من أنواع

نظرة إجمالية/ منابله محولات بالغة القدم⁽³⁾

- تعود مهمة تنظيم فاعلية الجينات عادة إلى بروتينات المراقبة، ولكن بكتيرات معينة تستعمل رسائل الرنا كي تشرّف على بعض البنى التحتية الخلوية القيمة.
- إن أشكال الرنا ذات القدرات الشبيهة بالبروتينات تقدم دعما لفرضية عالم أولي يحكمه الرنا.
- إن المحولات الريبية التي اكتشفت حديثا هي مجموعة من جزيئات رناوية، تحمل رسائل تُنسخ من الدنا، وتتخذ أيضا القرارات اللازمة فيما إذا كان يجب تنفيذ تلك التعليمات المتضمنة في الرسائل.
- تنظم المحولات الريبية عددا كبيرا من السيورورات الأساسية في الميكروبات؛ وهذا يجعل تلك المحولات أهدافا محتملة لعقاقير جديدة مضادة للميكروبات.

THE POWER OF RIBOSWITCHES (1)

Inventory Control (2)

Overview: Flipping Ancient Switches (3)

(1) جمع بكتيرة

(2) messenger أو رسول

turned chain of descent (3)

text (4)

operationally related proteins (5)

pacer photocopies (6)

النسخ ذات أوامر التشغيل الطازجة على الريبوسومات: ماكينات مصنع بناء البروتينات

كما أن الريبوسومات هي الأخرى، على عجلة بالغة من أمرها، فتصطف نمطيا كالشاحنات الصندوقية للقطار، كي تشرع في قراءة وتنفيذ تعليمات الرنا المرسال، حتى قبل أن ينهي تماما إنزيم البوليميراز نسخ الرنا المرسال. فالريبوسومات تتحرك برشاقة على طول مسار الرنا المرسال لتحل (تفك) كود كل ثلاثة من ثلاثيات النكليوتيدات المتعاقبة، مترجمة إياها إلى الحموض الأمينية النوعية التي تُكوِّدها، وتضيفها إلى السلسلة الببتيدية النامية ومع انبثاق الجزيء البروتيني من الريبوسوم، فإنه يتثنى على نفسه ليشكل بنية ثلاثية الأبعاد معقدة، وتتحرر بذلك قطعة جديدة من الماكينة وتغدو جاهزة للقيام بوظيفتها.

وتعتمد الخلية اعتمادا خاصا على فئتين من البروتين كي تُبقي على إنتاجها الكيميائي ناشطا على نحو سلس: البروتينات الناقلة التي تحمل جيئةً وذهابا المواد الأولية، والإنزيمات التي تسرع استحالة تلك المواد عبر خطوات متعاقبة في دوائر الاستقلاب ومسالكه ذات السرعة البالغة. ولكن البكتيريا حريصة على ألا تبدد شيئا من مواردها بصنعها بنى تحتية غير ضرورية لذا فقد أنشأت آليات ضبط تستطيع إعاقة نقل أوامر تشغيل تلك التجهيزات كاستجابة لتغيرات في احتياجها إلى المغذيات^(١)، ومبلغ تيسر الحصول على هذه المغذيات وما إن فهم العلماء الكيفية التي تعمل وفقا لها تلك المراقبات الخلوية، حتى برز، بادئ ذي بدء، سر تدبير أمر القيتامينات.

نمطيا، توظف البكتيريا عددا من البروتينات تتفحص باستمرار المخزونات المتاحة من المواد الأولية المختلفة، وتعديل وفقا لذلك عدد البروتينات الناقلة والإنزيمات المخصصة لكل خط من خطوط الإنتاج. فمثلا الكابت Lac repressor^(٢) في بكتيريا المعى «الإشريكية القولونية» هو معقد بروتيني يحصر حرية الوصول إلى النسخ الأصلية^(٣) للدنا لكل من البروتين الناقل الذي يضح سكر اللاكتوز (سكر اللبن) داخل الخلية، كما يحصر إنزيما



للبكتيريا إلى هذين البروتينين، فإنه يرزم (يلف) النهاية الموجّهة (القائدة) لتعليمات الرنا المرسال حول ذاتها رزما محكما وهذا الرزم يمنع الريبوسوم من تعرف موقع وظيفي صحيح على نسخة الرنا المرسال الخاصة بالبروتين الناقل كي يشرع في الترجمة إن صادرة^(٤) النهاية الموجّهة لشريطة الرنا المرسال المتكونة تتسبب في انثناء سائر الشريطة على شكل دبوس الشعر تتربط شُعبيتاه إحداهما بالأخرى بتزاوج (تشافغ) النكليوتيدات

(١) أو الريباسات أو الحسيمات الريبية
(٢) factory's protein-building machinists

(٣) أو المغذيات

(٤) Lac، أوبيرون لازم لنقل سكر اللاكتوز واستقلابه في الإشريكية القولونية وبعض البكتيريا المعوية الأخرى. ويتكون من جينة منظمة وجينات تركيبية

(٥) blueprints

(٦) Lac complex

(٧) sequestration

(التحرير)

بشطر جزيء اللاكتوز إلى جزيئين منفصلين ليصبح بذلك متاحا للاستعمال كوقود عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. وحالما يصبح تركيز اللاكتوز فوق عتبة معينة، فإن معقد Lac^(٥) ينفصل عن قالب template الدنا، فيزول فعله الكابت. الأمر الذي يسمح باستهلال انتساخ الجينات

إن الية تنظيمية مماثلة، تعتمد على بروتينات مراقبة، تقرر ما يجب فعله بشرائط الرنا المرسال التي انتسخت من الدنا الجينومي ففي بكتيريا التربة «العصوية الرقيقة» *Bacillus subtilis* يوجد معقد بروتيني، يعرف باللفظة الأوانلية TRAP، يتحكم في أوبيرون (مشغل) يكود إنزيمات خاصة بتركيب الحمض الأميني «ترتوفان» كما يتحكم في أوبيرون آخر يكون ناقل الترتوفان. فعندما يتحسس المعقد TRAP أنه لا حاجة

المتنام، الأمر الذي يؤدي إلى إنها انتساخ الرسالة على نحو مبتسر (قبل الأوان) [انظر المؤطر في الصفحة المقابلة].

إضافة إلى هذه التجهيزات الخاصة بتنظيم ماكينة تصنيع البروتينات الخلوية الأساسية، فإن البكتيريا تتجول حاملة صندوق أدوات ضخما، تصنع بواسطته مواد كيميائية دخيلة. فمثلا، علينا نحن البشر أن نحصل على المغذيات، التي نسميها فيتامينات، مما نأكل: في حين أن البكتيريا تعرف كيف تصنعها بتجميعها من لاشي. إن مجموعة كبيرة من الفيتامينات الأكثر تعقيدا هي في الواقع نسخة محوَّرة من تميمات الإنزيمات^(١) coenzymes. إنها، كما يلح إلى ذلك اسمها، جزيئات صغيرة تساعد الإنزيمات البروتينية على إنجازها وظائفها.



بذات صلة، وبغية فهم كيف حدث ذلك، لا بد إننا من العودة ثانية إلى الريبوسوم.

ميراث عالم الدنا^(٢)

قد تشكل البروتينات العجلات وأسنان العجلات والقنوات والأحزمة (السيور) التي تنقل المواد الأولية إلى داخل خلايا جديدة، ولكن ليست جميع التجهيزات الأساسية في المصنع (الخلية) مبنية من البروتين. والأكثر جدارة بالذكر أن للريبوسوم لباً يتكون من النكليوتيدات ذاتها التي تشكل رسائل الرنا المرسال التي يقرؤها. ومع أن الرنا الريبوسومي^(٣) (rRNA) يستهل كنسخة من شريط التلغراف الكاتب^(٤) لنسخة الدنا الأصلية، فهو يختلف عن الرنا المرسال في

كانت هذه النسخ الضوئية تنثني كأوراق أوريغامي^(٥) ممسوسة^(٦)، وتختار مصائرها الذاتية.

أنه لا يحتوي على تعليمات لصنع شي آخر. وبدلاً من ذلك، فإن الرنا الريبوسومي ينثني أنياً على نفسه في شكل محدد تماماً، تترايط في داخله قواعد النكليوتيدات بعضها ببعض، فتتشابه كثيراً مع الحلقة الطرفية المهيبة لدبوس الشعر.

وينثني الرنا الريبوسومي على نطاق أكبر بكثير، ليتضمن عدداً من الوحدات التي تتقوى مواضعها أكثر فأكثراً بتحويلات كيميائية دقيقة ويقوى قوام البروتين ودعمته أفلا^(٧) هذه الوحدات subunits ويغلف سطوحها. لكن دراسات البنية بالتحليل الذري أوضحت أن لب الريبوسوم المسؤول عن تحفيز تكوين الروابط الجديدة بين الحموض الأمينية، يتألف حصراً من الرنا.

ومما لا ريب فيه أن البراهين الحديثة على بنية الرنا دي المقدرة البروتينية التحفيزية كانت موضع إثارة لدى حسني الاطلاع على نظرية بداية الحياة التي تقدم بها في نهاية السبعينات <H هايت III> [من جامعة ديلاوير] فقد لاحظ هذا الباحث أن كثرة من تميمات الإنزيمات المهمة يحتوي تركيبها الكيميائي على مكونات من الرنا

إنها أدوات تخصص ذات وظائف كيميائية فعالة، تماثل المسدسات المسماة أو أدوات قطع الماس وللمسارات الاستقلابية الطويلة صلة ببناء تميمات الإنزيمات من مواد أولية. ومن الطبيعي أن تضبط البكتيريا المقتصدة هذا البناء الثمين بإحكام، وذلك بإيقاف المسارات الاستقلابية عندما لا تكون هناك حاجة إلى تميمات الإنزيمات.

وفي وقت متأخر من التسعينات تحرى العلماء بدقة الكيفية التي يتم بواسطتها تنظيم صنع بعض تميمات الإنزيمات في البكتيريا، فتعرفوا طرزا جزيئية تذكّر بمنظومتتي TRAP والكابت Lac. ومع ذلك، فإن محاولاتهم تعرف بروتينات الرقابة المسؤولة عن تحسس كل تميم إنزيمي والتحكم في انتساخ أو ترجمة الرنا المرسال استجابة لهذا التحسس، تمخضت عمليا عن لاشي. وبرز سر أكثر غموضا، إذا لم يكن عن طريق بروتينات رقابة افتراضية، فكيف يمكن إذاً لماكينة الخلية أن تقيس مستويات تلك المغذيات nutrients؟ لقد أتت الإجابة غير المتوقعة من أعمال الباحثين الذين يدرسون تطبيقات لجزيئات الرنا. وهي ظاهريا ليست

مثيرة للفضول فمثلا ادينوزيل كوبالامين (تميم إنزيم B₁₂) يحتوي على نكليوتيد كامل من الرنا^(٨)؛ كما أن بيروفسفات التيامين (تميم إنزيم B₁) تحمل معها قطعة piece ذات عمود فقري يتألف من السكر والفسفات ويبدو أن تلك القطع bits من النكليوتيدات تعمل كمقايض تمسك بها البروتينات. وحينئذ صرح <هاوبت> أنه يمكن أن تكون هذه القطع بقايا أثرية، تعود إلى زمن بدئي سحيق^(٩) لم تطور فيه بعد الخلايا البدئية proto cells تخزين الدنا الحديث أو تركيب البروتين. وبدلاً من ذلك، فإن الرنا كان يقوم حينذاك بمهمة مزدوجة: جزيء يخزن المعلومات وبوليمر^(١٠) biopolymer قادر على الانثناء ليشكل ماكينة استقلابية، ويؤدي الوظيفة المعقدة المنوطة عموماً ببروتينات اليوم

وفي بدايات الثمانينات تم اكتشاف مثالين <حين> على هذه العناصر القديمة من الرنا. أحدهما الإنزيم RNase P: جزيء رنا يوجد في البكتيريا التي تستطيع أن تشطر نسخاً من الرنا الخام أما المثال الآخر فهو تسلسلات مدهشة من الرنا تحرر edit نفسها بنفسها من نسخ أطول من الرنا المرسال، فتتجزر تفاعلات الشطر الذاتي من خلال سلسلة تبادل روابط كيميائية. وقد فاز <S التمان> [من جامعة بيل] و<R T سيش> [من جامعة كولورادو ببولدر] بجائزة نوبل للكيمياء عام 1989 لاكتشافهما، على نحو مستقل، هذه البيانات التي أوضحت أن جزيئات الرنا التي كان ينظر إليها حتى حينها على أنها مجرد رسائل سلبية غير فعالة^(١١) - تستطيع التنثني في شكل بنى ثلاثية الأبعاد معقدة. وتسرع التفاعلات الكيميائية، تماماً كما تفعل الإنزيمات البروتينية. وإجمالاً، سميت إنزيمات الرنا هذه، بما في ذلك



- (١) RNA World Legacy
- (٢) أو مساعدات الإنزيمات أو الكواينزيمات
- (٣) أو الربي أو الريباسي
- (٤) ticker-tape trascript
- (٥) crevices
- (٦) RNA nucleotide
- (٧) primordial time
- (٨) ويقال أيضاً متمائر مكتور
- (٩) passive messages
- (١٠) onami من ياباني مشهور خاص بطي الأوراق وتشكيلها في صورة أسماك وطيور وحشرات
- (١١) possessed (التحرير)

بروتينات المراقبة في المصنع الخلوي^(١)

أن تكبت إنتاج التجهيزات حتى تستشعر الحاجة إليها، وتتحسس أن المواد الأولية اللازمة لصنع هذه التجهيزات متاحة. إن معرفة الآليات التي تستعملها البكتيريا ساعدت على اكتشاف وجود المحولات الريبية.

لكي يتناسق في البكتيريا صنع الأجزاء التي تحتاج إليها لتبقى وتتضاعف (تتسج) ولجعلها أقرب ما يكون إلى الكمال والفاعلية، تستعمل هذه الخلايا نمطاً بروتيناً مراقبة. وتستطيع هذه البروتينات

أرضية المصنع
إن خطوط التجميع ذات الحركة السريعة تصنع التجهيزات الخلوية بناءً على التعليمات المكوّنة في جينات الدنا (في اليمين). تتحرك إنزيمات بوليميراز على طول شريطة الدنا، ناسخة جينة معينة إلى نسخة من الرنا المرسال (mRNA). يمسك الريبوسوم بالرنا المرسال بمجرد انبثاقه، ويشرع في ترجمة الرسالة التي يحملها إلى سلسلة من الحموض الأمينية؛ تتفنى على نفسها لتشكل بروتيناً كاملاً (وظيفية).



إدارة المخزون

تنظم بروتينات المراقبة صنع البكتيريا لأجزائها الأساسية من خلال آليات متنوعة (في اليسار). يقوم معقد كابت Lac^(١) Lac suppressor (في الأعلى)

بوقف تشغيل جينة تكوّن إنزيم شطر اللاكتوز عن طريق إحصار إنزيم البوليميراز من الوصول إلى الدنا وذلك في حال غياب اللاكتوز. ولكن عندما يكون تركيز اللاكتوز مرتفعاً، فإن أحد مستقلباته يرتبط بالفراغ (يشقّق) clefts في وحدات Lac^(٢)، فيتحرر الدنا ويتم تشغيل الجينة.

ينظم المعقد TRAP عمل الجينات ذات الصلة بتركيب ونقل الحمض الأميني «تريبتوفان»، وذلك باعتراضه نسخ مراسيل رناوات هذه الجينات بطريقتين. ففي حال وجود التريبتوفان، يربّز هذا الحمض الأميني نهاية التسلسل الموجّه (القائد) للرنا المرسال الخاص بتركيب التريبتوفان حول نفسها، مسبباً تغير شكل جزء من شريطة الرسالة إلى شكل دبوس الشعر؛ وهذا يتسبب في إنهاء الانتساخ على نحو مبسّر (قبل الألوان) (الشكل السفلي الأيمن). كما أن التريبتوفان يعزل التسلسل الموجّه الخاص بمرسال نقل التريبتوفان، فيحصر الريبوسومات من الوصول إلى موقع استهلاك الترجمة (الشكل السفلي الأيسر).

[من مستشفى ماساتشوستس العام] طريقة لإحداث التطور في أنبوب الاختبار، مكّنتهم من إخضاع تريبونات من تسلسلات الرنا التركيبية لاختبار دارويني: أي إن الجزيئات الأصلح (الأكثر تلاؤماً) ستستمر. فباستعمال هذا التطور التجريبي (في أنبوب الاختبار)، اكتشفت مجموعة «شوستاك» وبسرعة تنوعات من بنى رناوية قصيرة

PROTEIN SUPERVISORS IN THE CELLULAR FACTORY (١)
Natural Sensors (٢)
Lac repressor (١)
Lac subunits (٢)
mysterious regulators (٣)

وتمثل إسهام مجموعتنا البحثية في هذا المسعى بما قادنا في النهاية إلى تقصي ما بعد البروتينات، وذلك في ما يتعلق بالمنظمات الغامضة (الخفية) لإنتاج تميمات الإنزيمات البكتيرية.


محسّنات طبيعية^(٣)

لقد طورت مختبرات «إي. كولد» [من جامعة كولورادو بولدر] و«جويس» [من معهد سكريبس للأبحاث] و«إي. شوستاك»

الريبوسومات، «الريبوزيمات» rbozymes وفي بدايات التسعينات تطورت أدوات البحث الخاصة بمناولة الجزيئات البيولوجية خارج الخلايا الحية تطورا استطاع معه الباحثون أن يجربوا باستعمالهم استعمالاً خلاقاً القدرة المكتشفة حديثاً للرنا ليثني نفسه ويتخذ أشكالاً وظيفية ومعقدة وجزئياً، كان العلماء ينشدون اختبار الاستعمالات المتعددة للرنا، ومن ثم معقولة فرضية عالم الرنا: كما أنهم كانوا يبحثون عن تطبيقات تقانية بيولوجية (حيوية) جديدة للريبوزيمات.

محولات ذاتية التقرير^(١)

يعتمد تنظيم خلوي ذو شكل جديد، عُثر عليه مؤخراً، على نسخ رناوية معينة من الجينات لتر نفسها بنفسها. إن المحولات الريبية هي قطع من نهاية التسلسل الموجه (القائد) لنسخة الرنا المرسل يمكنها أن تعين احتياج الخلية من البروتين المكوّن (المُرَمِّز) في بقية الرسالة، فتعيد عندئذ تنظيم شئ ذاتي لتقرر في ما إذا كان ذلك البروتين سيُصنع. لذا، فالمحولات الريبية تمتلك مجالين مهمين: أبتا (ملثم) يتحسس مُستقلِّباً معيناً (في الأسفل)، وبرنامج تعبير جيني يؤثر في مصير الرنا المرسل يُخضعه لواحد من عدد كثير من إعادة التنظيمات البنوية الممكنة (في اليسار).



تحسس المُستقلِّبات

إن أبتاميرا لتميم (مساعد) الإنزيم تيامين البيروفوسفات (TPP) يحقق شكلاً محدداً (في اليمين)، وذلك عند مغادرته البوليميراز. وفي حال وجود تميم الإنزيم TPP فإن الأبتامير يرتبط به قابضاً على الجزيء بإحكام (في اليسار).

يمكنها أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثالث فسفات الأدينوزين (ATP)، وكذلك بملونات عضوية كثيرة ويحموض أمينية ومضادات حيوية. أطلق «شوستاك» على جميع هذه الجزيئات الرناوية التي استولدت في المختبر اسم أبتاميرات (الملثمات) aptamers، وهو مصطلح اشتق من الاسم اللاتيني aptus ويعني ملائم (صالح) fitted. وعلى الرغم من منشئها اللطبيعي، فإن أبتاميرات كثيرة تمتلك خاصية (نوعية) أكثر أهمية في السياق البيولوجي من مجرد ارتباطها بإحكام بجزيئاتها المستهدفة. إنها ترفض جزيئات ذات تراكيب شديدة العلاقة.

لقد شرع مختبرنا في استثمار هذه الانتقائية الرفيعة بتصميم محسس sensor يُصنع من الرنا. وكانت الخطة تقتضي إنشاء أبتامير بمقدوره تعرف الجزيء المستهدف، وذلك بارتباطه به ووصله بقطعة أخرى من الرنا يمكنها أن تؤثر لحدث الوصل بمُقرنة مرئية. وبغية تحقيق الدور الأخير، وقع اختيارنا على الريبوزيم رأس المطرقة^(٢) hammer head. وقد سمي كذلك بسبب بنيته ذات الشكل المميز، وهو واحد من الريبوزيمات المعروفة ببساطة بنيتها وبكفاءتها العالية في الشطر الذاتي self-cleavage الطبيعي. فيمكننا، مثلاً، أن نربط ميسماً متفلورا (متالقاً) fluorescent tag بإحدى نهايتي شريطتي رأس المطرقة والتي تسمى مجموعة كايحة توهم الفلورة تقع على مقربة محكمة من الميسم، وذلك ضمن بنية الرنا المنتئية. وما إن تعثر نهاية أبتامير (خاص بجهازنا) على الجزيء المستهدف وترتبط به، حتى يفصل الشطر الذاتي الذي يقوم به رأس المطرقة المجموعة الكايحة عن الميسم المتفلور، فيضيء عندئذ الجزيء نفسه، كما لو أن الستار أزيل عن المصباح.

وقد برهن الرنا على تلاؤمه مع وظيفة المحس هذه لدرجة أننا استطعنا في ما بعد أن نطور ريبوزيمات مقترنة بأبتاميرات قادرة على تحسس تنوعات واسعة من الجزيئات وتقرير وجودها. ويمكن تصنيف مجموعتنا من المحسسات على شية بالغة الصغر، واستعمالها للكشف الدقيق عن مركبات كيميائية كثيرة ومختلفة على نحو متزامن.

طبيعية، ولكننا لم نعثر إلا على إشارات مربكة تدل على وجود تسلسلات رناوية غير مُكوّدة، يُعرف أنها مهمة بطريقة ما للتنظيم الخلوي. وعندئذ قادنا تقصينا إلى سر البكتيريا وقيتامياتها. فقد لفتت انتباهنا تنويرها بالبروتين BtuB الذي يشكل جزءاً من جهاز نقل مساعد الإنزيم B₁₂ إلى داخل بكتيرة الإشريكية القولونية *E. coli*. وتبدأ نسخة الرنا المرسل التي تُكوّد البروتين BtuB بموجّه (بِقائد) ضخم يتكون من 240 نكليوتيدا غير مُكوّدة، وزودنا طوله الاستثنائي بمفتاح

SELF DETERMINING SWITCHES (١)

(١) الجزء الضارب من المطرقة

وذلك حتى ضمن مزيج معقد. وبالفعل، فإن الوضع الذي مكننا من أن ننشئ رناوات RNAs تتحسس جزيئات صغيرة وتحفز ذلك الترابط على إعادة تنظيم صغيرة لبنائها الذاتية، جعلنا نتساءل عما إذا كان التطور الطبيعي قد أنشأ أنواعاً مشابهة من الرناوات فالريبوزيمات من عالم الرنا لا تزال تؤدي بوضوح مهام حاسمة في الكائنات الحية المعاصرة. فهل توجد تسلسلات غير مكتشفة لماكينات مهمة أخرى من الرنا، مخبأة في الجينومات المعاصرة؟ لقد شرعنا في تفحص سريع للأبحاث العلمية المنشورة (الأدبيات العلمية) بحثاً عن الإماعات تشير إلى وجود ملثمات


بالطريقة نفسها التي ينظم بوساطتها البروتين TRAP رسالة نقل التريبتوفان في الغضويّة الرقيقة *B. subtilis* بمنع الريبوسوم من ترجمة هذه الرسالة وبناءً على ذلك، أطلقنا على هذا الجزيء من الرنا، الذي يستطيع أن يحول التعبير الجيني من التشغيل إلى الإيقاف from on to off، اسم «المحول الريبوي» riboswitch.

وفي الوقت الذي كنا نتحرى فيه التسلسل الموجّه الخاص بالبروتين BtuB، لفت انتباهنا أيضاً وضع آخر لتنظيم غير مفسّر فلقد حدد بحث سابق أن أنواع الرنا المرسال المؤكّدة لأنزيمات تركيب الفيتامين B₁₂، ونواقل تيميّاته الانزيمية في مجموعات مختلفة من البكتيريا تحوي جميعها فُداً مشتركاً من تسلسل الرنا. وإن الطفرات في هذا التسلسل عطلت الكبت السوي لهذه الجينات في الخلايا التي تراكمت فيها كميات كافية من الفيتامين B₁₂. وفي الإشريكية القولونية أوبيرون (مشغل) إنزيمي تركيب يملك فُداً موجهاً (قائداً) يحوي هذا التسلسل قرب الموقع الذي تبدأ فيه ترجمة البروتين الأول. وقد استطعنا البرهنة على أن الفيتامين B₁₂ بحث على تغيير تركيب في هذا الرنا المرسال على نحو يتغلّق فيه بإحكام موقع الارتباط الخاص بالريبوسوم وبعد ذلك حددنا أن مجالاً صغيراً ضمن التسلسل الموجّه، يتألف من 91 نكليوتيداً فقط، يستطيع أن يرتبط بالفيتامين B₁₂. وكمحسّاتنا الصناعية، فإن هذه المحولات الريبوية الطبيعية تكونت من مجال أبتامير (ملثم) منفصل، يترابط بتسلسل «استجابي» وظيفي يتبع له تنظيم في ما إذا كان الفيتامين B₁₂ سيُنْتِج


لذا، لقد عثرنا على الأقل على نوعين من الرنا المرسال يتمتّعان بمقدرة استثنائية على مراقبة الشروط الخلوية، وعلى اتخاذ قراراتها الذاتية فيما إذا كانت الماكينات البروتينية التي تُكوّدها ضرورية كي تعمل دون تدخل من بروتينات مناضرة. فهذه النسخ الضوئية الورقية ليست رسائل سلبية غير فعالة، إنها تتنهي مثل أوراق أوريغامي المسوسة، وتختار مصانرها الذاتية. وقد برهن هذان النوعان من الرنا المرسال على أنهما أكثر من مجرد شيتين غريبين نادريين؛ ذلك أن أعضاء فريقنا البحثي، ومجموعات

stretch ١٠٠

إعاقة الترجمة



شطر ذاتي



إنهاء الانتساخ



استجابات المحول الريبوي

تستعمل المحولات الريبوية أنواعاً مختلفة من الاستراتيجيات كي تضبط صنع البروتينات. ففي حال غياب تميم الإنزيم TPP، يمكن لبرنامج التعبير الجيني أن يترك موقع استهلال الترجمة متاحاً للريبوسوم، فيسمح بذلك للتعبير عن التعليمات الجينية أن يبقى «في حالة تشغيل» (في اليمين). في حال ارتباط تميم الإنزيم TPP بالأبتامير، فإن بإمكان برنامج التعبير الجيني أن يشكل دبوس شعر يثبط الترجمة؛ وهذا «يوقف تشغيل» الجينة (في اليسار). ويشكل المحول الريبوي الذي تحسّس تميم إنزيم فلافين وحيد النكليوتيد (FMN) دبوس شعر مثله، يوقف انتساخ الرسالة الخاصة بوساطة اليوليميراز (b). إن ريبوزيما استثنائياً أُستثير من قبل الكلوكوز أمين-6 فسفات (GlcN6P) يتف ذاته بشطر نفسه بنفسه (c).

والخاص بالبروتين BtuB قد احتوى على أبتامير طبيعي رابط للفيتامين B₁₂؛ عمل على تنظيم التعبير عن التعليمات المؤكّدة في الجينة ذاتها الخاصة بهذا البروتين؟

لقد استعملنا تقنية السبر في الخط in-line probing لوضع خريطة لأجزاء رسالة الرنا المرسال المؤكّدة للبروتين BtuB. والتي أصبحت أكثر نظاماً أو أكثر قابلية للانثناء في وجود الفيتامين B₁₂. ووجدنا بوضوح أكثر ثنية (انجذالا) جديدة قرب بداية منطقة تكوين الرنا المرسال الخاص بالبروتين BtuB. ويمكن لهذه البنية أن تفسّر تثبيط ارتباط الريبوسوم وفي ما يبدو، أن الرنا المرسال ذاته يتحسّس الفيتامين B₁₂، فينظم نقله

للغز الأول لاحتمال أن تكون لهذا التسلسل وظيفة غير عادية كما أن فريقاً بحثياً آخر قد بين فعلاً أن إنتاج البروتين BtuB يتثبط عندما تكون تراكيز الفيتامين B₁₂ في الخلية مرتفعة ومع هذا، فلم يتم اكتشاف بروتين خفي يستشعر الفيتامين B₁₂

ونحن نعلم من أبحاث سبق أن نشرها الآخرون بأن وجود الفيتامين B₁₂ يمنع بطريقة ما ارتباط الريبوسومات بالرنا المرسال الخاص بالبروتين BtuB. والمحت تجرية واحدة أيضاً إلى أن تغييراً تركيبياً ما في تسلسل الرنا المرسال الموجّه قد حدث في وجود الفيتامين B₁₂ فهل من الممكن أن يكون التسلسل الطويل للرنا المرسال الموجّه

المحولات الريبية والهندسة الارتدادية^(*)

واحد نوعي ذي جزيء صغير. ولجميع أيتاميرات أفراد الصف الواحد لب له البنية نفسها؛ حتى في الكائنات الحية البعيدة بعضها عن بعض تطورياً. ويمكن لتسلسل برنامج التعبير الجيني، الذي قد يشمل أيضاً جزءاً من تسلسل أيتامير نفسه، أن يحتوي على التسلسلات التي تعيد تنظيم بنيتها الذاتية كي تؤثر في التعبير الجيني [انظر المخطط في الصفحتين 50 و 52]. وتجدر الإشارة إلى أن المحولين الريبين للثيامينين B₁₂ و B₁ اللذين كنا أول من قام باكتشافهما؛ يمتلكان برنامج تعبير جيني يمنع استهلال الترجمة، وذلك بأن يعمدا بنفسيهما إلى تغيير شاكلتيهما كي يخبنا في طياتهما التسلسلات التي يحتاج إليها الريبوسوم ليتعرف مثلاً أمراً صحيحاً بقراءة الرسالة. وهناك أمثلة أخرى على محولات ريبية تحتوي على هذه الأيتاميرات نفسها؛ تمتلك برنامج تعبير جيني يتسبب بإنهاء مُبتسر (قبل الأوان) لانتساخ الرنا المرسال عن طريق تشكيل دبوس شعر يعمل على خط فاصل مُنه terminator.

ومع تعاظم معارف فريقنا البحثي عن المحولات الريبية، أخذنا نثمن أكثر فأكثر كيف أن التطور وازن بحذر بين التآني والانفعا للذين شكلا جوهر الية عمل المحولات الريبية. فمثلاً، يجب أن يحدث تمييز المستقلبات داخل الخلية في خلال مجرد ثوان قليلة؛ وهو الزمن الذي يحتاج إليه البوليميراز كي يتنسخ التسلسل الموجّه للرنا المرسال، ولترتبط به الريبوسومات وتشرع في الترجمة لذا، فإن سرعة ارتباط المستقلبات، وليس بالضرورة قوة هذا الارتباط، أصبحت حاسمة لتحديد في ما إذا كان محول ريبى ما يستطيع أن يتحسس هدفه. فتسلسل التوقيت بين الأيتامير وبرنامج التعبير الجيني، الذي يجعل البوليميراز يتوقف عن الانتساخ توقفاً وجيزاً، ضروري أحياناً لإحداث تأخير يتيح للأيتامير وقتاً كافياً كي يأسر مستقبلاً ويعيد تنظيم برنامج تعبيره الجيني كما ينبغي.

عندما بدأنا بمسح جينومات بكتيرية بغرض البحث عن نماذج جديدة من المحولات الريبية، وجدنا أنه مازالت هناك مفاجآت أكثر

بחיثة أخرى، تعرفوا بسرعة محولات رناوية RNA switches طبيعية استجابت لتنوعات أخرى من المستقلبات metabolites الخلوية الأساسية، وكانت هذه المحولات كامنة في المراجع العلمية.

لقد ثبت في النهاية أن تسلسلاً مشتركاً مع أقارب للبكتيرية من الغصنوية الرقيقة *B. subtilis* هو محول ريبى يتعرف تميم الإنزيم SAM (S-adenosylmethionin)، ومن جهة أخرى، عُرف أن عنصراً رناوياً يصادف في رسائل - تركيب ونقل تميم الإنزيم فلافين الوحيد النكليوتيد (الثيامين B₂) flavin mononucleotide، وهو أيضاً محول ريبى آخر. ويعتقد أن مقطعاً من الرنا المرسال يكود بروتينا يراقب الحمض الأميني «ليسين» في الإشريكية القولونية بشكل، في حقيقة الأمر، قطعة من معقد أيتامير الليسين lysine aptamer complex الذي ينظم تركيب هذا الحمض الأميني في طيف واسع من البكتيرات و خلاصة القول: إن المحولات الريبية هي شكل واسع الانتشار من أشكال التحكم الجيني.

تم حتى الآن تعرف دزينة من صفوف المحولات الريبية، عُرفت عن طريق بنية أيتاميراتها (ملثماتها) ومع أنها تختلف فيما بينها في بعض سماتها وآليات عملها؛ فإنها تتشارك في مبادئ عامة قليلة فالمحولات الريبية هي نسخ من رسائل رناوية؛ قادرة على تنظيم تعبير جيناتها الخاصة بتقريرها فيما إذا كان على الرسالة المحتواة فيها أن تترجم إلى بروتين أو يجب تدميرها قبل أن يقرأها الريبوسوم. ويتخذ المحول الريبى هذا القرار بضبط ومراقبة احتياج الخلية للبروتين الذي يُكوّده من خلال مقدرة على تحسس مستقلّب مستهدف، ثم تغيير تركيبه الثلاثي الأبعاد استجابة لذلك فالمحول الريبى يحتوي إذاً على قطعتين مهمتين: تسلسل أيتامير الذي يتحسس المستقلّب، وتسلسل قطاعه التنظيمي المتضمن برنامج التعبير الجيني.

ويعمل أيتامير مستقبلاً معقداً لمستقلّب

أهداف مغرية^(**)

إن عدداً كبيراً من البكتيرات، بما في ذلك الممرضات البشرية المبيئة أدناه؛ يستعمل المحولات الريبية كي تضبط فاعليات جيناتها الخاصة بها. لذا، يمكن للعوامل التي تسنّثّر تلك المحولات الريبية أن تعمل كصفوف جديدة من المضادات الحيوية، وبخاصة إذا كانت العقاقير تُبطل وظيفه جينات أساسية لفوعة (ضراوة) الكائن الحي أو لبقائه. وقد أدرج أدناه عدد صفوف المحولات الريبية التي توجد في كل كائن حي، وعدد الجينات التي يُعرف بانها تُنظّم من قبل المحولات الريبية. وقد وضعت العلامة * فوق العدد للدلالة على أن جينة حيوية واحدة على الأقل تُنظّم بواسطة محول ريبى.

ممرض بكتيري بشري	صفوف محولات ريبية	أعداد الجينات التي يتم تنظيمها
<i>Acinetobacter baumannii</i>	4	6
<i>Bacillus anthracis</i>	9	82
<i>Brucella melitensis</i>	5	21*
<i>Enterococcus faecalis</i>	7	17
<i>Escherichia coli</i>	4	15*
<i>Francisella tularensis</i>	4	8
<i>Hemophilus influenzae</i>	5	15*
<i>Helicobacter pylori</i>	1	2
<i>Listeria monocytogenes</i>	9	49
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	3	13
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	3	27
<i>Salmonella enterica</i>	3	34*
<i>Staphylococcus aureus</i>	8	30*
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	5	19
<i>Vibrio cholerae</i>	5	13
<i>Yersinia pestis</i>	3	11

(*) Reverse-Engineering Riboswitches
(**) Tempting Targets

صنعية لضبط فاعلية الجينات داخل الخلايا الحية: في مجال المعالجة الجينية مثلا وتمثل الهدف بتصميم محول تشغيل-إيقاف on-off switch يُستثار عن طريق جزيء حميد شبيه بالعقار ثم يدمج المحول داخل جينة علاجية وعندئذ يمكن غرز هذا البناء الجيني في خلايا المريض: كما يمكن تنظيم فعله بأن يُعطى الشخص المعالج حبات دوائية تحتوي على الجزيء الذي يُفعل المحول الريبي المصمم وكما هي الحال في تطبيقات المضادات الحيوية، فإن هذا الاستعمال للمحولات الريبية لا يزال في مراحل البحث المبكرة

إن الشعور العام المتمثل بالمفاجأة والإثارة - والذي استلهم من اكتشاف الريبوزيمات، والجهود المبذولة للإفادة من هذه الجزيئات القديمة في تطبيقات حديثة - قد يجدد الوجود الفعلي للمحولات الريبية فهناك فقط كسّر وقطع من عالم الرنا المشي تبداً بوجود الريبوزيمات. ولكن هذه الأدوات الرناوية بالياتها المعقدة وأدوارها التنظيمية تشبّثت بالحياة تشبثاً عنيذاً كي تستمر في الكائنات الحية المعاصرة ولا يسعنا إلا أن نسأل عما إذا كانت المحولات الريبية هي آخر آثار عالم الرنا التي تصادف اكتشافها، أم إن هناك جزيئات أولية أخرى لا تزال تستعملها مصانع المستقلبات، أو الأدوار التنفيذية للخلايا الحديثة - ربما أيضاً في خلايانا البشرية ذاتها - وتنتظر من يكتشفها. ■

معروف يعمل مضاداً فطرياً. ويربط إليه في الوقت نفسه المحول الريبي للفيثامين B₁. وتفتتح الأدلة أن هذا الارتباط يحدد الفطر كي يعتقد أن لديه ما يكفي من الفيثامين B₁. وهذا يتسبب في وقف تركيب المزيد منه. ولأن الفطر لا يمتلك فعلاً هذه المغذية المهمة، فإن نموه يتباطأ، ويمكن أخيراً أن يموت نتيجة غُوز هذا الفيثامين. وكما بوضوح هذا المثال، فإن المحولات الريبية تعمل كمنظمات حيوية لإمدادات من المغذيات الحاسمة الخاصة بطيف واسع من الميكروبات التي تصنع أيضاً أهدافاً مغرية لمضادات حيوية جديدة.

هناك فقط كسّر وقطع صغيرة من عالم الرنا المنسي تبداً اليوم موجودة بين ظهرانيها.

ويعرف حالياً أكثر من دزينة من المُمرضات البشرية التي تعتمد على تنظيم المحولات الريبية لكثير من المستقلبات المهمة (انظر المؤطر في الصفحة المقابلة) ويجتهد كثير من الباحثين كي يعثروا على جزيئات تخدع أيتاميرات المحولات الريبية البكتيرية؛ لتحسبها عن طريق الخطأ مستقلبات طبيعية، فتستثير بهذه الطريقة استجابة تنظيمية جينية ستكون ضارة بالخلايا البكتيرية. وتستكشف أيضاً بعض المجموعات البحثية الفكرة وراء استعمال محولات ريبية

فقد تعرفنا في جينوم العصوية الرقيقة وحدها ثمانية تسلسلات جديدة تحمل تواقيع المحولات الريبية. وكان واحد منها يحمل أيتاميراً مزدوجاً: يعمل على تشغيل التعبير الجيني أكثر من عمله على إيقافه. كما ثبت أن بنية أخرى لا تعمل كمحول ريبى فحسب بل أيضاً كريبوزيم تستثيره المستقلبات. وعوضاً عن أن يبادر هذا الجزيء إلى إعادة ترتيب شاكلته بنيوياً، فإن برنامج تعبيره الجيني يشطر في الجوهر نفسه ذاتياً، ويثقل نفسه بنفسه قبل أن تتم ترجمة رسالته. إن صفًا واحداً فقط من صفوف المحولات



الريبية التي اكتُشفت حتى الآن لوحظ في الكائنات الحية العديدة الخلايا: أما الصفوف الباقية، بحسب علمنا، فقد عُثر عليها في البكتريات فقط. إن لجينومات الكائنات الحية الأعلى وسائل تنظيم جيني أكثر تعقيداً من البكتريات: كما أن المسلك من النسخة الأصلية (الجينة) إلى البروتين أكثر التواء. وعوضاً عن نسخ ضوئية أنيقة من الرنا المرسال فإن نسخ السدود الأولى للجينات غالباً ما تشمل فقرات (تسلسلات) طويلة من المتن غير المكوّدة، تعرف بالإنترونات introns، يجب إزالتها بالتجديل spliced out قبل أن تبدأ ترجمة الرسالة إلى بروتين. لقد عثرنا على محول ريبى في قاع حجرة تنقيح متن الرسالة

يُصادف أيتامير تميم الإنزيم B₁ في تسلسلات الإنترونات ضمن أويبرونات تركيب التيامين في الكثير من الفطور والنباتات: بما في ذلك الأرز. وعندما يترابط بالفيثامين B₁، فإن هذه المحولات الريبية تبداً وكنائها تسبب إعادة تنظيم بنية الرنا حول وصلات (مواصل) الإنترونات فتمنع التجديل من البدء (الإنجاز). ولما كانت تفاصيل هذه السيرة غير واضحة: فإن ذلك قد يحول الرسالة برمته إلى سلة المهملات أو يمنعها من الارتحال إلى المكان الصحيح في الخلية حيث تتم ترجمتها.

ومما يثير الاهتمام أنه عثر على عقار

المؤلفان

J. E. Barrick - R. R. Breaker

بحثاً معاً في تنوع وأهمية المحولات الريبية وذلك في مختبر هيريكز بجامعة بيل. خباريته حالياً زميل لما بعد الدكتوراه في جامعة ميشيغان، حيث يدرس تطور البكتريات. إضافة إلى برامج الحاسوب الذاتية التضاعف (التنسخ) وتستمر مجموعة «هيريكز» في استكشاف طبيعة الحموض النووية واستعمالاتها، وجزيئاتها، عناصر ضبط جيني مصمم مصنوعة من الرنا. وكذلك تطوير مضادات حيوية لاستهداف محولات ريبية طبيعية.

مراجع للاستزادة

The Origin of Life on the Earth. Leslie E. Orgel in *Scientific American*, Vol. 271, No. 4, pages 52-59: October 1994.

Thiamine Derivatives Bind Messenger RNAs Directly to Regulate Bacterial Gene Expression. Wade Winkler, Ali Nahvi and Ronald R. Breaker in *Nature*, Vol. 419, pages 952-956, October 31, 2002.

Metabolite-Binding RNA Domains Are Present in the Genes of Eukaryotes. Narasimhan Sudarsan, Jeffrey E. Barrick and Ronald R. Breaker in *RNA*, Vol. 9, No. 6, pages 644-647; June 2003.

Riboswitches as Antibacterial Drug Targets. Kenneth F. Blount and Ronald R. Breaker in *Nature Biotechnology* [in press].

Scientific American, January 2007

طرق أفضل لاستهداف الألم



حاز «B. سامويلسون» جائزة نوبل في الفيزيولوجيا أو الطب عام 1982، وذلك عن أبحاثه في تقديم صورة دقيقة عن الكيفية التي يولد بها الجسم البروستاغلندينات prostaglandins. وهذه المواد الشبيهة بالهرمونات تؤدي دورا في تنظيم عدد من السيورورات البيولوجية، بما في ذلك التحريض على الألم والحرارة والالتهاب. ومن المعروف أن هذه السيورورات تُنتج من قبل الأسيرين والايوبروفن والأدوية المشابهة لهما. وقد أجرى «سامويلسون» أبحاثه هذه، بالتعاون مع «S. بركستروم» [وهو شريك في جائزة نوبل للعام نفسه (1982)]، في حرم معهد كارولنسكا المعروف بأجره الأحمر في السويد، وهذا المعهد يقوم أيضا باختيار الفائز بجائزة نوبل السنوية في الطب.

إن لمعهد كارولنسكا تاريخا طويلا مع البروستاغلندينات، يعود إلى عام 1935 عندما اكتُشفت مشتقات هذه الأحماض الدهنية، ويمتد إلى يومنا الحاضر. لقد قام «سامويلسون» ومساعدوه في السنوات الأخيرة بأبحاث أكثر تفصيلا عن التركيبة البيوكيميائية للبروستاغلندين تُستغل حاليا في محاولة لتطوير أدوية قاتلة للألم ومضادة للالتهاب أكثر أمانا من المواد المتوافرة حاليا، بما في ذلك المجموعة التي تشوّهت سمعتها حديثا والمعروفة بالمثبطات COX-2. ويُعلق على ذلك «سامويلسون» قائلا: «هناك طلب هائل على الأدوية المضادة للالتهاب، وإذا تمكنا من تطوير دواء له نفس فعالية العقاقير السابقة، لكن مع تأثيرات جانبية أقل، فإن هذا الأمر يغدو من الأهمية بمكان».

الشجرة والفروع^(*)

في البيان الصحفي الصادر عن معهد كارولنسكا عام 1982 تم الثناء على حصول «سامويلسون» على جائزة نوبل، واعتُرف بفضل هذا العالم في المعرفة المتوافرة حاليا عن شجرة البروستاغلندين بجميع فروعها. «لقد بين «سامويلسون» أنه يتم تصنيع البروستاغلندين عندما يعالج أحد الأحماض الدهنية (الحمض الأراكيدوني arachidonic acid) المتواجد في غشاء الخلية بالإنزيمات وفق سلسلة من التفاعلات (انظر الموطر في الصفحة 56). وتُسفر هذه التفاعلات في النهاية عن مركبات تؤمن أعمالا تنظيمية مختلفة داخل

إن تعميق فهمنا للطرق الكيميائية التي يعمل بها كل من الأسبرين والفيوكس، قد يؤدي إلى إنتاج أدوية لتسكين الألم ذات مضاعفات جانبيهة أقل.

«G. ستيكس»



أنه يخفّض كذلك من
تصنيع البروستاسايكلين^(*)
PGI₂، وهو بروتستكلنديين واق
للقلب يقوم بتوسيع الأوعية
الدموية ويمنع الصفائح من
التكدس (أي إنه يقاوم التخثر). وهذا
التخفيض قد يتسبب في نتائج خطيرة.

في عام 1999، ذكر «G. فيتزجيرالد» [من المركز الطبي
بجامعة بنسلفانيا] في تقرير له نشر في «وقائع جلسات الأكاديمية
الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية» عن تجربة سريرية
صغيرة أوضحت ظاهرة تثبيط PGI₂. وبين «فيتزجيرالد» كذلك أنه
عندما ينقص PGI₂ بعد تناول مثبط الإنزيم COX-2، فإن
الثرمبوكسان thromboxane، وهو نوع آخر من البروستكلنديين يتم
إنتاجه في أوعية الحمض الأراكيدوني، يبقى فعالاً ويحث على انقباض
الأوعية وتكتل الصفائح - الأمر الذي عادة ما يعاكسه PGI₂.
وأوضح التقرير أن عدم التوازن هذا قد يشجع على تشكل
الخثرات thrombosis التي قد تؤدي إلى الهجمات القلبية
والسكتات - وهو استنتاج المحامين في دعاوى قضائية زادت
أخبارها وقد أثبتت في السنوات الأخيرة ضد مصنعي الأدوية

(*) سنرمز فيما يلي للبروستكلنديين E₂ بالرمز PGE₂ وسنرمز
للبروستاسايكلين بالرمز PGI₂.

الجسم، فتضمن على سبيل المثال، أن الكليتين تحصلان على
تدفق كاف من الدم، أو تنظم تقلصات الرحم أثناء الولادة
والحيض، أو تقدح زناد عملية الالتهاب (الذي يستدل عليه
بالاحمرار والتورم) كارتكاس لحماية النسيج من الخمج أو الأذى.
يقوم الأسبرين، والأدوية الأخرى المضادة للالتهاب غير
الستيرويدية كالأيبوبروفن، بإيقاف مفعول الإنزيمين
الذين يعملان في أولى مراحل تشكيل البروستكلنديين:
سيكلوأوكسجيناز 1 و 2 (COX-1 و COX-2). وهكذا يتوقف
إنتاج جميع مشتقات البروستكلنديين بكبح الإنزيمات COX.
إلا أن الأسبرين وأقربائه relatives تسبب أحياناً مشكلات
خاصة بها نتيجة لهذا الكبح الشديد. فعندما يقوم الأسبرين بتثبيط
إنتاج البروستكلنديين المسؤول عن الالتهاب، فإنه يقوم في الوقت
ذاته بتثبيط عمل واحد أو أكثر من مشتقات الحمض الأراكيدوني
التي تحمي بطانة المعدة من حمض كلور الماء الموجود في
العصارات الهضمية. وفي عام 1990 قامت شركات الأدوية بإجراء
تصحيحي عندما أنتجت الدوائين فيوكس Vioxx وسليبركس
Celebrex وأدوية أخرى تقوم بشكل خاص بحجب الإنزيم COX-2،
بحيث تُترك سليمة بعض البروستكلنديينات الخاصة بحماية المعدة
والتي تُفرز استجابة لفعالية الإنزيم COX-1.

إلا أنه اتضح أن إعاقه الإنزيم COX-2 لها عواقبها الخاصة
به. فهذا التعطيل على ما يظهر يوقع الفوضى في سلسلة من
التفاعلات المعقدة بين البروستكلنديينات. فمع أن إيقاف عمل
الإنزيم هذا ينقص من تصنيع البروستكلنديين E₂ (PGE₂)^(*)
الذي يعتقد أن له دوراً رئيسياً في تحفيز الألم والالتهاب، إلا

كيف ننتج أدوية أفضل من الأسبرين والفيوكس^(*)

كيف يعمل الأسبرين

يقوم الأسبرين والأدوية الالاستيرويدية المضادة للالتهاب بإعاقة عمل كل من الإنزيمات COX-1 و COX-2، مما يثبط إنتاج كافة أنواع البروستكلنديين، بما في ذلك المفيدة منها.

كيف تعمل مثبطات

الإنزيم COX-2

بسبب الإنزيم COX-2 الألم والالتهاب عن طريق رفع مستويات البروستكلنديين PGE₂ عبر طرق تشمل إنزيمًا يدعى mPGES-1، وبإعاقة الإنزيم COX-2 بواسطة أحد الأدوية (فيوكس Vioxx أو سيليبريكس Celebrex أو بيكسترا Bextra أو غيرها من المثبطات)، توقف هذا الارتفاع في مستوى PGE₂. ويبقى تهديد هذه الأدوية بأذى المعدة قليلًا، لأن من المفروض أن يبقى PGE₂ يُصنع بكميات عادية بتوجيه من الإنزيم COX-1 وإنزيم آخر يدعى cPGES. تقلل أيضًا مثبطات الإنزيم COX-2، تقلل أيضًا من مستوى البروستكلنديين PGI₂ الذي يحمي الجهاز الهضمي. وهذا التقني قد يفسر ارتفاع نسبة حوادث الهجمات القلبية والسكتات لدى أولئك الذين يتناولون هذه الأدوية.

كيف تعمل مثبطات

الإنزيم mPGES-1

هذه الوسائط التي ما تزال قيد التطوير، تعيق عمل mPGES-1 بشكل خاص، وهو الإنزيم الذي ينتج بكميات كبيرة بإيعاز من الإنزيم COX-2 في الخلايا التي ترتكس لأذى الالتهاب. وقد يفيد إنقاص الإنزيم mPGES-1 لوحده دون الإنزيمات المسؤولة عن تصنيع كميات طبيعية من البروستكلنديين، في التحكم بمستويات PGE₂ في الجسم، وبذلك يؤدي إنقاص هذا الإنزيم إلى التخلص من الألم دون إلحاق أذى بالقلب وجهاز الهضم.


إن أحد مسببات الألم والالتهاب والحرارة في الجسم هو إنتاج كميات كبيرة من جزيء يدعى بروستكلنديين E₂ (PGE₂) (الخطوات 3-1 في الشكل) من قبل خلايا الالتهاب. يعمل الأسبرين Aspirin والفيوكس Vioxx وأنواع أخرى من الأدوية القائلة للألم على تثبيط الإنزيمات التي تحفز تصنيع البروستكلنديين (المؤطران في الأعلى). ولكن بعض أنواع البروستكلنديين والمواد الأخرى التي تنتجها هذه الإنزيمات هي مواد مفيدة، ويؤدي توقف إنتاجها إلى مضاعفات جانبية. ولهذا فإن العاملين على تطوير الأدوية يدرسون وسائط جديدة، مثل مثبطات الإنزيم mPGES-1، التي تعيق فقط تركيب كميات زائدة من الإنزيم PGE₂. وبذلك تسمح بتصنيع المواد المفيدة (المؤطر السفلي).

1 وتقوم معظم الخلايا بشكل روتيني بتصنيع البروستكلنديين من خلال تفاعلات تبدأ بإنزيم يدعى COX-1 ويعمل على الحمض الأراكيدوني Arachidonic acid. فعندما يتعرض أحد النسيج لأذية حادة، تعطى إشارة كيميائية إلى الخلايا البلعمية وإلى خلايا التهابية أخرى في المناطق المجاورة لمكان الإصابة لزيادة نشاط الإنزيم COX-2 الذي يؤثر أيضًا في الحمض الأراكيدوني.

2 يقوم الإنزيمان COX-1 و COX-2 بتحويل الحمض الأراكيدوني في تفاعل مرحلي إلى مركب كيميائي وهو البروستكلنديين (PGE₂) E₂.

3 عقب ذلك، تقوم إنزيمات إضافية بتحويل

البروستكلنديين PGH₂ إلى بروستكلنديين أخرى وإلى ثرومبوكسان، بحيث يكون لكل منها وظيفة خاصة بها (أسفل الشكل). وفي النهاية تنطلق جميع البروستكلنديين - بما في ذلك PGE₂ - الذي ينتج الألم - لتؤثر في الخلايا الأخرى.



البروستكلنديين وتأثيراتها المختلفة

البروستكلنديين (PGI₂)
يوسع الأوعية الدموية ويثبط ارتشاض الصفائح (التخثر). وقد يحمي من التصلب العصيدي ومن أذية بطانة المعدة.

البروستكلنديين E₂ (PGE₂)
له علاقة بالألم والالتهاب والحرارة، ويحمي من أذية المعدة.

البروستكلنديين D₂ (PGD₂)
له تأثير في تنظيم النوم والإرتكاسات التحسسية.

البروستكلنديين F₂ (PGF₂)
يقوم بضبط تقلصات الرحم أثناء المخاض والحيض.

البروستكلنديين A₂ (TXA₂)
يحفز انقباض الأوعية الدموية ويحث الصفائح على الارتشاض (التخثر).

نشرت مقالة في مجلة «الاتجاهات الجديدة في العلوم الدوائية»^(١) عنوانها: «هل الإنزيم mPGES-1 هدف واعد في علاج الألم؟». وقد أثارت إشكالية ما إذا كانت سيرورات الاستقلاب (الأيض) المعقدة للبروستاكلاندين ستحبط مساعي الوصول إلى دواء جديد ووردت في المقالة ملاحظة أن تثبيط الإنزيم mPGES-1 قد يخفض من إنتاج PGE₂، ولكنه قد يؤدي إلى إنتاج أعلى من نوع آخر من البروستاكلاندين، مع حدوث نتائج فيزيولوجية غير معروفة ثم إن معظم أنواع البروستاكلاندين الأخرى، وليس فقط PGE₂، تؤدي بعض الدور في إثارة الألم.

والتجارب السريرية الخاصة بتقدير درجة الأمان والفعالية على الجنس البشري هي وحدها القادرة على حل أي خلاف حول هذه المسألة لكن الدراسات الأولية على الفئران التي أزيل من أجسادها الإنزيم mPGES-1 تعطي بعض الأمل. وقد ذكر في أحد التقارير الصادرة عن مجموعة «فيتزجيرالد» لعام 2006 أن الفئران التي تُزَع منها الإنزيم mPGES-1 زادت فيها مستويات PGI₂ المريحة للقلب، فيما ظل ثابتا مستوى الثرومبوكسان thromboxane الضار، وفي الوقت نفسه، بقيت قدرة الدم على التخثر وضغط الدم طبيعيين وأوضحت دراسة لاحقة قام بها فريق «فيتزجيرالد» أن حذف الإنزيم mPGES-1 قد قادم عددا من الفوائد الوعائية القلبية، ربما بسبب تثبيط PGI₂.

وتستمر التجارب للحصول على مركبات تكرر تأثير إخماد الإنزيم mPGES-1 وقد بدأت الاستعدادات للقيام بالخطوة الحساسة التالية، وهي الانتقال من التجارب على الفئران إلى الإنسان.

(١) Unleashing Inhibitors of microsome prostaglandin synthase
Trends in Pharmacological Sciences

وقد عُيِّن «سامولسن» مستشارا علميا وعضوا في مجلس إدارة هذه الشركة. وعقدت الشركة بوهرينغر إنكلهيم Boehringer Ingelheim، التي تُصنِّع دواء موبيك Mobic المثبط للإنزيم COX-2، اتفاقية مع الشركة بيوليپوكس عام 2005 لتمويل الأبحاث المتعلقة بالإنزيم mPGES-1. ومن ثم الترخيص للمثبطات الجديدة من حيث التطوير النهائي والتسويق.

والسوق الأمريكي، الذي يستوعب سنويا ما يتوف ثمنه على العشرة بلايين دولار من الأدوية القاتلة للألم غير المخدرة، متحدا مع فادحة الإنزيم COX-2، جعل شركات أخرى توجه اهتماما كبيرا للإنزيم. فقد نشرت الشركة ميرك دراسة عن مثبطات الإنزيم mPGES-1، وتقدمت الشركة فايزر pfizer بطلب براءة اختراع لفازر سُحبت منه الجينة المسؤولة عن عمل الإنزيم mPGES-1. الأمر الذي يساعد على فحص تأثيرات تثبيط هذا الإنزيم. كما تقدمت شركات أدوية كبيرة للحصول على براءات اختراع متعلقة بالإنزيم mPGES-1. ويعلق «فيتزجيرالد» على كل هذا قائلا «إن صفائح الأرض تتزحزح. فهناك اليوم سوق هائل لأدوية جديدة بسبب عدم الضمانة التي تتصف بها الأدوية المتوافرة حاليا». وأضاف قائلا «إن إحدى الشركات، التي لا يمكنني الكشف عن اسمها، تخطط للقيام في عام 2007 بتجارب بشرية سريرية خاصة بمثبط الإنزيم mPGES-1» (وبشكل مستقل، تحاول شركات مصنعة أخرى تطوير أدوية تتحد مع مستقبلات PGE₂ وتقوم مباشرة بإعاقة عملها).

إن المحن التي تعرض لها الدواء فيوكس قد تعيق الإسراع في تقديم أي دواء جديد مضاد للالتهاب إلى الأسواق، وفي الواقع، قام المشككون برفع أصواتهم ففي عام 2006

المثبطة للإنزيم COX-2. وقد بدأ «فيتزجيرالد» بتقديم تقارير عن اكتشافاته في المؤتمرات عام 1997، أي قبل سنة من الموافقة على أول مثبط للإنزيم COX-2. وهو الدواء سيليبركس Celebrex.

وعندما كانت مجموعة «فيتزجيرالد» تكشف عن إشارات التحذير الأولية بالأخطار المشار إليها، كانت مجموعة «سامولسن» للأبحاث تجهد «لوضع ورقة جديدة» على أحد فروع شجرة البروستاكلاندين. فقد تزعم أحد زملاء المتخرجين في مختبر «سامولسن»، ويدعى «J. P. جاكوبسون»، مشروعا اكتشف من خلاله النسخة البشرية للإنزيم الذي ينتج PGE₂ وانتهى ملخص البحث الذي نُشر عام 1999 والذي شارك فيه «جاكوبسون» و«سامولسن» وباحثون آخرون بعبارة مشجعة تقول إن الإنزيم المكتشف «هو هدف جديد ممكن لتطوير الأدوية».

وقد استرعت هاتان المقالتان انتباه عالمين من معهد كارولينسكا كانا قد أنشأ شركة صغيرة اسمها بيوليپوكس Biolipox وكانت هذه الشركة قد فتحت أبوابها في عام 2000 لتطوير أدوية مضادة للالتهاب في أمراض التنفس عن طريق معالجة صنف من المركبات البيوكيميائية (الكيميائية الحيوية) اكتشفت حديثا تدعى إيوكسينات coxins، وهي مشتقة أيضا من الحمض الأراكيدوني. وقررت الشركة بعد سنة أن تنوع منتجاتها، فحصلت من معهد كارولينسكا على رخصة الحماية الفكرية للإنزيم المسمى الإنزيم التركيبي للبروستاكلاندين F الجسدي الميكروي^(٢) (mPGES-1). هذا وإن أي دواء يعيق انتقائيا تصنيع الإنزيم mPGES-1، يمكن أن يوقف الألم والالتهاب من دون تأثيرات جانبية هضمية أو قلبية وعائية، لأنه لن يخفض من مستويات PGI₂. وتقول «Ch. إيدنوس» [المسؤولة العلمية الرئيسية في الشركة بيوليپوكس]: «لقد أدركنا أنه من الممكن أن يكون هذا مفيدا كجيل ثالث من مضادات الالتهاب اللاستيرويدية».

تحرير المثبطات^(٣)

تقع الشركة بيوليپوكس اليوم في بناء غير مميز يحتوي أيضا على المكتبة العلمية وقسم المعلوماتية البيولوجية والاقسام التدريسية التابعة لحرم معهد كارولينسكا

مراجع للاستزادة

Identification of Human Prostaglandin E Synthase: A Microsomal, Glutathione-Dependent, Inducible Enzyme, Constituting a Potential Novel Drug Target. Per-Johan Jakobsson, Staffan Thoren, Ralf Morgenstern and Bengt Samuelsson in *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, Vol. 96, No. 13, pages 7220-7225; June 22, 1999.

Is mPGES-1 a Promising Target for Pain Therapy? Klaus Scholich and Gerd Geisslinger in *Trends in Pharmacological Sciences*, Vol. 27, No. 8, pages 399-401; August 2006.

Deletion of Microsomal Prostaglandin E Synthase-1 Augments Prostacyclin and Retards Atherogenesis. Miao Wang, Alicia M. Zukas, Yiqun Hui, Emanuela Riccietti, Ellen Puré and Garret A. FitzGerald in *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, Vol. 103, No. 39, pages 14507-14512; September 26, 2006.

Scientific American, January 2007

الأفلام السينمائية في عيوننا^(*)

تعالج الشبكية معلومات تفوق كثيراً ما تخيله أي شخص على الإطلاق، بحيث تُرسل دسنة أفلام سينمائية مختلفة إلى الدماغ.

<٢> ويريلين - <٢> روسكا

كثيراً ما نأخذ قابلياتنا الإبصارية المذهلة كأمر مسلم به، بحيث لا يتوقف إلا قليل منا متفكراً في الكيفية التي نحقق بها الرؤية فعلياً. ولعدة قرون. ربط العلماء بين آلة المعالجة الإبصارية وآلة التصوير التلفزيونية؛ إذ تركز عدسة العين الضوء الداخل على صفيحة^١ من المستقبلات الضوئية في الشبكية، وتحول هذه المكاشيف الضوئية تلك الفوتونات بطريقة سحرية إلى إشارات كهربائية، يجري إرسالها على طول العصب البصري إلى الدماغ لمعالجتها. ولكن التجارب الحديثة التي أجريناها نحن الاثنين وغيرنا، تشير إلى أن هذه المضاهاة الوظيفية غير كافية، فالشبكية تقوم في الواقع بإجراء كم هائل من سيرورات المعالجة في داخل العين مباشرة، ومن ثم تُرسل سلسلة من العروض representation الجزئية إلى الدماغ لتفسيرها.

تحمل بعض المسارات الأخرى معلومات حول الظلال والإنارات. هذا ولا يزال من الصعب تصنيف بعض العروض الأخرى في أبواب تخصصها.

يتم نقل كل مسار بواسطة حشد من الألياف تخصه ضمن العصب البصري إلى المراكز العليا في الدماغ، حيث يحدث المزيد من سيرورات المعالجة الأكثر تعقيداً، [وللجهاز السمعي البشري كذلك بنية مماثل، إذ ينقل كل عصب سمعي معلومات تخص مجالاً محدوداً جداً من طبقات الصوت pitches، ثم يقوم الدماغ بعد ذلك بتجميعها معاً]. لقد بين الباحثون الذين يدرسون القشرة الإبصارية أن الصفات المختلفة (مثل: الحركة واللون والعمق والشكل) تجري معالجتها في مناطق مختلفة من الدماغ، وأن إصابة منطقة معينة يمكن أن تسبب عجزاً في حس وإدراك وفهم صفة محددة ما، ولكن مقدرة الدماغ على مجرد استكشاف مثل هذه الصفات إنما تتشأ في المقام الأول في الأفلام السينمائية الشبكية retinal movies.

تبيّن الأشكال في الصفحات التالية أفضل تفسيراتنا فيما يخص الكيفية التي تقوم بها الشبكية بإبتداع الصور الكهربائية السريالية surreal التي تخبر الدماغ بالمعلومات. وبمتابعة بحثنا سنبدأ بإلقاء بعض الضوء على الكيفية التي أنشئ وفقها كل فيلم من هذه الأفلام السينمائية، ولكننا لا نستطيع بأي حال

لقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج المدهش بعد قيامنا باستقصاء شبكيات عيون الأرانب المشابهة بشكل رائع لشبكيات عيون البشر. [وقد أدى عملنا على شبكيات عيون حيوانات السلمندر، وهو نوع من الضفدعيات، إلى نتائج مماثلة]. إن الشبكية فيما يبدو هلالاً بالغ الصغر من مادة دماغية جرى إبعادها إلى محيط الجسم من أجل أن تحظى باتصال مباشر مع العالم الخارجي، ونساءً هنا كيف تركّب الشبكية العروض التي ترسلها؟ وكيف تبدو هذه العروض عندما تصل إلى المراكز الدماغية الإبصارية؟ وكيف تنقل تلك العروض الثراء الضخم للعالم الحقيقي؟ وهل تضفي هذه العروض أي معان تساعد الدماغ على تحليل مشهد ما؟ هذه التساؤلات هي مجرد بعض الأسئلة الملحة التي شرع بحثنا في الإجابة عنها.

لقد وجدنا أن خلايا عصبية متخصصة (أو عصبونات) قابضة عميقاً داخل شبكية العين، تقوم بإرسال ما يُعتقد بأنه دسنة مسارات tracks من أفلام سينمائية (بمعنى مستخلصات متميزة distinct abstractions من العالم المرئي). ويجسد كل مسار بياناً ابتدائياً لأحد جوانب المشهد الذي تواصل الشبكية تحديثه وإرساله إلى الدماغ. فعلى سبيل المثال، ينقل أحد المسارات صورة تشبه الرسم التخطيطي، بحيث لا تحدد إلا حافات الأشياء؛ في حين يستجيب مسار آخر للحركة التي غالباً ما تكون ذات توجيه معين، كما





بنشأ سلوك الشبكية المذهل من بنيتها المعقدة. لقد أضافت التجارب المضنية التي أجراها الكثير من المتخصصين تفاصيل فيزيولوجية إلى النموذج الكلاسيكي الخاص بالدائرة circuitry الشبكية الذي فصله أول مرة عالم التشريح الإسباني العظيم <R S> كاجال قبل قرن من الزمن، والذي ظل يعاد في مراجع التشريح منذ ذلك الحين إلى اليوم ①. فالشبكية الشفافة تتألف من طبقات من العصبونات مرتبة بشكل بديع ②. وتضم الطبقة الخارجية الأكثر بعداً عن العنسة كلاً من خلايا النابيت (الأعمدة) rods والمخاريط cones التي تمتص الضوء الوارد إلى كليهما وتحوله إلى فعالية عصبونية. وتتصل هذه المستقبلات الضوئية بعشرة أنواع مختلفة من العصبونات تعرف بالخلايا ذات القطبين (ثنائية القطب) bipolar التي ترسل أزرعاً طويلة ناقلية للإشارات (تسمى محاور) إلى طبقة مركزية «صفيرية داخلية» inner plexiform. وتبدو هذه العصابة كسلسلة من عشر نضائد (طبقات) strata متميزة متوازية ويوصل محوار كل خلية من أنماط الخلايا ذات القطبين إشارات إلى قلة من هذه النضائد فقط. وعلى الجانب الداخلي الأقصى من الطبقة الصفيرية ③ يوجد اثنا عشر نمطا مختلفا من الخلايا العقدية ganglion cells (باللون الأرجواني). ويرسل معظم هذه الأنواع امتدادات تشبه الأصابع تسمى تغصنات dendrites إلى داخل نضيدة واحدة منفردة، حيث تستقبل دخل استثنائياً excitatory input من عدد محدود من العصبونات ذات القطبين (باللون الأخضر). وتولد الخلايا العقدية خرج output من كينونات سينمائية ينقلها العصب البصري إلى مناطق الدماغ المختلفة لتفسيرها وتأويلها. هذا وتتفرع بعض التغصنات العقدية تفرعا واسع النطاق، بحيث تنقل معلومات متناثرة: في حين تتفرع تغصنات أخرى على نطاق أكثر ضيقاً، بحيث تنقل معلومات عالية الميز. هذا ويستجيب البعض للتغير المتزايد في معدل ما تطلقه الخلايا ذات القطبين من نواقل عصبية neurotransmitter (الجزينات الرسالية)، في حين يستجيب البعض الآخر للتغير المتناقص في هذا المعدل.

sensor صناعي أمام العصب البصري مباشرة، بحيث يقوم مقام الشبكية. لقد تقدم هذا العمل، ولكن لا تزال النتائج فجّة نسبياً. إذ لا تزال المبثوثات transmission تقتصر على ترجمات مبهمة للنماذج الأساسية. لقد بدأت تجارب على البشر في معهد Doherty Eye التابع لجامعة ساذرن كاليفورنيا، وثمة تجارب مماثلة على وشك الانطلاق في كلية الطب بجامعة ولاية واين. صحيح إن الهدف النهائي لهذه المحاولات بعيد المنال على الأرجح، بيد أن نجاحها يكمن أخيراً في تزويد الدماغ بأنماط من النشاط تشبه تلك التي تزوده به الشبكية في الأحوال الطبيعية، بما في ذلك اللغة الطبيعية للرؤية. وسوف يتمثل التحدي اللاحق في اكتشاف كيفية شبك hook-up كل صفة تجريدية بالأياف مناسبة في العصب البصري.

إن الفهم المفصل للغة الطبيعية للإبصار التي تتكون داخل الشبكية ضروري لصنع الأجهزة البديلة prosthetic الناجعة. وفي الوقت نفسه سوف يساعد هذا الفهم الباحثين على تعلم المزيد عن الكيفية التي تشترك فيها العين والدماغ معاً في الرؤية بوضوح، وكيف يتم خداعهما بصرياً، وكيف يتبعان الأجسام السريعة الحركة، وكيف يعبران الأجزاء الناقصة التي تتضمنها أي صورة معروضة على شاشات التلفاز أو الحاسوب أو سينما السيارات. ونحن نأمل أن يكون وصفنا لقدرة الشبكية على المعالجة التمهيدية هذه خطوة نحو الهدف.


من الأحوال تقديم نموذج كامل، هذا وتحمل الأفلام السينمائية اثنا عشر كافة المعلومات التي سوف يستقبلها الدماغ في أي وقت لتأويل العالم المرئي. ولكننا لا نستطيع حتى الآن أن نقول كيف يتم دمج أنماطها وأشكالها. ربما كانت تلك الأفلام السينمائية تعمل كدالات clues أولية. كنوع من السقالات scaffolding يُشيد عليها الدماغ مضامينه. ولا يختلف هذا المفهوم كثيراً عما يوصف «بعين العقل» mind's eye التي تسبك كلمات رواية ما في حكاية هادفة.

ومع أن عروض الشبكية فيما يبدو تلتقط الحقائق الإبصارية لمشهد ما (كمائدة عشاء أو شلال أو وجه يتحدث) بشكل تام، فإن هناك مكونات أساسية تبدو مفقودة. فلا شيء يتعلق بالمشاعر أو المواقف أو الحكمة أو المباشرة يظهر مائلاً. ربما تكون تلك السمات أصيلة إلى حد ما في مسارات الأفلام السينمائية التي يترجمها الدماغ، أو ربما نكون باستخدامنا شبكيات عيون الأرنب قد فشلنا في العثور على جميع العروض التي يمكن أن تلتقطها شبكية العين البشرية - والمتثلة في عروض عالية الميز يمكن أن تستخلص نعوتا كالمشاعر بطرق مازال علينا أن نكشف عنها النقاب.


ومع ذلك فمن الواضح أن عروض الشبكية retina's representations تشكل لغة إبصارية طبيعية. ويتمتع اليوم فهم هذه اللغة بأهمية خاصة. فثمة مجموعات بحثية على امتداد العالم تحاول إعادة حاسة الإبصار إلى المكفوفين، وذلك عبر إدخال محسّ

نظرة إجمالية/ رؤية سريالية^(*)


- إن وظيفة الشبكية أكثر بكثير من مجرد تمرير إشارات بسيطة إلى الدماغ. فمن المثير للدهشة أنها تستخرج دسنة عروض متميزة لأي مشهد مرئي، وذلك على هيئة أفلام سينمائية معقدة ذات ظلال باهتة كالأشباح تولدها أنواع قليلة نسبياً من العصبونات.
- يستخدم الدماغ هذه العروض التجريدية لبناء عالم مرئي دقيق في التفاصيل وغني بالمعاني.
- إن فهم «اللغة البصرية» التي تحملها هذه الأفلام السينمائية سوف يساعد الباحثين الذين يبتدعون أجهزة إحساس بصرية صناعية قد تساعد المكفوفين على الرؤية. وينبغي أيضاً أن تدعم تلك التبعيرات الجهود المبذولة لتحديد الكيفية التي ترى فيها العين والدماغ الأشياء بوضوح.



2 طبقات الشبكية



3 الاتصالات داخل الطبقة الضفيرة



إن دخول inputs التي ترسلها الخلايا ذات القطبين إلى خلايا خروج outputs العقدية ضمن كل نضيدة من النضائد لا تكفي لتوليد دسنة العروض السينمائية في جميع الأحوال، ويشار هنا إلى أن الإشارات التي تبثها الخلايا ذات القطبين تحوّلها تشكيلة متنوعة من العصبونات الصغيرة تسمى الخلايا المقرنية (العديمة الاستقطالات) amacrine (باللون الرمادي). ويزاول بعض هذه الخلايا عمله بشكل عرضاني ضمن إحدى النضائد على نحو يمنع التواصل بين الخلايا العقدية البعيدة في هذه النضيدة. كما تثبط عصبونات مقرنية أخرى انتقال الإشارات عمودياً بين النضائد، ومن ثم بين الأفلام السينمائية المختلفة - كما لو كانت تبلغ إحدى النضائد الأ تسجل ما تسجله نضيدة أخرى. وبهذه الطريقة تلتقط الخلايا

المقرنية الإشارات وتبثها من أجل تنسيق المسارات السينمائية. وقد تمكن باحثون أمثال H. واسل <من معهد ماكس بلانك لأبحاث الدماغ بفرايفورت>، و Th. يولر <من معهد ماكس بلانك للأبحاث الطبية في هايدلبرج>، و R. ماسلاند <من مستشفى ماساشوستس العام> من تحديد 27 نمطا مختلفا من الخلايا المقرنية (إلى جانب 10 أنماط من الخلايا ذات القطبين و 12 نمطا من الخلايا العقدية).

إن كل ما نراه في حيّز ما نشاهده والزمن يعضي قدماً، وحتى تسجيل نقطة سوداء ساكنة ثابتة في حيّز ثلاثي الأبعاد لا لون له إنما يؤلف فيلما سينمائيا مادامت الشبكية تراه بشكل متواصل والزمن يتقدم. صحيح إن خلايا كثيرة من كل نمط من الخلايا العقدية تشغل الشبكية ويقوم طقم من هذه الأنماط بنقل فيلم سينمائي منفرد، ولكن أفلام الخلايا العقدية السينمائية هذه تمثل سيولاً مستمرة من الإشارات على عكس أفلام شبك التذاكر التي يُجرى إعدادها صورة فصورة.

إن التفاعلات interactions بين الخلايا ذات القطبين والخلايا المقرنية التي تقوم بقراءتها في أن معاً كل مجموعة من الخلايا العقدية تؤلف البيانات التي نستقبلها لتأويل العالم الإيصاري. فحينما نقرأ ونمسك بالأشياء ونتعرف الوجوه ونسير هنا وهناك، تمثل التآلفات المختلفة لهذه الأفلام السينمائية الدالات الإيصارية الوحيدة التي يتلقاها الدماغ. إنها تشكل "لغة إيصارية" أصيلة ذات صياغة وقواعد نحوية خاصة بها تشمل مجموع المفردات العصبية لحاسة الإبصار.

أفلام سينمائية في ومضة

تستند توصيفاتنا للنشاط المعقد في الشبكية إلى تجاربنا الخاصة، فنحن نقوم بتسجيل ما يحدث في خلايا عقدية فرادي بواسطة إبرة زجاجية مجوفة بالغة الصغر ويتم بواسطة هذا المص الميكروي (المجهري) حقن صبغ أصفر اللون ينتشر بسرعة عبر جميع تفصينات أي خلية عقدية منفردة مبينا لنا النضائد التي يصلها ذلك الصباغ. ويعمل هذا المص أيضا كالإكترود يقيس النشاط الكهربائي للخلية، وهذا يعكس توليفة الإشارات الاستثنائية الواردة من الخلايا ذات القطبين والإشارات التثبيطية الواردة من الخلايا القرنية.

ولنكتسب شعورًا بالأفلام السينمائية التي تسيرها الخلايا العقدية إلى العصب البصري، شرعنا أولاً، بمنتهى البساطة في تسجيل كيف صورت مصفوفة خطية من الخلايا العقدية ومضة مربعة من ضوء جرى تسليطه على شبكية عين أرنب ①. لقد استمرت الومضة

ثانية واحدة واقتصرت على مربع قياس كل جانب من جوانبه 600 ميكرون. وهكذا وقع الوميض على منطقة صغيرة محددة من الشبكية لفترة زمنية معينة.


قمنا بتسجيل إشارات الاستثارة والتثبيط التي استقبلها نمط واحد من الخلايا العقدية خلال هذه الفترة وكرّرنا هذا الإجراء على كل نمط من أنماط دسنة الخلايا العقدية. فكان لكل نمط استجابة مميزة، كما تنوع مدى الاستجابات بشكل لافت للنظر. وفي الشكل أدناه ② يمثل كل مربع ثانية واحدة، ويشير اللون إلى شدة تيار الإشارة في واحد من أنماط الخلايا.

وكان من المثير للاهتمام بالنسبة إلى نمط الخلايا العقدية الموضح هنا أن الخلايا على امتداد عرض الومضة قد استجابت، ولكنها لم تكن ناشطة طوال الفترة الزمنية التي كان الضوء يسطع فيها. وكان من الغريب أن بعض الخلايا خارج امتداد الـ 600 ميكرون قد تنشطت بعد انتهاء الومضة، وهو السلوك الذي ظهر على المخطط على شكل فصين (باللون الأزرق) بعد زمن الثانية الأولى. وهناك مساحة

ثالثة داخل منطقة الومضة تنشطت كذلك نشاطاً طفيفاً بالقرب من العلامة التي تحدد مرور ثانيّتين.

كيف لنا أن نفسّر هذا النمط من الاستجابة ؟ لو ظلت جميع الخلايا ترسل خروج outputs طوال مدة الثانية لكان نموذج الاستجابة «ثيراً» عبر الفسحة span جميعها طوال الثانية بأكملها، بحيث يملأ المربع المقابل على لوحنا grid ③ ولكن في الحقيقة تحدث تصفية للخروج. فهو يبلغ في الاتساع عرض الومضة ولكنه يُفَضِّلُ بانقضاء الوقت بحيث لا يستمر إلا جزءاً من عشرة اعشار الثانية، ولا يبدأ إلا بعد نحو عُشر الثانية من بداية الومضة. لم يكن هناك فقط تأخير طفيف قبل استجابة الخلايا العقدية، بل إن هذه الخلايا استجابت لمدة تكفي فقط لملاحظة كيف تغير الضوء الداخل من مظلم إلى ساطع. وربما يمثل هذا النمط من الخلايا العقدية بدء الإضاءة وليس بقائها المتصل. وربما كان التنشيط الطفيف للخلايا الممثل في الفصين النائيين ينقل نوعاً من إشارات "التوقف"، أما البقعة الزرقاء الثالثة عند علامة مرور ثانيّتين فإنها مكوّن من

Movies in a Flash (٤)




مكونات الإشارة لم نفهمه بعد


صحيح إن كل مجموعة من ستة الأطقم المختلفة للخلايا العقدية تبتدع قراءة مميزة تتركز على ناحية ما من العالم الإحصائي، ولكن علينا أن نتذكر أن هذا الخرج ينجم عن الاستثارة التي تحدثها الخلايا ذات القطبين والتنشيط الذي تحدثه الخلايا المقرنية. وما النتيجة النهائية إلا النموذج الصافي النهائي المشذب. هذا وتبين المخططات أدناه 4 و 5 و 6 كلا الدخول والخرج النهائي لنمط من الخلايا العقدية يختلف عن النوع الموضح سابقاً.

بهذه الطريقة يرسل كل نمط من الخلايا العقدية تمثيلاً زمكانيًا spacetime نهائياً على طول العصب البصري إلى الدماغ. ويكون كل تمثيل مُنتجاً مميزاً ينشأ عن زوج من نماذج الاستجابة الاستثنائية والتثبيطية 7. وترسب أنماط الخلايا العقدية الاثنا عشر مع مرور الزمن اثني عشر من هذه السيول السينمائية إلى الدماغ. (ولم نسجل هنا إلا سبعة من أجل جعل التجربة طيبة). هذا ويحدث تنوع لا يصدق من النشاط عند الاستجابة لمربع وامض بسيط ما.

7 دخول إلى سبعة أنماط من الخلايا العقدية



نشاط نمط ثان من الخلايا العقدية



وجه مصفى

هدفنا، بالطبع، هو معرفة كيف تستخرج كل مجموعة من الخلايا العقدية معنىً من معاني العالم المرئي. ولما كانت الشبكية مصممة لمعالجة معلومات تفوق في الأهمية مجرد ومضة الضوء، فإننا تسألنا ماذا يمكن أن يحدث حينما تشاهد الشبكية مشهداً طبيعياً مثل شخص يتحدث. فما الذي ستظهره عروض كل من الأفلام الاثني عشر؟ وهل يستخرج الفيلم الواحد صفة تغفلها الأفلام الأخرى؟

وعلى الرغم من الشروح التي تبدو مباشرة ودقيقة عن الكيفية التي فهمنا بها معالجة مربع من الضوء، فإنه يصعب، إلى حد لا يُصدق، سنر شبكة عين أرنب حي فعلياً باستخدام عدد كافٍ من **الإلكترونيات**^(١) أثناء ومضة بسيطة مدتها ثانية واحدة، باعتبار ذلك أقل بكثير من مشهد طبيعي يدوم دقيقة من الزمن، ومن أجل هذا التمرين الأخير قمنا ببرمجة المعلومات من تجربة الومضة داخل حاسوب يحاكي شبيبة chip شبكية صناعية شهيرة (هي الشبكية العصبية الخلوية) كان قد طورها **«اشوا»** [من جامعة كاليفورنيا بيريكلي] و**«T. روسكا»**^(٢) [من الأكاديمية المجرية للعلوم في بودابست]. فقد حولت هذه المنظومة system المربع الوامض إلى اثني عشر نموذجاً زمكانياً من الاستثارة والتثبيط تشبه إلى حد كبير النماذج التي تولدها الشبكية الحية.

وبشيء من الجراءة عرضنا شبيبة الشبكية المبرمجة في مشهد طبيعي، إذ جلس أحدنا **«ويريلين»** أمام الكاميرا وتحدث لمدة

Face Filtered (٠)

(١) إلكترونيات أو مسرى أو قطب كهربائي.

(٢) هو والد **«B. روسكا»** المشارك في تأليف هذه المقالة.

٢ عروض مؤلفة مرسلة إلى الدماغ



ثانية واحدة

الزمن

١ عروض خلوية عقدية لوجه يتحدث



3

4

5

6

7

وانغلاقهما، وذلك بالاستناد إلى بروز بعض العروض وخفوتها على نحو يجعله يبدو كالشبح. وهذا هو ما يستقبله الدماغ. إن أفلامنا السينمائية ما هي إلا تقريبية، ومع ذلك فهي توضح بشكل لافت أن هذا النسيج العصبي الرقيق (أي الشبكية) في مؤخرة العين يقوم بفرز العالم المرئي إلى ستة مكونات متميزة. وتساخر تلك المكونات سليمة ومنفصلة إلى مناطق إحصارية متميزة في الدماغ بعضها واع وبعضها الآخر غير واع. إن التحدي الذي يواجهه علم الأعصاب حالياً هو فهم كيف يفسر الدماغ ويؤزل رزم المعلومات هذه ليولد منظراً متكاملًا رائعاً للواقع.

إن كل واحدة من المصافي تكون حساسة تجاه سمة معينة من سمات المظهر الجسدي للوجه وحركته، وأن كل نمط من أنماط الخلايا العقدية له طريقته المميّزة في رسم صورة العالم وكذلك أتاح لنا تلوين العروض representation اقتفاء إسهامات كل مجموعة من الخلايا العقدية في البيان المؤلف النهائي المتولد بعد تراكب الأفلام السينمائية. لقد جمعنا الأفلام السينمائية السبعة المناسبة في فيلم سينمائي رئيسي. فأعطت أربع أطر frames مأخوذة من لحظات مختلفة لحديث «ويربلين» الذي دام دقيقة واحدة، إحساساً بكيفية تحرك وجهه في أثناء انفتاح شفطيه

لا تزيد كثيراً على دقيقة وهنا ولد جهاز المحاكاة الذي قام ببرمجته لهذا التمرين «هـ. باليا» [من جامعة مودابست للتقانة والاقتصاد] بآلاتنا سينمائية لسبعة من عروض الخلايا العقدية المختلفة ① ولتأكيد أن محاكاة الشبكية كان دقيقاً، قمنا بقياس استجابات بضعة عصبونات في شبكية الأرنب الحي إزاء وجه يتحدث وهنا اتضح بسرعة أن كل مجموعة من الخلايا العقدية تعمل كمصفاة filter تستخلص بيانا ومكانياً مميّزاً للعالم ويرسله في فيلم سينمائي مميّز إلى الدماغ. وقد قمنا بإضفاء لون على كلٍّ من العروض التي ولدها الحاسوب بغية تمييز أحدهما من الآخر.

المؤلفان

Erkank Werblin - Botond Roska

قاما بكشف النقاب عن كثير مما يخص الدائرة circuitry الوظيفية للشبكية في أوائل التسعينات في جامعة كاليفورنيا بيريكلي. ويواصل «ويربلين» عمله هناك أستاذاً في علم الأعصاب، وكان قد نشر في عام 1973 مقالة في ساينتفك أمريكان بعد اكتشافه هو وزميله «د. دولنج» [من جامعة جون هوبكنز] خصائص فيزيولوجية متميزة تنفرد بها عصبونات الشبكية. أما «روسكا» فهو رئيس مجموعة في معهد فريدريش ميشر للأبحاث الطبية البيولوجية في بازل بسويسرا، حيث يعمل على تطوير تقنيات جينية لتحديد المسارات الإحصارية.

مراجع للاستزادة

Directional Selectivity is Formed at Multiple Levels by Laterally Offset Inhibition in the Rabbit Retina. Shelley, Fried, Thomas A. Münch and Frank S. Werblin in *Neuron*, Vol. 46, No.1, pages 117-127, 2005.

Parallel Processing in Retinal Ganglion cells: How Integration of Space-time Patterns of Excitation and Inhibition Form the Spiking Output. Botond Roska, Alyosha Molnar and Frank S. Werblin in *Journal of Neurophysiology*, Vol. 95, pages 3810-3822, 2006.

يمكن رؤية الشريط السينمائي الذي صغته الشبكية لوجه المتحدث على الموقع: www.sciam.com/ontheweb

sa

Scientific American, April 2007

بالطبع يمكن أن تكون استنتاجاتنا فيما يخص المعلومة التي التقطتها كل واحدة من المصافي الاثنتي عشرة غير صحيحة. ولسوء الحظ فإنه يستحيل تمثيل النماذج التي سجلناها على الصفحة المطبوعة بشكل دقيق، لأن تلك النماذج تتوالى متواصلة كأفلام سينمائية، ولكن يجب ملاحظة أنها تحتوي على عدة فرجات فارغة. ومع ذلك، فإن طريقتنا تبين



أربع ألوان



ثلاث ألوان



السيليكون يصدر حزمًا ليزرية(*)

تمكن العلماء أخيرًا من دفع السيليكون لإصدار حزم ليزرية، وخلال
بضع سنوات ستتعامل الحواسيب مع الضوء إضافة إلى الإلكترونيات.

«بهرام جاللي»

إن حزمة الليزر التي تظهر في الصورة (اللون الأحمر والأبيض في العنوان) كانت الأولى التي يصدرها جهاز من السيليكون، وضوؤها تحت الأحمر غير مرئي للعين ولكنه يظهر في الصورة بلون غير حقيقي. يمكن لليزرات السيليكون المتكاملة مع الشبكات الميكروية (الخلفية) أن تجعل الحوسبة بواسطة الضوء القليلة التكلفة أمراً عملياً. أمراً عملياً.

تتضمن ليزرات ومضخمات ضوئية تعتمد حالياً على مواد تصدر إشعاعاً ليزرياً أكثر تكلفة بكثير وأقل شيوعاً من السيليكون.

إن استبدال أسلاك التوصيل النحاسية التقليدية بقنوات ضوئية يمكن أن يرفع حدود سرعة نقل البيانات عدة مراتب لا تسطيع التقانة الحالية الوصول إليها. فمثلاً إن سرعة "المودم" السلكي، وهو الجهاز العامل في اتصالات الإنترنت المنزلية، محدودة حالياً

تُمكن شبكات السيليكون القليلة التكلفة المهندسين من استثمار سيالات الإلكترونيات لإنجاز وظائف وسيرورات لا تحصى تجعل حواسيبنا وأجهزة الهاتف الخليوي والأجهزة الإلكترونية الأخرى مفيدة للغاية. فإذا تمكنت دارات السيليكون التكاملية بشكل مشابه من توليد حزم الضوء، والتحكم فيها، فإنها ستخلق مجاًلاً من التقانات الجديدة الرخيصة والمناسبة للعديد من التطبيقات الأخرى. ولكن الطبيعة الخاصة للسيليكون أحبطت، لعدة عقود من الزمن، الجهود العنيدة للعلماء لتحويل هذه المادة إلى منبع للضوء المركز الضروري وهناك حالياً مجموعات أبحاث عديدة، بما فيها مجموعتنا، تسعى إلى إنتاج ضوء الليزر من السيليكون. ويمكن أن يكون للتقدم في هذا المجال منعكسات هائلة على الأجهزة الإلكترونية التي

MAKING SILICON LASE

تولد فوتونات تنتشر بشكل عشوائي في جميع الاتجاهات، محدثة ضوءاً منتشرًا ذا شدة منخفضة وهذا الضوء، يشبه كثيراً الضوء الوارد من المصباح المتفلقول أما عندما يمر واحد من هذه الفوتونات الصادرة خلال مجموعة إلكترونات في المادة المضيفة تم ضخها سابقاً، فإنه يقدح أو يحث جميع الإلكترونات في أن واحد لتفريغ طاقتها الإضافية. وهذا مفهوم اقترح أول مرة في بحث نشره أينشتاين عام 1917. تسير الفوتونات الناتجة معاً بالاتجاه نفسه بصورة مترافقة، مُشكلة حزمة ضوء عالية التوجيه. وعندما تسير الحزمة خلال ذرات مثارة أخرى في الوسط، فإن فوتوناتها تحث بدورها إصدار فوتونات أكثر بشكل متسلسل وهذا التأثير مشابه للطريقة التي تنمو فيها كتلة من الجليد عندما تنحدر على سفح جبل مغطى بالثلج

لم يحظ تنبؤ أينشتاين حول الإصدار المحثوث باهتمام كبير حتى الخمسينيات. عندما بدأ الفيزيائيون يدركون تطبيقاته الممكنة في الأجهزة الضوئية وفي عام 1958 اقترح <Ch. تاويز> و <A. شافلوف> إحاطة المادة المضخمة للضوء، جزئياً بمرآة تعكس للداخل بعض الفوتونات التي ولدتها المادة. وبينما أن سببورة الحث من ثم ستغذي نفسها (كما في تفاعل تسلسلي) وهذه الطريقة تصبح، بمجرد أن تكتمل، قادرة على توليد دفق ضوئي قوي ذي طول موجة محدد تماماً - أي حزمة ليزرية وبعد سنتين فقط، بُنِ <T. ميمان> تجريبياً أول ليزر عملي مصنوع بضخ بلورة ياقوت صورياً بمصباح قوي

لقد أثبت السيليكون أنه أقل طواعية بشكل كبير من بلورات الياقوت أو من الأوساط الليزرية التي طُورت فيما بعد ففي أشباه الموصلات - وهي مواد يقع أداؤها الكهربائي في منتصف الطريق بين الموصلات الممتازة كالتحاس والعوارل كالمطاط أو بعض أنواع السيراميك - توجد الإلكترونات في عصابات طاقة - وهي مجالات مستويات طاقة، أو حالات طاقة يمكن للإلكترونات أن تشغلها.

ووفقاً للنظرية الكمومية فإن عصابة الطاقة تصف مجال المستويات التي يكون مسموحاً للإلكترونات باحتلالها، أما المجال المحظور بين العصابات المسموحة فهو مجال من مستويات الطاقة لا يمكن للإلكترون أن يشغلها يمكن للإلكترون في مدار الذرة الخارجي أن يربح طاقة بامتصاص فوتون (تجعله يقفز إلى عصابة أعلى) أو أن يحرر طاقة بإصدار فوتون (فيهبط من جديد للأسفل) ويصف الفيزيائيون هذه التأثيرات نوعاً من حوادث الانتثار

لنخيل عصابات الطاقة كسلسلة من الدلاء التي يقع ضمنها الإلكترون (انظر المظهر في الصفحة 69) تبقى عادةً جميع الإلكترونات تقريباً في عصابة الطاقة، أو الدلو الأدنى، تاركة العصابة الأعلى فارغة تقريباً ولكن إذا اصطدم فوتون ذو طاقة مساوية عرض المجال المحظور أو أكبر منه بالإلكترون أمكنه أن يرفع الإلكترون إلى العصابة الأعلى. أي إن الإلكترون يقفز من الدلو الأدنى إلى الدلو الأعلى ويسمى هذا المفعول امتصاص الضوء، وهو الأساس للطريقة

بمعدل نقل بيانات يصل إلى نحو ميكابايت واحد في الثانية، في حين أنه يمكن بسهولة للوسائط الضوئية التي تعتمد على شبيبات السيليكون نقل الملفات الرقمية الضخمة مثل ملفات الفيديو العالي الدقة بمعدلات تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية، وهذا يمثل تحسناً بمقدار 10 000 مرة. ويمكن أيضاً للمحسسات sensors المدمجة التي تحتوي على دارات تكاملية وليزرات سيليكونية أن تضم القدرات التشخيصية «مختبر على شريحة» Lab-on-chip وبعض الاتصالات اللاسلكية للكشف عن الملوّثات أو عوامل الحرب الكيميائية أو المتفجرات، وذلك كجزء من شبكة رصد بيئي وأمني واسعة. وفي تطبيقات عسكرية واعدة، فإن ليزرات السيليكون يمكن أن تكون قادرة على تضليل محسسات الأشعة تحت الحمراء في الصواريخ المضادة للطائرات التي تعمل على متابعة الأثر الحراري، ومن ثم تقديم إجراء مضاد وغير مكلف لهذه الصواريخ

لماذا لزم كل هذا الوقت الطويل لتعليم السيليكون هذه الحيلة الجديدة؟ فبخلاف المواد التي تستخدم عادة وسطاً مضيئاً لتوليد إشعاع الليزر (مثل زرنخيد الكاليوم GaAs) المستخدم في السواقات الليزرية (DVD)، فإن السيليكون ليس مرتباً بصورة طبيعية لدعم السيروورة الثانية المرحلة اللازمة لإنتاج حزمة ضوء متراپط ولا يمكن للسيليكون أن يصدر ضوءاً بكفاءة عندما يُنشط (وهذا هو المتطلب الأول) ومهما كان الضوء الذي ينتجه السيليكون فهو غير قادر على تضخيم هذا الضوء إلى حزمة ليزر بواسطة حثّه على توليد فوتونات أكثر. (الليزر هو مصطلح يصف تضخيم الضوء بواسطة الإصدار المحثوث للإشعاع)


في الليزر، يقوم منع طاقة خارجي، يكون عادة ضوءاً أو تياراً كهربائياً، بضخ الإلكترونات ذرات الوسط المضيف إلى مستوى طاقة أعلى، وهو الذي بدعوه الفيزيائيون مستوى أعلى (أو مثاراً) وعندما تعود هذه الذرات إلى مستوى طاقتها الطبيعي (الأدنى)، فإن الطاقة الزائدة تتحرر على شكل فوتونات ضوء (وهي الوحدات الكمومية الأساسية للإشعاع الكهرمغناطيسي الذي يوجد في الوقت نفسه بطبيعة مزدوجة موجية وجسيمية). وقد دعا أينشتاين هذه السيروورة «بالإصدار التلقائي» spontaneous emission، وهي الظاهرة التي

نظرة إجمالية/ ليزر السيليكون

- لفترة طويلة سعى العلماء إلى الحصول على شريحة سيليكون تستطيع التعامل مع الضوء بمهارة كتعاملها مع الإلكترونات، ولكن السيليكون لا يصدر الضوء بسهولة وبخاصة ضوء الليزر المكثف. إن تقدماً كهذا قد يؤدي إلى نقل البيانات الرقمية بسرعة فائقة كما سيؤدي إلى شبكات محسسات جديدة وإيضاً إلى العديد من الابتكارات.
- بعد سنوات عديدة من العمل، تمكن الباحثون من جعل السيليكون يصدر إشعاعاً ليزرياً باستخدام عدة تقنيات مختلفة مستندة إلى المواد. وأصبحت ولادة تقانة هجينة جديدة - الإلكترونيات الضوئية السيليكونية - في متناول اليد.

التحدي لجعل السيليكون يصدر إشعاعاً ليزرياً^(١)

يوفر السيليكون أملاً كبيراً من أجل حوسبة بواسطة الضوء القليلة التكلفة، لكن طبيعته ذاتها تجعله وسطاً غير قابل للإصدار الليزري.



المكواة للشبكة البلورية [c].

تعتمد عملية الليزرة (إصدار الإشعاع الليزري) على السلوك الكمومي للإلكترونات في المدارات الخارجية للذرات في مادة مناسبة. يحفز (أو يُضخ) إلكترون في الطبقة الخارجية لذرة منفردة حين يمتص فوتوناً. الوحدة الكمومية الأولية للضوء - برقيته إلى مدار وسوية طاقة أعلى (e) - يحرر الإلكترون المحفز فوتوناً حين يهبط إلى سوية أدنى. تشكل الذرات في جسم صلب روابط بواسطة التشارك في هذه الإلكترونات الخارجية [b]، وللوصول إلى تضخيم الضوء، وهو الشرط الأساسي لليزرة، تضخ مضاع طاقة خارجية الإلكترونات المشاركة إلى سويات طاقة أعلى. وحين تحرر الإلكترونات المحفزة فوتونات فإن هذه تحدث بدورها إصدار فوتونات أخرى وهذا يصحح الضوء ويمكن للفوتونات كذلك أن تضخم حين تصطدم بالفوتونات المتارة والتي هي الاهتزازات الذرية

حين ترتبط الذرات المنفردة ببعضها ببعض لتشكل بلورة تتغير سمة سويات طاقة الإلكترونات فتصبح عصابات أعرض [d] بسبب تأثير الذرات القريبة العديدة على الوسط الكهرمغناطيسي. وعلى هذا فإن إلكترونات مضبوخة بقرن من عصابة إلى أخرى. وحين يرسم الخط البياني لطاقت الإلكترونات في وسط ليزري شائع مثل زرنخيد الكاليوم بدلالة الاندفاعات فإن عصابات الطاقة تصطف إحداها فوق الأخرى لأنها تشترك بالاندفاعات ذاتها [e] تصف العصابة الحالات الكمومية الممكنة للإلكترونات، ولكل من هذه الحالات كمية يمكن مطابقتها مع الاندفاع الكلاسيكي الذي ينبغي أن يبقى محفوظاً (بقاء التصادمات). إن للعصابات في السيليكون، على العكس من ذلك، اندفاعات مختلفة. وهذا يعني

التي تقوم فيها الخلايا الشمسية بتحويل الضوء إلى كهرباء.

ولكي تنتج المادة فوتونات فإنها يجب أن تتلقى طاقة كافية لتضخ الكثير من الإلكترونات من العصابة الدنيا إلى العصابة العليا، مسببة ما يسمى انعكاس السكان population inversion (مقاربة بالتوزيع المعتاد في العصابات) وليس من الضروري ضخ كامل الإلكترونات، ولكن يكفي فقط التأثير في الجزء القريب من قمة العصابة الدنيا. وغالباً ما يؤثر المهندسون الإلكترونات مباشرة بإحجام تيار كهربائي عبر دiod شبه موصل. وكذلك فإن إضاءة المادة بمنبع ضوء خارجي، كما فعل «ميمان»، يمكن أن تضخ الإلكترونات

تحرر الإلكترونات الموجودة في العصابة العليا في آخر الأمر طاقة، فتصدر فوتونات عندما تنتشر الفوتونات الناتجة خلال شبه موصل يحتوي على العديد من الإلكترونات في المستوى الأعلى (إسكان إلكترونات)




معكوس)، فإنها تحدث إلكترونات أخرى على إصدار مزيد من الفوتونات وتكون إصدارات شبه الموصل في أحسن الأحوال مساوية للطاقة الممتصة

ومع أن الإلكترونات والفوتونات تتبادل الطاقة في سيرورات الامتصاص والإصدار هذه (سيرورات الانتثار)، فإن الطاقة الكلية للجملة تبقى محفوظة: أي إن الطاقة المكتسبة تساوي الطاقة المفقودة، كما هو مطلوب في قانون انحفاظ الطاقة. ولكن الامتصاص والإصدار يحصلان فقط إذا كان الاندفاع محفوظاً أيضاً وفقاً لقانون انحفاظ الاندفاع. يمكن النظر إلى الاندفاع، الذي يتحدد بالنسبة إلى فوتون يسير (مثل موجة) في بلورة من طول موجته مباشرة. على أنه ميل الفوتون لبتابع سيره في الاتجاه نفسه. ولكن الفوتونات لكونها رماً صغيرة من الطاقة الصافية، لا تملك اندفاعاً كافياً لتسهم في تصادمات الانتثار. ولهذا تحدث

الانتقالات بصورة أفضل عندما يكون للعصابتين الدنيا والعليا (نقاط البداية والنهاية للانتقالات بين العصابات) الاندفاع نفسه ويتحقق هذا التساوي في الاندفاع في المواد ذات الاستخدام الشائع كمصادر للإشعاع الليزري، مثل: زرنخيد الكاليوم وفسفيد الأنديوم، التي تقع عصاباتهما الطاقية بعضها فوق بعض بشكل مباشر، عندما ترسم بيانياً على مخطط يربط الطاقة مع الاندفاع ويسمح هذا الاصطفاف المباشر بتبادل مباشر للطاقة بين الإلكترون والفوتون (انظر الموتر في الصفحتين 68 و 69) فإذا كانت لمادة ما هذه الخاصة المسماة الاصطفاف المباشر direct lineup كانت الخاصة عائدة لترتيب ذرات هذه المادة في شبيكتها البلورية^(١)

على كل حال، إن للسيليكون اصطفافاً

The Challenge of Getting Silicon to Lase (١)
electron population (٢)
crystal lattice (٣)
semiconductor diode (١)
direct lineup (٣)



العصاية ذاتها [g]، وهذا حدث لا ينتج فوتوناً آخر ولذلك فهو لا يساعد على تضخيم الضوء والليزرة. تحتوي عصابات زرنيخيد الكالسيوم العليا على القليل من الإلكترونات نسبياً. وحين يرسم مخططها البياني تبدو العصاية العليا ضيقة ذات جوانب شديدة الانحدار. وبما أن لزرنيخيد الكالسيوم معدل إصدار عال (يضخم الضوء بفعالية لأن عصابات مصطفة إحداها فوق الأخرى) فإن إصداراته الفوتونية تفوق بسهولة امتصاصاته، ولذلك فإن هذه المادة تضخم الضوء. أما عصابات السيليكون العليا الأكثر عرضاً والتي جوانبها أقل انحداراً فتتطلب إلكترونات أكثر لتمتلي. فالسيليكون، بمعدل إصداره المنخفض (الذي سببه الاصطفاف غير المباشر) وبمعدل امتصاص حاصلات شحناته الحرة العالي لا يستطيع تضخيم الضوء.

أن الطاقة من فوتون ممتص لا تكفي لوحدها لكي يقفز الإلكترون إلى عصاية أعلى (f). وعوضاً عن ذلك ينبغي على الإلكترون أن ينتظر حتى يظهر فوتون له الاندفاع الإضافي المناسب لكي تنتقل الطاقة. ولسوء الحظ فإن هذه الإلكترونات غالباً ما تفقد طاقتها الزائدة على شكل حرارة قبل أن يصل فوتون مناسب، وهذا يؤدي إلى عدم إصدار السيليكون الضوء بكفاءة. تتيج كفاءة الإصدار المنخفضة للسيليكون لظاهرة تدعى الامتصاص بواسطة حاصلات الشحنة الحرة أن تعيق تضخيم الضوء والليزرة. فحين يتأثر فوتون مار مع إلكترون محفز (حامل شحنة حر) في عصاية عليا يمكن أن تحدث واحدة من عمليتين متنافستين: فإما أن يحث الفوتون إصدار فوتون آخر مسبباً هبوط الإلكترون إلى عصاية أدنى أو أن يمتص الإلكترون ببساطة الفوتون ما يؤدي إلى مجرد رفع الإلكترون إلى أعلى في

تضخيم الضوء، أو يمكن للإلكترون أن يمتص الفوتون، ثم يتحرك فقط إلى الأعلى في العصاية العليا وهذه السيورة لا تؤدي إلى توليد فوتون آخر. ولذلك لا ينتج منها تضخيم للضوء. ومعدلات حدوث هذين الأثرين المتنافسين تعتمد على عدد الإلكترونات الموجودة في عصاية الطاقة العليا.

تكون العصابات (أو الدلاء) العليا في المواد الليزرية الجيدة (مثل زرنيخيد الكالسيوم) ضيقة وذات جوانب شديدة الانحدار، ولذلك فهي تميل إلى إمساك إلكترونات قليلة نسبياً وعلى العكس من ذلك فإن السيليكون يتميز بعصابات طاقة عليا أعرض وأقل انحداراً، وهي لذلك تتطلب عدداً أكبر من الإلكترونات لتمتلي. وعندما يُضخ السيليكون، يكون لديه ميل كبير إلى دعم امتصاص حوامل الشحنة الحرة. ولما كان لزرنيخيد الكالسيوم معدل إصدار عال (فهو

ييدي السيليكون كفاءة إصدار منخفضة. فمن بين مليون إلكترون مثار هناك إلكترون واحد سوف يحرر فوتوناً بنجاح ومقارنة بالأوساط الليزرية الشائعة مثل (زرنيخيد الكالسيوم) فإن كفاءة إصدار هذا الأخير أكبر بنحو 10 000 مرة.

تحد الفجوة الطاقية غير المباشرة من كفاءة ليزر السيليكون. ولكنها لا تمنع سيورة الليزر بحد ذاتها هناك أيضاً عاملان آخران خاصان بالسيليكون لهما تأثير فامتصاص حوامل الشحنات الحرة. وهي السيورة التي تحصل ضمن عصاية طاقة معينة. لتتصور مجموعة من الإلكترونات (حوامل شحنات حرة) قد ضُخَّت إلى عصاية أعلى فعندما يتأثر فوتون مار مع إلكترون مثار. يمكن أن تحصل واحدة من حادثتين: إحداها ملائمة والأخرى غير ملائمة يمكن للفوتون أن يسبب هبوط الإلكترون إلى عصاية أدنى ويحثه على إصدار فوتون آخر. وهذا بدوره يغذي سيورة

غير مباشر بصورة طبيعية نتيجة بنية بلورية فورية غير ملائمة إطلاقاً، وهذا يعني أن المادة تعاني اختلافاً كبيراً في الاندفاع بين عصاباتهما العليا والدنيا (تصف العصاية الحالات الكمومية الممكنة التي يمكن أن يأخذها الإلكترون. ولكل حالة مقدار يمكن أن يقابل اندفاعاً معهوداً⁽¹⁾، وهذا يجب أن يبقى محفوظاً أثناء التصادمات). لهذا لا تستطيع الإلكترونات أن تتبادل الطاقة بسهولة مع الفوتونات وتحافظ في الوقت نفسه على الاندفاع. وعوضاً عن هذا يجب على الإلكترونات أن تنتظر حتى تظهر موجة اهتزازية لشبكة السيليكون البلورية (والتي تسمى فونون) لها الاندفاع المناسب بالضبط، لتقدم الاندفاع الإضافي الضروري لتسهيل سيورة نقل الطاقة. ولسوء الحظ فإن الإلكترونات في السيليكون غالباً ما تفقد طاقتها الإضافية على شكل حرارة فيما هي تنتظر وصول فوتون مناسب. ونتيجة لذلك

buckets (1)

classical momentum (1)

تحت الذرات المثارة أثناء سيرها إصدار فوتونات أكثر بشكل متسلسل

يضخم الضوء بشكل فعال، لأن عصاباته الطاقية مصطفة بشكل مباشر)، فإن إصداراته الكلية للفوتونات تفوق بسهولة امتصاصاته. أما السيليكون - بمعدل إصداره المنخفض (بسبب الاصطفاف غير المباشر) ومعدل الامتصاص العالي لحوامل الشحنات الحرة فيه - فهو غير قادر على تضخيم الضوء.

وهناك سيرة خفية تعرف باتحاد أوجيه Auger recombination تعيق أيضاً ليزر السيليكون في هذه الظاهرة، فإن الإلكترون في عصابة الطاقة العليا بدلاً من إصدار الضوء يتخلي عن طاقته للإلكترونات الأخرى، وهذه دورها تتخلي عن طاقتها الزائدة على شكل حرارة. وتعتمد كمية الطاقة الضوئية الصانعة على عدد الإلكترونات الموجودة في العصابة العليا ويخضع السيليكون لاتحاد أوجيه أكثر مما هي عليه الحال في زرنيخيد الكاليوم، لأنه يحتاج إلى ضخ إلكترونات أكثر إلى العصابة العليا للتغلب على كفاءة إصداره الضوئي الضعيفة.

تعليم السيليكون إصدار إشعاع ليزري

في السنوات الخمس الأخيرة بدأ الباحثون بإيجاد طرق للتغلب على تلك الصعوبات المتأصلة في السيليكون وإحدى هذه الطرق تستفيد لتحسين إصدار الضوء من ظاهرة رائعة تسمى الحصر الكمومي quantum confinement، تحدث عندما تقيد حركة الإلكترون باتجاه واحد أو أكثر. فبتقييد الحركة في حيز ثلاثي الأبعاد، يدعى القفص الكمومي، يتهيج الإلكترون عندما يتقلص حجم القفص وتحدث هذه الظاهرة نتيجة لندم عدم التعيين لهايزنبرك، الذي

ينص على أن تحديد مكان إلكترون يجعل تحديد سرعته ومن ثم اندفاعه (الذي يساوي حاصل جداء الكتلة في السرعة) أكثر عشوائية. ويخفف هذا الشرط بشكل فعال من قيد انخفاض الاندفاع، الذي يحكم انتقال الطاقة بين فوتون وإلكترون. وهذا يرفع معدل الإصدار الضوئي لشبه الموصل


ولصنع قفص كمومي للسيليكون، يمكن للباحثين أن يصنعوا فيلماً رقيقاً من زجاج السيليكا (ثاني أكسيد السيليكون) وأن يزرعوا فيه قطعاً صغيرة جداً من السيليكون البلوري وهذه البلورات النانوية، التي يمكن أن تُضخ بواسطة إضاءاتها بمنبع ضوء خارجي، لا يتجاوز عرضها بضع ذرات، ولذلك يمكنها تحقيق الحصر الكمومي. وفي عام 2000 كانت مجموعة «أ. بافيسي» في جامعة ترينتينو بإيطاليا أول من سجل دليلاً تجريبياً على بلورات سيليكون أبعادها من مرتبة النانو مضخمة ضوئياً في البداية. استقبل الفيزيائيون هذه النتيجة بالشك، ولكن «Ph» فوشيت «من جامعة روتشستر» وآخرين أكدوا فيما بعد هذه النتيجة. ومع أن هذه الطريقة لم تُنتج الليزر بعد، فإنها أوحى باختراعات أخرى حققت نتائج مشجعة.

ويستفيد أحد الإنجازات التي تستثمر الحصر الكمومي من العناصر النادرة (مثل الأيريوم erbium)، التي يعرف العلماء أنها مُصدرات جيدة للضوء. فمصنّعو الأجهزة يضيفون بشكل روتيني عنصر الأيريوم إلى الزجاج في الليف الضوئي لإنتاج مصخمات تعمل بالضخ الضوئي وليزرات لشبكات الاتصالات قاد «إ. بربولو» (من جامعة كانانيا في إيطاليا) و «S. كوف» (من مركز STM للإلكترونيات الميكروية في جنيف) البحث بهذه الطريقة بهدف تحسين الأداء الضوئي للسيليكون. وقد برهنت مجموعة «كوف» عملياً على إمكانية تصنيع ديودات مصدرة للضوء، (LED) تعمل عند درجة حرارة الغرفة بكفاءات

عالية كتلك التي تحققها الأجهزة المصنوعة من زرنيخيد الكاليوم.

إن الديودات الضوئية المطورة في مركز الإلكترونيات الدقيقة هي عبارة عن طبقات من معدن - زجاج - شبه موصل، حيث يقوم الجهد المطبق بين المعدن وشبه الموصل بتسريع الإلكترونات عبر الزجاج. وعندما تتحرك هذه الإلكترونات في الزجاج، فإنها تضخ إلكترونات ذرات الأربيوم جاعلة إياها تصدر الضوء. وفي هذه الحالة يقوم الحصر الكمومي في البلورات النانوية بدور متواضع نسبياً وهو تحسين موصلية الزجاج. وهكذا ينخفض الجهد اللازم لتحقيق جريان الإلكترونات. ومع أن تقنية الديودات الضوئية هذه مغيدة جداً، فإنها تنتج ضوءاً منتشرأ (عبر الإصدار التلقائي)، بدلاً من ضوء الليزر الذي يتولد بالإصدار المحثوث. وعلى كل حال فإن الباحثين في مركز الإلكترونيات الميكروية يتوقعون تقديم عرض نموذج تجريبي لتوليد الإشعاع الليزري الحقيقي في سيليكون مطعم بالأربيوم في وقت قريب. مؤخراً، رصدت مجموعة «J. سو» (في جامعة براون) إصدار إشعاع ليزري عند درجات حرارة منخفضة (230°K)، وهذه درجة حرارة منخفضة جداً بالنسبة إلى الاستخدام العادي) في قطعة سيليكون ذات بنية نانوية (انظر الشكل في الصفحة 73) لقد حصلوا على هذا الأثر أولاً بتشكيل مصفوفة من عدد كبير من الثقوب في المادة متوضعة بشكل قريب بعضها من بعض (يبعد أحدها عن الآخر بمقدار 110 نانومتر) على سطح فيلم رقيق من السيليكون، ثم بضخ هذه الثقوب ضوئياً. لقد عزا «سو» وفريقه إصدارات الليزر التي رصدها إلى إلكترونات متوضعة على عيوب بلورية تحدث بشكل طبيعي على السطوح البلورية لبني السيليكون النانوية. ثم عزوا الإصدارات العالية إلى عدم التعيين الكمومي في الاندفاع والنتائج من التقييد الموضعي الشديد جداً للإلكترونات. توفر هذه البنى إمكانيات مثيرة

تشغيل ليزر سليكوني^(*)



يستخدم ليزر رامان السيليكوني حزمة ضوئية لإثارة الموجات الاهتزازية الذرية (الفونونات، وهي غير مبيّنة في الشكل) في التجويف الليزري السيليكوني، وهذه بدورها تضخم الفوتونات الضعيفة التي ينتجها السيليكون. وترد المرايا العاكسة جزئياً بعض الفوتونات وتعيدها عبر الوسط، حيث تحدث مزيداً من الإصدارات الفوتونية. (وفي الوقت نفسه يزيل ديود الأزواج الإلكترونية غير المرغوب فيها التي لولا ذلك لأضعفت الضوء الصادر). يندمج شلال الفوتونات الناتج في حزمة مترابطة من الضوء الوحيد طول الموجة هي الحزمة الليزرية.

ونجحنا في تشغيله وفصله كهربائياً يسمى العلماء التأثير المتبادل للضوء مع الفونونات **مفعول رامان Raman effect**، وقد استخدموه بشكل واسع في أواخر الستينات وفي السبعينات للتحري عن الخواص الفيزيائية للعديد من المواد ومن بينها السيليكون وأخيراً سخر العلماء هذا المفعول لجعل الألياف الضوئية تعمل مضخمات وليزرات ولكن نظراً لأننا بحاجة إلى عدة كيلومترات من هذه الألياف لهذا الغرض، فقد فشل الباحثون السابقون في رؤيته وتحقيق طريقة عملية للحصول على شبيبة سيليكونية ليزرية. لكن فريقنا أدرك أن الجميع غفلوا عن حقيقة أن مفعول رامان في السيليكون يمكن أن يكون أكبر بنحو 10000 مرة مما هو عليه في الألياف الضوئية التي تصنع من الزجاج. وهذه الاستجابة الأكبر

الفونونات في شبه موصل بلوري. فإن حزمة ضعيفة من الضوء تعبر هذه الشبكة البلورية يمكنها أن تلتقط طاقة الفونونات هذه وتصبح مضخمة، وإعادة بعض الضوء المضخم ثانية إلى البلورة تجعلها تصدر إشعاعاً ليزرياً.

في عامي 2002 و 2003، وبدعم من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة Defense Advanced Research Projects Agency، بينت مجموعتنا [في جامعة كاليفورنيا بولوس أنجلوس] أن شبيبة من السيليكون يمكن أن تولد الضوء وتضخمه باستخدام هذه التقنية. وفي عام 2004 قدم فريقنا أول ليزر سيليكوني. فكما في ليزر ميامان، ضخمنا جهازنا ضوئياً، وهذه سيروية غير فعالة عادة ولكن ما يثير الدهشة أن جهازنا السيليكوني حول طاقة الضخ إلى ضوء بكفاءة قريبة من كفاءة الليزرات التقليدية الحالية وبعد هذا بقليل قمنا بغرس جهاز الليزر في ديود،

الليزرات نانوية من السيليكون لا تستثمر الليزر الضوئية في السيليكون فحسب، بل قابلة العنصر لعمل كمرايا ومرشحات معقدة تستطيع أن تتعامل مع الضوء المتولد مثل هذه الأجهزة يمكن أن تكون مفيدة في شبكات الاتصالات في المستقبل [انظر «البلورات الفوتونية: أشباه موصلات الضوء» العلوم، العدد 4 (2002)، ص 58]

السيليكون يتعلم

إصدار الإشعاع الليزري^(**)

إن ضخ إلكترونات إلى عصابة الطاقة العليا في بلورة شبه موصلة، ليس هو الطريقة الوحيدة لتضخيم الضوء. إذ يتبع الباحثون طرقاً أخرى في سبيل صنع ليزر سيليكوني فمثلاً إذا أضيفت طاقة إلى

Running Silicon Laser (••)
Silicon Learns to Lase (•••)

من المفاجيء أن جهازنا السيليكوني حول الطاقة المضخوخة إلى ضوء بكفاءة توازي كفاءة الليزر التقليدية.

للإلكترونيات بأن تتراكم وتستنزف طاقة المنظومة ويمكن الوصول إلى ليزر يعمل بشكل مستمر بتطبيق حقل كهربائي (يولد بواسطة ديود مجاور) يقوم بجرف الإلكترونات المتبقية بعيداً. وقد اقترح الباحثون [في جامعة هونك كونغ الصينية] تجريب هذه الطريقة، وبين «H رونغ» والعاملون معه [في الشركة إنتل] ذلك عملياً في عام 2005. وتشير الأبحاث الحالية إلى أن هذه الطريقة فعالة بشكل جزئي فقط، لأن المعدل الذي تُزال به الإلكترونات سيكون محدوداً بالسرعة العظمى التي يمكن أن تصل إليها الإلكترونات في السيليكون (1/1000 من سرعة الضوء)، ولإنجازها تحتاج أيضاً إلى طاقة كهربائية كبيرة. ولحسن الحظ، فنحن نعرف بعض الحيل التي تستطيع تحسين كفاءة الليزر السيليكوني فقفذ السيليكون بيروثونات أو إضافة مقادير صغيرة من الهلثينيوم سيعمل على إجبار الإلكترونات على العودة بسرعة إلى عصابة الطاقة الدنيا بدلاً من أن تقوم حوامل الشحنات الحرة بامتصاص الفوتونات القليلة.

وهذه الإجراءات تقلل من عدد الإلكترونات في العصابة العليا، وهذا بدوره يقلل من إعادة امتصاصها للضوء. وهكذا فإن سحب الإلكترونات يحل جزءاً من المشكلة فقط، ولكن الجهاز مازال يفقد طاقة الضخ عندما تولد هذه الإلكترونات من دون قصد وباستخدام الحيلة التي نتحكم في عمل الخلايا الشمسية، أوضح فريقنا في عام 2006 أن ليزرات رامان السيليكونية يمكن أن تولد قدرة كهربائية، وذلك بحصد الطاقة المضخوخة الضائعة. إن الإلكترونات الحرة، التي تولدت بامتصاص فوتونين من دون قصد، تجري عبر السيليكون لتولد الكهرباء. لقد تعلمنا أنه يمكننا ترتيب جريان الإلكترونات بالطريقة التي يكون فيها استهلاك الطاقة في الجهاز (وهو حاصل جداء التيار الكهربائي في الجهد) سالباً،

العليا لكن قد يتشارك فوتونان أحياناً في طاقتهم ويتمكنان من رفع إلكترون إلى العصابة العليا. ومع أن عدد هذه الإلكترونات المضخوخة بهذه الطريقة قليل نسبياً، فإنها تضعف طاقة المنظومة.

ليست ليزرات رامان هي الوحيدة المعرضة لهذا النوع من فقدان الطاقة. فقد عرض «A كايوتا» و «M لپسون» [من جامعة كورنل] في عام 2006 جهازاً يمكن أن يكون مفيداً لتضخيم الضوء، وذلك بمرجه مع حرمة ضوء أكثر قوة. هذا المضخم، والليزر المكمل الذي لم يتم الحصول عليه بعد، سيعاني الخسارات نفسها، كما هو الأمر في جملة أساسها مفعول رامان.

لتجنب مثل هذه الخسارات، قمنا بتشغيل ليزرنا الأول بشكل نبضي لم يسمح


بكثير تأتي من البنية الذرية المرتبة بشكل جيد في بلورة السيليكون (وأخيراً، صفة متصلة في السيليكون تساعد على إمكانية إصدار الإشعاع الليزري). في حين أن الترتيب الذري العشوائي في الزجاج اللابلوري للألياف الضوئية يُبقي مفعول رامان صغيراً

يتطلب ليزر رامان ضخاً ضوئياً. ولتجنب توليد إلكترونات في عصابة الطاقة العليا للسيليكون التي تعيق إصدار الضوء (مشكلة امتصاص حوامل الشحنات الحرة)، قام فريقنا بإثارة السيليكون مستخدماً الأشعة تحت الحمراء ذات الطول الموجي من رتبة 1500 نانومتر. لقد ابتقت هذه التقنية طاقة الفوتون أقل من عرض المجال المحظور، وهكذا بقيت غير كافية لرفع الإلكترون إلى العصابة

مضخم الأخيلة الليزري السيليكوني

في ليف ضوئي (أو دليل موجة) مقطعه العرضي أكبر كثيراً من الطول الموجي لبعض الضوء الوارد، يبتعد أي شكل ضوئي ويقرب من الوضوح لدى سيره عبر الأنبوب الضوئي نتيجة للتداخل البناء والهدام بين الموجات الضوئية التي تنعكس على جدران دليل الموجة. ويتضافر مفعول التنبير والتضخيم الضوئي لتنبير وتضخيم خيال ما في الوقت نفسه، في حين يمر الضوء في دليل الموجة (الألوان الأكثر حرارة باتجاه اليمين).


بطور الباحثون في جامعة كاليفورنيا بولس أنجلس وفي نورثروب كرومان بصورة مشنكة جهازاً يضخم فيه مفعول رامان (ناثر الفوتونات والفونونات) خيلاً ضوئياً لدى تقدمه خلال دليل موجة سيليكوني سميك. مضخم الأخيلة هذا ينبغي أن يحسن حساسية الاستشعار عن بُعد remote sensing المسمى على الليزر، وكذلك منظومات تشكيل الأخيلة التي يستخدمها العلماء لمراقبة البيئة.



Silicon Laser Image Amplifier (x)

الباحثون في السيليكون تقلبدياً بقاومون التقنيات الهجينة، لأن إضافة مواد أخرى تغير الخواص الكهربائية للسيليكون. ولذلك يُنظر إلى هذه المواد على أنها ملوثات. لكن النتائج المشجعة الحديثة التي حصلت عليها مجموعات عمل في جامعة متسيكان في إن آربر وأيضاً بشكل منفصل فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا، أدت إلى تجديد الاهتمام بهذه المقاربة. فإذا استطاع الباحثون التغلب على مشكلات عدم توافق المواد، أمكن لهذه الطريقة أن تقدم حلاً تجارياً آخر لليزر الذي أساسه السيليكون في الأمد القريب.

لقد بدأت التسابعة الدؤوبة لليزر السيليكوني تعطي أكلها أخيراً. ويبدو أن هذا المجال قد وصل أخيراً إلى النقطة الحرجة التي ستسمح للسيليكون بتحدي مواد الليزر التقليدية. ويجب أن يجعل هذا التقدم تقارب الإلكترونيات والفوتونيات أمراً محتوماً. ومع أنه من المبكر معرفة المسار الدقيق الذي ستأخذه هذه التقنية الإلكترونية الضوئية، فإن التطبيقات الجديدة التي ستصبح ممكنة بواسطة ليزر السيليكون سيكون لها، غالباً، انعكاس كبير على حياتنا اليومية. ■



تكشف فريق الباحثين جيمس سوك (في جامعة براون) عن الليزرة عند درجة حرارة منخفضة في غشاء رقيق من السيليكون مشابه لذلك الظاهر في الأعلى. يحتوي سطح جهاز الفريق على ثقوب أبعادها نانوية، يبعد أحدها عن الآخر 110 نانومتر فقط. تحدث الليزرة بسبب كون الإلكترونات محصورة كمومياً في أقفاص إلكترونية على سطح السيليكون.

المرغوب فيها) والمقاومة ضد التخريب الناجم عن مستويات عالية من الطاقة الضوئية، جاعلة إياه نموذجياً لتوليد حزم ليزرية فائقة الشدة.

لقد طور العلماء أيضاً طريقة هجينة وأعدة لإنتاج ليزر من السيليكون تعتمد على إضافة قطعة من زرنخيد الكاليوم أو فسفيد الأنديموم إلى سطح ركازة سيليكونية. وكان

وهذا يعني أنه في الحقيقة يولد طاقة ويمكن للطاقة الكهربائية المولدة أن تقوم بتشغيل الدارات الإلكترونية الموجودة على الشريحة نفسها.

وفيما بعد، بينت مجموعة باحثينا أن هذه الصعوبة تتلاشى كلياً إذا بدأنا بضخ ضوء ذي طول موجة أطول من 2300 نانومتر تقريباً. إن طاقة الفوتون الناتج صغيرة جداً لدرجة أن زوجاً من الفوتونات لا يمتلك طاقة كافية لرفع إلكترون إلى العصابة العليا، وهذا أمر لن يكون مفيداً في ليزر رامان. لقد وجدنا أن السيليكون يصبح وسطاً رائعاً لإصدار الإشعاع الليزري، وربما واحداً من أفضلها، عندما يُضخ بواسطة الأشعة تحت الحمراء التي يراوح طولها الموجي بين 2300 و 7000 نانومتر (النقطة التي تبدأ عندها أشكال أخرى من تأثيرات مؤذية بالظهور) ويقع هذا الطيف في مدى أبعد من مدى الليزر شبيه الموصلية الموجودة، ولهذا فإن تقنية ليزر السيليكون تسمح بتطوير تطبيقات جديدة. ومن بين جميع المواد الليزرية، يقدم السيليكون واحداً من أفضل الأوساط التي تجمع بين الموصلية الحرارية (لتبديد الحرارة غير

المؤلف

Bahram Jalali

أستاذ الهندسة الكهربائية في مدرسة هنري صامويل للهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس. وهو أيضاً وكيل مركز العلوم في كاليفورنيا. يمضي جلالتي معظم وقته الترفيهي بالبحار مع أولاده الثلاثة على الشاطئ الجنوبي لكاليفورنيا.

مراجع للاستزادة

Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein. Abraham Pais. Oxford University Press, 1982.

The Incredible Shrinking Transistor. Yuan Taur in IEEE Spectrum, Vol. 36, No. 7, pages 25–29; July 1999.

Demonstration of a Silicon Raman Laser. Ozdal Boyraz and Bahram Jalali in Optics Express, Vol. 12, No. 21, pages 5269–5273; October 2004.

Computing at the Speed of Light. W. Wayt Gibbs in Scientific American, Vol. 291, No. 5, pages 80–87; November 2004.

Optical Gain and Stimulated Emission in Periodic Nanopatterned Crystalline Silicon. S. G. Cloutier, P. A. Kossyrev and J. Xu in Nature Materials, Vol. 4, No. 12, pages 887–891; December 2005.

Optical Interconnects: The Silicon Approach. Edited by L. Pavesi and G. Guillot. Springer Series in Optical Sciences. Springer, 2006.

Silicon Photonics: The State of the Art. Graham Reed. John Wiley & Sons, 2007.

Scientific American, February 2007

عروض ومراجعات كتب



لربما أخذ الصبر بالنفاذ مع نظرية الأوتار.

لقد بدأ بعض النظريين في السبعينات من القرن الماضي، بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن استيعاب قوى الطبيعة الأربع في وعاء واحد، بإضافة فضاءات جديدة، كالفضاء ذي الأبعاد السبعة الذي - على ما يبدو - يتطلبه توحيد القوى. ويمكن باستعمال بعض الحيل الرياضية «رسم» هذه الأبعاد (غير المرئية) وإخفاؤها في شقوق النظرية، لكن كان هناك عدد لا نهاية له من الطرق للقيام بذلك. وقد يستطيع أحد هذه الترتيبات وصف هذا الكون. ولكن أي واحد منها؟

لقد تحول ياسر الفيزيائيين إلى إثارة عندما اختزلت الإمكانات إلى خمس ثم إلى ابتهاج في أواسط التسعينات عندما تقوّعت هذه الإمكانات الخمسة في ما يسمى نظرية غشائية M Theory، التي تُعدّ بان تكون الطريقة الصحيحة، وقد تعدى ذلك إلى الأمل بإمكانية التحقق التجريبي من هذه النظرية. وقد كتبتُ أنا شخصياً حينذاك مقالة تحمل عنواناً أصبح محرّجاً الآن «لقد وجد الفيزيائيون في نهاية المطاف طريقة لاختبار نظرية الأوتار الفائقة».

حدث هذا قبل ستة أعوام وها نحن نسمع «سمولين» و«فويت» يبنّان بعودة الموضوع إلى المربع الأول. توحي الأبحاث الحديثة بوجود 10^{500} نظرية غشائية، جميعها صالحة تماماً، وتوصف كل واحدة منها فيزياء مختلفة عن الأخرى. وهكذا أصبحت «نظرية كل شيء».. كما يقول «سمولين» «نظرية لا شيء».

وقد خلص بعض نظريي الأوتار أمام هذه

THE TROUBLE WITH PHYSICS: THE RISE OF STRING THEORY, THE FALL OF A SCIENCE, AND WHAT COMES NEXT

by Lee Smolin
Houghton Mifflin, 2006

NOT EVEN WRONG: THE FAILURE OF STRING THEORY AND THE SEARCH FOR UNITY IN PHYSICAL LAW

by Peter Woit
Basic Books, 2006

أستاذ جامعي « وبطبيعة الحال، فإن الحجة المضادة هي أن سيطرة نظرية الأوتار ناتجة من إدراك معظم النظريين أنها المقاربة الواعدة حقاً - إن رؤية الأوتار المهترزة وهي تعزف التناغم الكوني جميلة إلى حد يجعل النظرية صحيحة بالضرورة إلا أن هذه الميزة أصبحت هي نفسها موضوعاً للتساؤل «فما يلبث المرء - بعد أن بدأ بتعلم تفاصيل نظرية الأوتار الفائقة ذات الأبعاد العشرة، وتعلم شطب الشذوذ «وفضاءات» كالإبي-ياو» - الخ - أن يتحقق من أن صلة رنة الوتر ونغماته الموسيقية هي في الواقع مجرد صلة شعرية.. هذا ما ورد في كتاب «P فويت» [مدرس الرياضيات بجامعة كولومبيا] بعنوان: فشل نظرية الأوتار وهو يرى أن اللف والدوران اللذين يتطلبهما إخفاء الأبعاد الإضافية، التي لا وجود لها على ما يبدو، أدخلت بُنى «في غاية التعقيد» و«شنيعة إلى أقصى حد».

سيعترض فيزيائيون عديدون على هذا الحكم القاسي لكنه لا يجوز صرف النظر عن هذين الكتابين بحجة نقدهما اللازم. فكل من «سمولين» و«فويت» يقرّ بالتقدم المهم الذي أحرزته الرياضيات نتيجة تفحصها للأوتار الفائقة، ولكن ما من نظرية مناسبة تلوح في الأفق. ولذا فهما يلحان على ضرورة الانتقال إلى غيرها. ويقول «سمولين» «يبدو أن جميع المهتمين بالفيزياء الأساسية يتفقون على الحاجة إلى أفكار جديدة» ويضيف «إننا نفقد أمراً كبيراً».

الكون الذكي^(١)

كتابان جديان يقولان إن الوقت قد حان لإسقاط نظرية الأوتار.

المشكلة في الفيزياء: ارتقاء نظرية الأوتار

وسقوط علم وما يلي ذلك

تأليف «L سمولين»

ليست حتى خاطئة: فشل نظرية الأوتار

والبحث عن وحدة قوانين الفيزياء

تأليف «P فويت»

يشير هذان الكتابان إلى عكس ما يطرحه حالياً معظم الباحثين في نظرية الأوتار. حيث يخلصان إلى أن سَعَار البحث في الأوتار والغشائيات وفي الأبعاد المعقوفة هو مجرد بحث سطحي لا عمق فيه. إنه حشر للرموز لا يؤدي إلى فهم الكون أكثر مما يؤدي إليه النثر المؤلف عشوائياً

لا يكتفي هذا التقييم القاسي لنظرية الأوتار - وهي النظرية التي تحاول الجمع بين النسبية العامة والميكانيك الكمومي - بالقول إنها لم تخضع للاختبار وإنما هي غير قابلة للاختبار إطلاقاً، غير قادرة على النبؤ بما يمكن التحقق منه تجريبياً. ولما كان من غير الممكن التحقق من صحة نظرية الأوتار الفائقة، فإنها ستؤول «بشكل ما إلى بلد عجائب مينافيزيائي». «حسب تعبير «B ريتشر» [الرئيس الفخري لمركز المسرع الخطي في استنفورد]. وهذا ما يدفع نقادها إلى التدمير قائلين: «إن العمل مارال يجري فيها على قدم وساق وكأنها اللعبة الوحيدة المتاحة».

«إن سيطرة نظرية الأوتار على العمل الأكاديمي تلزم الفيزيائي النظري الشاب بالانضمام إلى هذا المجال في البحث، وإلا فإنه سيضحي بمستقبله المهني». هذا ما جاء في كتاب «L سمولين» [الفيزيائي بمعهد بيريمتر للفيزياء النظرية] بعنوان «المشكلة في الفيزياء» ويضيف «قال لي بعض نظريي الأوتار إنهم يشعرون أنهم مضطرون إلى العمل في نظرية الأوتار سواء أكانوا يؤمنون بها أم لا. ذلك أنه يُنظر إليها كمفتاح الحصول على منصب

THE INTELEGANT UNIVERSE (١)
string theory (١)
branes (٢)
curled-up dimensions (٣)
metaphysical wonderland (٤)
anomaly cancellation (٥)
Galea-Yau spaces (٦)

عرض ومراجعة

George Johnson

له كتب عديدة، منها «اللهب في العقل، العلم والإيمان والبحث عن الانتظام»، «الجمال الغريب» «موري كيلمان» والشجرة في فيزياء القرن العشرين»

the universe is not elegant but accidental (١)
postmodern fatalism (٢)
strings conference (٣)

الحدثات هذه ويأملون في حدوث طفرة تنير الطريق إلى قمة الجبل فقد احتشدوا في قاعة الشعب الكبرى ببكين، في صيف عام 2006، بمناسبة انعقاد مؤتمر الأوتار، للاستماع إلى «ستيفن هوكينغ» معلناً «إننا على وشك الإجابة عن سؤال بالغ القدم من أين أتينا؟ ولماذا نحن هنا؟» ويأملون ألا يكون الجواب هكذا ■

الحرية المطلقة في الاختيار، إلى القول «إن الكون ليس أنيقاً وإنما اتفاقياً» وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا معنى لمحاولة تفسير قيمة الثابتة الكونية تماماً مثلما لا معنى للبحث عن سبب رياضيائي عميق لكون إشارات الوقوف ثمانية الأضلاع أو لكون عدد الفجرات عند الإنسان 33 فقرة ويرفض أغلب الفيزيائيين قدرية ما بعد

هل الجمال حقيقة والحقيقة جمال؟^(١)

كيف يُطبّق بيت شعر شهير لـ «كيتس»^(٢) في الرياضيات والعلم.

WHY BEAUTY IS TRUTH: A HISTORY OF SYMMETRY

by Ian Stewart
Basic Books, 2007

لم الجمال هو حقيقة: تاريخ التناظر

تأليف «إستيوارت»



كان التناظر، في وقت من الأوقات، مرادفاً للجمال - هذا ما أورده «W» بليك عندما قال: «أيها النمر، أيها النمر المتوهج الساطع في غابة الليل، يا لعينيك وفوانك الخالدة الذكر التي تصوغ تناظرك الرهيب»

كل التحولات التناظرية للمثلث زمرته يبدأ تاريخ «ستيوارت» بالرياضيات البالية واليونانية، ويعرض مفاهيمها الأساسية بطرائق تسمح لطلبة السنوات

IS BEAUTY TRUTH AND TRUTH BEAUTY? (١)

(٢) John Keats (1795-1825) شاعر إنكليزي بُعِدَ واحداً

من أعظم الشعراء الإنكليز

(٣) Ode on a Grecian Urn

(٤) وهو عالم رياضيات مشهور في جامعة أريك بانكترا

وكانت سابق لعمود «التسليط بالرياضيات» في هذه المطلة

(٥) مؤلف الكتاب وهو عالم رياضيات مشهور من

جامعة أريك بانكترا، وكتب سابق لعمود

«التسليط بالرياضيات» في هذه المطلة

(٦) Eona Milley (1892-1950) شاعرة وروائية أمريكية

(٧) Bertrand Russell (1872-1970) فيلسوف بريطاني

وعالم بالمنطق ومصطلح اجتماعي حاز جائزة نوبل

في الأدب عام 1950

(٨) rotational symmetry

(٩) mirror reflection symmetry

(١٠) identity operation

للرياضيات، وهو يركز فيها على مفهوم التناظر فعندما تُجرى عملية على شيء رياضيائي بطريقة تجعله يبدو بعد العملية كما كان قبلها، تكون كشفت النقاب عن تناظر وثمة عملية بسيطة هي الدوران، فمهما حركت وقليت كرة التنس، فلن تغير شكلها. ويقال عندئذ إنها تعرضت لتناظر دوراني فللحرف اللاتيني "H" تناظر دوراني قدره 180 درجة، لأن الحرف لا يتغير عندما تقلبه رأساً على عقب. للحرف أيضاً تناظر انعكاسي مرآتي، لأنه يظهر على حاله دون تغيير عند النظر إلى صورته في المرآة وللصليب المعقوف تناظر دوراني قدره 90 درجة، لكنه يفتقر إلى التناظر الانعكاسي المرآتي، لأن صورته في المرآة تغير اتجاهها ويرتبط أي نوع من التناظر «بزمرة» group ويشرح «ستيوارت» مفهوم الزمرة بأسلوب بسيط عن طريق النظر في العمليات التي تُجرى على مثلث متساوي الأضلاع فبالدورته بزواوية قدرها 60 درجة في أي اتجاه، فإنه يظهر على حاله وثمة عملية لكل عملية «عكسية» تلغي العملية الأولى. تصور رؤوس مثلث رمزنا إليها بالأحرف A, B, C إن تدوير المثلث بزواوية قدرها 60 باتجاه دوران عقارب الساعة يغير من مواقع الرؤوس وإذا اتبعنا هذا التدوير بتدوير مماثل بالاتجاه العاكس، عدنا إلى المواقع الأصلية لتلك الرؤوس وإذا لم تفعل شيئاً للمثلث، فإننا نسمي ذلك عملية «محايدة» وتؤلف مجموعة

عنوان كتاب «إستيوارت» (الذي أله إضافة إلى أكثر من 60 كتاباً آخر) «مكتسب، بالطبع، من أحر بينين مبهمين من «قصيدة لـ كيتس»، هما

«الجمال هو الحقيقة، والحقيقة هي الجمال. هذا كل ما نعرفه على الأرض. وهذا كل ما أنت بحاجة إلى معرفته»

لكن ما هو الشيء، على الأرض الذي كان يعنيه «كيتس»؟ لقد وصف الشاعر «H» «البوت» هذين البيتين بأنهما «لا معنى لهما» وأنهما يحدثان «تشويها خطيراً في قصيدة جميلة» وقد استهل «إ. ساميوز» نقده لشريط سيماني بقوله «أحدى أكبر مشكلات الفن - بل ربما أكبر مشكلاته على الإطلاق - هي أن الحقيقة ليست الجمال، والجمال ليس الحقيقة ثم إنه ليس صحيحاً أن هذا كل ما نحن بحاجة إلى معرفته. ويهتم «ستيوارت» بالكيفية التي ينطبق بها بيت شعر كيتس على الرياضيات. وقد كتبت «F. ميللي» تقول «إقليدس»، وحده، هو من نظر إلى الجمال مجرداً، وفيما يخص الرياضياتيين، فإن لهم موقفاً من المبرهنات العظيمة والبراهين العظيمة، كبرهان إقليدس الأنيق، الذي يثبت أن مجموعة الأعداد الأولية غير منتهية، شبيهاً بموقف «إ. راسل» منها، عندما وصف جمال هذه البرهانات والبراهين بأنه «بارد وصارم»، وأنه مماثل لجمال الأعمال الخالدة في النحت

والفصول العشرة الأولى من كتاب «ستيوارت»، التي سردها بأسلوبه الهادئ الذي عُرف عنه، تعرض تاريخاً حقيقياً

الأولى من المرحلة الثانوية نفهمها ومع متابعة قراءة هذا التاريخ، تصبح الرياضيات ببطء تقنية أكثر فاعلية. وبخاصة عندما نصل إلى الأعداد العقدية "complex numbers" وما نتج منها الأعداد فوق العقدية "و أعداد كايلى". ويختتم هذا التاريخ باكتشافات «إلى» Sophus Lie، الذي سميت زمرة لي Lie groups باسمه، وبأعمال عالم رياضيات ألماني أقل شهرة، اسمه «كيلينك»، الذي صنف زمرة لي وفي هذا القسم التاريخي كله، يمزج «ستيوارت» بمهارة الرياضيات في رسوم تخطيطية شائقة لأولئك الرياضياتيين الذين عرض إسهاماتهم ولا ينتقل «ستيوارت» إلى الفيزياء، وشرح كيف أن التناظر ونظرية الزمر صاروا أداتين ضروريين للفيزياء، إلا في النصف الثاني من الكتاب وثمة فصل عن «أينشتاين» يعرض مزيجاً رائعاً من نظرية النسبية الابتدائية وبعض التفاصيل عن حياة «أينشتاين» بعد ذلك. يقدم المؤلف نظرية الجسيمات particle theory والميكانيك الكمومي، وعدة صفحات عن الأوتار الفائقة، وهو موضوع يعد في هذه الأيام، من أكثر المواضيع إثارة في الفيزياء النظرية و«ستيوارت» متشكك قليلاً في نظرية الأوتار، التي ترى في جميع الجسيمات الأساسية شعيرات دقيقة، لا يمكن تخيلها، من طاقة متذبذبة يمكن أن يكون لها نهاية مفتوحة أو مغلقة مثل شريط مطاطي. إنه لا يورد ذكر كتابين حديثين (روجعا في عدد الشهر 2006/9 من مجلة ساينتيفيك أمريكان) يوجهان نقداً مبرراً إلى نظرية الأوتار فالمؤلف «سمولين» لكتاب *The Trouble with Physics* يشجب نظرية الأوتار، لأنها برأيه «ليست نظرية على الإطلاق»، بل مجرد خليط غير منظم من التخمينات الغريبة التي تبحث عن نظرية قابلة للحياة أما كتاب «وويت» الذي عنوانه «ليست حتى خاطئة» فقد اقتبس هذا العنوان الفيزيائي النمساوي العظيم «باولي»، الذي وصف مرة نظرية بأنها سبيل للغاية بحيث إنها «ليست حتى خاطئة»

ترى، هل نظرية الأوتار جميلة حقاً؟ يظن مروجوها أنها كذلك. ويعتقد «سمولين» و«وويت» أن استيعابها حديثاً ضمن تخمين أوسع وأغنى. اسمه النظرية M، حول الجمال السابق للأوتار إلى بُنى رياضية تشبه في قبحها الدوائر الصغيرة التي ابتكرها «بطليموس» لتفسير المدارات التي

تسلكها الكواكب في دوراتها حول الأرض لنعد ثانية إلى أبيات الشاعر «كيس» السبينة السمعة في رأيي إن «إسايامون» على حق فحتى البراهين الرياضية الجميلة يمكن أن تكون خاطئة ففي عام 1879، نشر السير «إس» كيمب إثباتاً لمبرهنة خريطة الألوان الأربعة. وقد اعتُبر هذا الإثبات أنيقاً طوال عشر سنوات لكنه، وللأسف، لم يكن كذلك ثم نشر واضع الأحجيات الإنكليزي المشهور «إدوين» برهانا خاطئاً أقصر بكثير. وحتى أبرع بكثير

وفي المجلة *The New Ambidextrous Universe* أكتب (المؤلف) عن النظرية الدوامية للذرات وقد كان لهذه المخنة، التي كانت شائعة في القرن التاسع عشر، شبه شديد بنظرية الأوتار الفائقة. فكانت تؤكد أن الذرات لا تشبه النقاط، إذ إنها عرى دقيقة جداً من الطاقة تهتز بترددات مختلفة إنها دوامات صغيرة جداً موجودة في الأثير ether، وهو مادة صلبة لا احتكاك فيها كان يُعتقد أنها تتخلل الفضاء كله. وللذرات بنية عقد ووصلات، تولد أشكالها واهتزازاتها خصائص المواد وما إن تُخلق، حتى تدوم إلى الأبد

وخلال بحثي في النظرية الدوامية للذرات، اطلعت على كثير من آراء فيزيائيين مرموقين، من ضمنهم «إس» كلفن و«إس» ماكسويل، ارتووا أن هذه النظرية كانت أجمل كثيراً من أن تكون حقيقية وقد نُشرت أبحاث كثيرة، وأُلفت كتب عديدة في هذا الموضوع هذا وقادت أبحاث الرياضياتي النمساوي «إس» تيت في الذرات الدوامية إلى إحراز تقدم في نظرية العقد وقد تنبأ «تيت» بأن تطوير الأسس الرياضية لهذه النظرية سيستغرق عدة أجيال ومع أن النظرية الدوامية تبدو جميلة، فقد ثبت أنها طريق رائج لا يوصل إلى أي مكان.

ويختتم «ستيوارت» كتابه بحكمين، أولاهما أن الجمال في الفيزياء لا يؤكد الحقيقة تلقائياً، لكنه يساعد على الوصول إليها، والأخرى هي أن الجمال في الرياضيات هو بالضرورة حقيقي – لأن كل ما هو خاطئ لا بد أن يكون قبيحاً وأنا بدوري أوافق على صحة الدعوى الأولى دون الثانية. فقد رأينا أن برهاني «كيمب» و«إدوين» كانا غاية في الجمال لكنهما خاطئان، إلى ذلك، ثمة مبرهنات صيغت بكل بساطة، ولكن البراهين القبيحة قد تكون البراهين الوحيدة

الممكنة التي تثبت هذه المبرهنات.

سأورد مثالين حديثي العهد فقد تطلب إثبات مبرهنة خريطة الألوان الأربعة استخراج نسخ ورقية حاسوبية بسرعة وكثافة عاليتين تجعلان مراجعتها غير ممكنة إلا بالاستعانة ببرامج حاسوبية أخرى ومع أنه قد يوجد برهان جميل وارد فيما يسميه «إردوس» «كتاب الله» – وهو كتاب يعتقد «إردوس» أنه يشتمل على جميع مبرهنات علم الرياضيات، وأجمل البراهين عليها – فمن الممكن ألا يكون «كتاب الله» متضمناً هذا البرهان وينطبق هذا الكلام نفسه على إثبات «إس» وايل للمبرهنة الأخيرة. لغيرما [انظر «مبرهنة فيرما الأخيرة».

العلوم، العدد 1 (1999)، ص 26]. ومع أن هذا البرهان لا يعتمد على الحاسوب، فإن طوله وتعقيد الشديدين لا يسمحان بوصفه برهاناً جميلاً. وقد لا يوجد إثبات جميل لهذه المبرهنة وبالطبع، يحق للرياضياتيين دائماً أن يكون لهم آمال واعتقادات مغايرة.

ولما كان التناظر هو الموضوع الذي يربط بين صفحات كتاب تاريخ ستيوارت الرابع، فقد يكون من المناسب وضع مقدمة لهذا الكتاب هي مقطع شعري من قصيدة غنائية خالدة كلها هراء نظمها «إس» كارول بعنوان *The Hunting of the Snake* هذا المقطع هو

إغلبا نشارة الخشب ملّحها بالغراء كغها
بالحراد والشريط مقيفاً أحد الأشياء، الرئيسية
مربياً للحفاظ على شكلها التناطري

عرض ومراجعة

Martin Gardener

واصل كتابة عمود «الآلغاز الرياضية» طوال 25 عاماً وقد نُشر آخر كتاب له بعنوان *The Annotated Hunting of the Snake* في عام 2006 من قبل www.norton

- (١) complex numbers أو الأعداد المركبة
- (٢) quaternions أو الأعداد الرباعية
- (٣) cayley numbers أو octonions
- (٤) Joseph Killing
- (٥) superstrings
- (٦) string theory
- (٧) Lee Smolin
- (٨) Peter Woit
- (٩) not even wrong
- (١٠) Wolfgang Pauli
- (١١) M theory نظرية التعلبية (التغطية)
- (١٢) eprcycles
- (١٣) vortex theory of atoms
- (١٤) frictionless
- (١٥) links
- (١٦) knot theory
- (١٧) computer printout
- (١٨) God's book
- (١٩) M-theory



تنميات مستدامة

الصيدلانية إلى المساهمة في ذلك. وتبرعت بالأدوية شركات ميرك وكلاكسو سميث كلاين وجونسون أند جونسون وفايزر ونوفارتس وسانوفي باستور، إلى جانب مساهمات أخرى لها لمكافحة هذه الأمراض المختلفة. وتقدم هذه الشركات كلها دعماً الصادق لتوسيع برامج مكافحة

وقد أن الأوان الذي يجدر فيه بالحكومات أن تنضم إلى هذه الجهود أيضاً. وقد خصصت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً 15 مليون دولار لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، وما هذه إلا خطوة البداية. إذ إنها أقل من عُشر المبلغ اللازم للحملة الشاملة من أجل إفريقيا والذي يصل إلى نحو 250 مليون دولار كل عام. إن أفضل الاستراتيجيات هي ربط مكافحة الأمراض المدارية المهملة بمكافحة الملاريا. وبهذا سيكون بإمكان الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات والعاملين الصحيين في المجتمع أنفسهم المساهمة في مكافحة كل من الملاريا والأمراض المدارية المهملة: إذ إن للملاريا وللأمراض المدارية المهملة تداخلاً جغرافياً واضحاً في البلدان المدارية جميعها. وإلى جانب ذلك، فإن ملايين الأطفال في إفريقيا يعانون الإصابة بطفيليات متعددة في الوقت ذاته: فهم ضحية الملاريا ومجموعة من الأمراض المدارية المهملة الأخرى وتؤدي هذه العدوى المتعددة إلى أضرار وخيمة.

وينبغي لأصحاب القرار السياسي في بلادنا أن يفكروا ملياً بأن مكافحة الفعالة للأمراض تؤدي إلى تعزيز الاستقرار والرفاهية في العالم. بما ستسببه من تنمية اقتصادية أكثر مما تؤدي إليه الأساليب العسكرية بعد اندلاع الاضطرابات. وقد كانت الإجراءات الموجهة لمكافحة الأمراض ذات فعالية كبيرة في الماضي. حتى في أشد البلدان فقراً فقد تم استئصال الجدري، كما انخفض عدد حالات شلل الأطفال بنسبة ألف عمّا كان عليه من قبل في جميع أرجاء العالم. بفضل الجهود التي بذلت في إعطاء اللقاحات، والتي قادها

الروتاري الدولي⁽¹⁾ بشكل أساسي. إن مكافحة الشاملة للملاريا وللأمراض المدارية المهملة معا في جميع أرجاء إفريقيا لن تكلف أكثر من ثلاثة بلايين دولار كل عام، أو ما يعادل نفقات البنتاغون في يومين فقط. ولو خصّص كل من البليون فرد في العالم الغني ثلاثة دولارات (وهي ثمن فنجان قهوة) كل عام في هذه القضية. لأمكن إنقاذ ملايين الأطفال من الموت ومن الإعاقة سنوياً. ولتفادي العالم أيضاً أخطاراً جسيمة قد تنتج من تجاهل الأمراض واليأس الذي تسببه. وتساعد الشبكة العالمية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة (www.gnmdc.org) التي أنشئت حديثاً، على تحويل هذه الفرص إلى حقيقة واقعة.

المؤلف

Jeffrey D. Sachs

مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا.

(1) وهو شكل آخر من داء المثقبيات يصيب السبيل الناقل للطفيليات العنصرية المنبهة لانقباض القلب.

الأمراض المدارية المهملة⁽¹⁾

يمكن مكافحة الأمراض الواسعة الانتشار في جميع أرجاء العالم الفقيرة بإتفاق ما يعادل المصروفات العسكرية لأيام قليلة.

بيع كوكبنا بالفرص الرائعة المستندة إلى العلم لتحسين رفاهية الإنسان بتكاليف زهيدة. ولكن هذه الفرص تغيب عن إدراك أصحاب القرار السياسي وعن الناس في غالب الأحيان. ومن أفضل الأمثلة على ذلك معالجة مجموعة من الأمراض المدارية المهملة التي تسبب العجز وتقتل ملايين الناس. ولكنها غير معروفة جيداً بين الأوروبيين والأمريكيين.

ويشير الخبراء اصطلاحياً إلى هذه الأمراض باسم «الأمراض المدارية المهملة»⁽²⁾، وهي أمراض معدية شديدة الوطأة، تنافس فيما تسببه من مرض وعجز وموت تأثيرات الإيدز والسل والملاريا (البرداء). إلا أنها أقل شهرة منها. ويعود ذلك جزئياً إلى أنها أمراض لا تصيب إلا الفقراء في المناطق المدارية.

وتتجم سبعة من هذه الأمراض عن عدوى الديدان، وهي الديدان الشصية hookworms، وداء الديدان المسلكية trichuriasis، وداء الأسكاريس

(الصفير) ascariasis، وداء البلهارسيات schistosomiasis، وداء الثنينات dracunculiasis أو الديدان الغينية guinea worms، وداء كلابيات الذنب onchocerciasis، وداء الفيلاريات اللمفية lymphatic filariasis. وتنتج ثلاثة أمراض أخرى منها عن الأولي وهي داء الليشمانيات leishmaniasis وداء المثقبيات trypanosomiasis وداء شاكاس Chagas disease. كما أن ثلاثة أمراض أخرى ذات منشأ جرثومي وهي الجذام leprosy، والتراخوما (الخرن) trachoma وقرحة بورولي Buruli ulcer.

ومن بين هذه الأمراض الثلاثة عشر نجد سبعة (وهي الأمراض السبعة الناجمة عن الديدان بالإضافة إلي الجذام والتراخوما) لها تدخلات وقائية وعلاجية شافية قوية وزهيدة التكلفة وسهلة التنفيذ. وكما أوضح الرئيس «كارتر» من خلال قيادته الشخصية الراسخة طوال أكثر من عشرين سنة، فإن ترشيح الماء بالقماش الرقيق يمكن أن يقلل إلى حد كبير من عبء داء الثنينات. كما أن الناموسيات (الكلل) المعالجة بمبيدات الحشرات يمكنها أن تمنع انتقال داء الفيلاريات اللمفية وأن تخفف سرياً الملاريا خفضاً كبيراً.

وباستثناء داء ديدان غينيا، تستطيع الأدوية أن تعالج جميع الديدان بالمداواة الروتينية القادرة على إبقاء عدد الديدان التي تصيب الفرد بالعدوى، في الحد الأدنى القابل للحمل فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يعالج جميع أطفال المدارس في المناطق التي تنتشر فيها العدوى بالديدان والبلهارسيات، بالأدوية المضادة للديدان حتى ثلاث مرات في العام. وقد اندفعت الشركات المنتجة للمستحضرات

معرفة عملية

حشيش أرضيات الملاعب⁽¹⁾

العشب الطبيعي في مواجهة الحشيش البلاستيكي.

تشهد ساحات الملاعب الرياضية تنافسا قويا بين الأعشاب الطبيعية والحشائش الصناعية.

غالبا ما تؤدي ممارسات الرياضيين العابهم، وبخاصة في الأوقات التي تشهد موجات من المطر والبرد والجفاف، إلى تخريب أرضيات الملاعب العشبية وللتصدي للضرر الذي يلحق بحشائش هذه الأرضيات، اعتمد المسؤولون عن المحافظة عليها وصيانتها بنى تحتية جديدة تسرع في تصريف المياه التجمعة، ونصخ في التربة تيارا من الهواء الساخن لتنشيط جذور تلك الأعشاب والمساعدة على نموها (انظر الشكل في أعلى اليمين).



وفي أواخر ستينيات القرن الماضي بدأ استخدام الحشائش الصناعية في تغطية الأرضيات. وكان أول استخدام لها في ساحات مرصد هيوستن الفلكي، لذلك حملت اسما تجاريا هو حشيش أرضيات المرصد. ظل هذا الاسم مرادفا لكافة أنواع الحشائش الصناعية المستخدمة في أرضيات الملاعب في جميع أرجاء البلاد، وامتد هذا الاستخدام ثلاثين عاما على الرغم من شكوى اللاعبين من قساوة وطء أقدامهم عليها ومن تعرضهم لإصابات رضية عند وقوعهم. وحمل العقد الماضي معه جيلا جديدا من المنتجات، صنعتها شركات مثل الشركة فيلد ترف، وتم تبنيها واعتمادها على نطاق واسع. وأخذت هذه المنتجات تتباهى بخصلاتها البلاستيكية الأكثر نعومة وتماسكا، والأسهل مదاسا والأخف وطء، بسبب ما تحمله من حبيبات من المطاط، أو من المطاط والرمل. بين حنبات أوراقها وبصلاتها (انظر الشكل في أسفل اليمين).

ويستمر الجدل قائما حول طبيعة التغطية الأفضل لأرضيات الملاعب ففي صيف عام 2006 جددت جامعة بورديو أرضيات ملعب كرة القدم فيها مستخدمة سلالة جديدة من عشب برمودا، استُئِنِت خصيصا لتحتمل درجات حرارة أكثر برودة. يقول «ال كاييتوس» [المسؤول عن حشائش أرضيات الملاعب في الجامعة] «إن المواد الصناعية الجديدة جيدة، لكن لا شيء أفضل من العشب الطبيعي». ويؤكد المسؤولون عن الملاعب أن معظم اللاعبين يفضلون الأرض المغطاة بالعشب الطبيعي قبل تعرضه لأحوال مناخية شديدة، حيث يجعله الجفاف قاسيا، في حين يجعله المطر زلقا وغير منتظم. يقول «إ. فراندينا» [المسؤول عن ملعب فريق «يوفالو بيلز» في نيويورك] «إن ما يمكن أن يقام على ملاعب الولايات الشمالية بعد الشهر التاسع من السنة، عندما يتوقف العشب عن النمو، هو ألعاب تجرى في الطين، إذ تكون قد خسرت ملعبك لموسم كامل». لذلك اعتمدت منشأته، حيث يكثر تساقط الثلوج، على الحشيش الصناعي لسنوات عديدة.

وللتكلفة المالية دورها في إقرار اختيار أحد نوعي التغطية، حيث تراوح القيمة المتوسطة لتكلفة التغطية بحشيش صناعي ما بين 500 000 و 800 000 دولار. أو أكثر من ذلك. في حين تراوح هذه القيمة في حالة العشب الطبيعي ما بين 250 000 و 500 000 دولار. لكن هذا العشب يحتاج إلى تسميد وسقاية وتعشيب وتشذيب، ويبقى الخيار الشخصي معيار الفصل والإقرار. فقد استبدلت جامعة ولاية متشيكان في سنة 2002 وحدات من العشب الطبيعي متداخلة في ما بينها من صنع الشركة «جرين تك» بولاية جورجيا، بالحشيش الصناعي الذي كان يغطي أرضيات ملاعبها، رغم وجود منشأة مشهورة بصنع هذه الحشائش في ولاية متشيكان. كما يقول مؤسس الشركة «لأن العشب هو الأفضل». كما اختار «فراندينا» [المسؤول عن ملعب فريق يوفالو

بيلز] عند تجديد طبقة الحشيش الصناعي التي تغطي أرضيات الملعب في عام 2006، موردا آخر لهذا الحشيش «لأن منتجه يعطي إحساسا أقصر حين وطئه والدوس عليه».

STADIUM TURF (١)



يُحمل الحشيش الصناعي، المصنوع على شكل رقعات متشابكة أو الممدد فوق صوان، على قاعدة من الحجارة المكسرة، ونعمل حشوة من حبيبات من المطاط أو من مغلف من الرمل والمطاط على حفظ نصلات الحشيش منتصبة وقائمة. أما الطبقات الظهارية الداعمة فتثبت المصلات في امكنتها وتسمح بتصريف المياه.


تسبب هذه الأرضية، البالغة كتلتها 17 مليون باوند، داخل صالة الملعب في أثناء اللعب، وتطوى في الأوقات الأخرى وتحفظ في المكان المخصص لها حيث يمكن لعشبيها أن ينمو. وبذلك يمكن أن تعقد في صالة الملعب لقاءات وحفلات موسيقية وسواها. كما أن سقف هذه الصالة، المصنوع من مواد صناعية شفافة، قابل للضغط والطي؛ وقد أقيمت فيها مباراة الكلية في كرة القدم في الشهر 2006/1.

■ الجروح والإصابات: يقول المدربون الرياضيون لفريق «يوفالو بيلز» كاتب هذه المقالة واحد منهم إنهم لم يلحظوا زيادة في تعرض اللاعبين للإصابة بالجروح على الأرضيات المغطاة بالمنتجات البلاستيكية الجديدة، وهو ما كان موضع انتقادهم في بعض الأحيان لتلك المغطاة بالمنتجات السابقة، وقد تسبب الأرضيات الجديدة أنواعا مختلفة من الرضوض التي تلحق بالأقدام والأرجل أكثر مما تسببه أرضيات العشب الطبيعي، إلا أنها لا نسب بالضرورة جروحا أكثر منها.

■ طحن الإطارات: تأتي الحبيبات المطاطية التي تُحشي بين أوراق الحشيش الصناعي من إطارات السيارات القديمة بالدرجة الأولى. يطحن هذا المطاط المسمى مطاط الجوار، حتى تصبح حبيباته بحجم حبات الخرز الصغيرة. وقد يبرد المطاط أثناء طحنه حتى درجات حرارة شديدة الانخفاض، ويعرف عندها بالمطاط القوي. ليشكل حبيبات بحجم حبات الرمل، تكون أكثر انتظاما في تكورها مما ينتج عيوات أشد تراسا وأكثر ثباتا.

■ العشب القابل للضغط والطي: في الشهر 2006/8، افتتحت جامعة «نيكس» ملعبا جديدا (هو في الوقت ذاته ملعب فريق «أريزونا كاردينالز» المحترف في كرة القدم الأمريكية)، وهو أول ملعب في الولايات المتحدة يمكن بسط أرضيته العشبية وطئها. تقوم هذه الأرضية على قاعدة طولها 403 أقدام وعرضها 234 قدما، قائمة على مجموعة من السكك الفولاذية المثبتة على أرض من الإسمنت المسلح.

يمكن للعشب الطبيعي أن ينمو في صوانٍ يمكن تبديل امكنتها، كما يمكن تشييد بعضها ببعض



مزيج من الرمل والترية

حجارة مكسرة

قاعدة من البولي إيثيلين

قنوات لتصريف المياه بالجريان الطبيعي أو بالشفط، وللتسحين بالهواء المضغوط



تسند الأرضيات الصناعية، التي لا تحمل حشوات في داخلها، إلى الياف من النايلون مخاطلة على شبكة ظهارة مثبتة على وسادة كتة لامتصاص الصدمات ترتبط الوسادة بقاعدة تجميع مصنوعة من المطاط والبولي يوريثان وبعض الفلزات.



اسألوا أهل الخبرة

كيف يقتفي الباحثون، عبر القرون، أثر دنا الميتوكوندريات؟^(١)

وقبل أن يشرع الناس في السفر حول العالم، أدت التغيرات النادرة التي طرأت على دنا الميتوكوندريات إلى نشوء أنماط متفردة من دنا الميتوكوندريات في القارات المختلفة لذا، فإن باستطاعة العلماء أن يُرجعوا معظم أنماط دنا الميتوكوندريات المعاصرة إلى القارة الأصل، وذلك بناءً على قطعة من دنا الميتوكوندريات - تُعرف بالرمز HvrI - التي تعتبر المكان الأكثر ترحيحاً لحدوث الطفرات. وبإمكان العلماء تحليل القطعة HvrI ليجدوا سجلاً للطفرات السابقة كافة، ذلك أن دنا الميتوكوندريات تُقلد من الأم إلى ابنتها ومن جيل إلى آخر. وتُعد هذه الطفرات المتراكمة الأساس المميز لدنا الميتوكوندريات الذي يوجد على وجه التخصيص في كل قارة من القارات.

إضافة إلى الاختلافات الإقليمية في دنا الميتوكوندريات أيضاً، لذلك من المرجح أن يستقر المتحدرين من امرأة ما في أمكنة متجاورة؛ ومن ثم فإن الطفرات التي طرأت أصلاً على دنا الميتوكوندريات الخاص بها ستكون عموماً محصورة في المنطقة المحلية التي عاشت الأم فيها، وكلما رحل الناس من مكان لآخر، فإنهم يحملون معهم بطبيعة الحال دنا الميتوكوندريات الخاص بهم فمثلاً، الناس الذين ارتحلوا واسعا عبر الزمن في مشارف الصحراء الإفريقية، نتيجة لذلك، تشترك الأقوام المختلفة التي تقطن بلدان القارة الإفريقية في نصف دنا الميتوكوندريات تقريبا الخاص بالأفارقة جميعهم، كما برهنت على ذلك دراسة أجريت أخيراً



يجيب عن هذا السؤال إيلي [البيولوجي في جامعة ساوث كارولاينا] بالآتي:

إذا تعرض دنا الميتوكوندريات للتحسين، فإنه لا يتغير كثيراً من جيل إلى جيل، أو أنه لا يتغير على الإطلاق، ويتنقل دنا الميتوكوندريات من الأم فقط إلى أطفالها، فالآباء لا يستطيعون توريث دنا الميتوكوندريات الخاص بهم

ومع أن الطفرات تحدث في دنا الميتوكوندريات، فإنها غالباً أقل من واحد في المئة في الأسلاف. لذا، فإن دنا الميتوكوندريات لشخص ما ربما يطابق مثيله في السلف الأمي المباشر (الذكري أو الأنثوي) قبل عشرة أجيال، وإنه بالإمكان استعمال هذا الإرث المشترك لربط الناس ببعضهم عبر فترة طويلة من الزمن فمثلاً، مبدئياً إذا وُجد نمط خاص من دنا الميتوكوندريات في إفريقيا أمكننا عندئذ أن نستنتج أن الناس في أي مكان آخر من العالم الذين لديهم هذا النمط من دنا الميتوكوندريات لهم سلف أمي من إفريقيا أيضاً

وخلافاً لمعظم الدنا، فإن دنا الميتوكوندريات لا يوجد في صبغياتنا^(٢)، أو حتى في نواة خلايانا (الغلاف المركزي الذي يحتوي على الصبغيات جميعها). فالميتوكوندريات هي تراكيب صغيرة محددة بغشاء، توجد في جميع الخلايا النباتية والحيوانية، وهي مسؤولة عن توليد معظم الطاقة التي تحتاج إليها الخلية كي تقوم بوظائفها، وتحتوي كل متفردة على الدنا الخاص بها. وكذلك ماكينتها الذاتية لبناء البروتين

كيف تتشكل القواقع البحرية، أو كيف تتشكل قوقعة الحلزون؟^(٣)

أو ما يعرف بالصدف (عرق اللؤلؤ naere). وتشبه هذه السيرونة إرساء شبكة الفولاذ (البروتين) في عمارة الأبنية، ثم صب الإسمنت (المعادن) فوقها.

وفي حين أن عظام الحيوانات البرية، كالإنسان مثلاً، تنمو مع نمو الكائن الحي، فإن على الحلزون والبطلينوس مثلاً أن يزيدا تدريجياً من حجم قوقعتيهما بأن يضيفا مواد جديدة إلى حافات القوقعة فمثلاً، يتوضع القسم الأكثر حداثة من قوقعة الحلزون حول الجوف، حيث يبرز الرخوي جسمه إلى الخارج؛ والحافة الخارجية للرداء تضيف باستمرار قوقعة جديدة في هذه المناسبة

يجيب عن هذا السؤال <F>هورن</F> [البيولوجي في جامعة تكساس الولاية] بالآتي:

إن القواقع التي هي الهيكل الخارجي للرخويات - كالبطلينوس clam والمحار oyster والحلزون، وغيرها كثير - لا تتألف من خلايا تشكل البنى الحيوانية النمطية. إنها تتركب بصورة رئيسية من كربونات الكالسيوم مع كمية ضئيلة من البروتين تقل عادة عن 2 في المئة.

إن نسيج الرداء mantle الذي يتوضع تحت القوقعة ويكون على تماس معها، يفرز البروتين والمعادن التي تشكل القوقعة في البداية، تتشكل طبقة غير متكلسة من مادة الكونشيوولين conchiolin: مادة تتألف من البروتين والكيتين chitin والكيتين هو بوليمر^(٤) مقو يُنتج بصورة طبيعية، ثم تتشكل الطبقة المشورية ذات التكلس الشديد، ويُقرر أخيراً الطبقة اللؤلؤية للاماعة.

(١) How do researchers trace mitochondrial DNA over centuries?

(٢) How are seashells or snail shells formed?

(٣) جمع ميتوكوندريا

(٤) أو مكثور، ممتلئ، متبلر

(٥) أو كروموزوماتنا

ضربة قاضية في درجات الحرارة العالية^(١)

«غراء ان» محتملان في الموصلية الفائقة قُضي أمرهما.

المواد التي تدعى زائدة التطعيم overdoped والتي عدد ذرات الأكسجين فيها أكبر من العدد الأمثل optimal للموصلية الفائقة (تتصف المواد الزائدة التطعيم بالموصلية الفائقة إنما عند درجات حرارة تزداد انخفاضاً كلما ازداد التطعيم) وهذا يستبعد كون الفونونات سبب الذروة والفتلة: فالفونونات يجب أن تبقى موجودة في جميع المواد، وحتى في الزائدة التطعيم منها. كما لا يمكن للفونونات أن تكون مسؤولة عن الخلفية العريضة، لو كان كذلك، لاختفت الخلفية عند الترددات العالية، وهذا ما لا يحدث.

كانت العلاقة التي تربط سلوك الذروة الحادة - أي الشروط التي تظهر فيها الذروة في المنحنى البياني - وما كان يُتوقع من رنين مغنطيسي جيدة - لكن هناك مفاجأة: اختفاء الذروة في المواد الزائدة التطعيم التي لاتزال فائقة الموصلية. ونتيجة لذلك لا يمكنها أن تكون سبب الموصلية الفائقة.

وتبقى مسألة الخلفية العريضة، التي يعتقد «تيموسك» ومعاونوه أنها على الأرجح مؤشر إلى السيرورة التي ترتبط بها الإلكترونات لتشكل أزواجاً. كأنه ما كانت هذه العملية ويحاج «M نورمان» [عالم المواد في مختبر أركون الوطني] أنه على الرغم من أن الغراء لا يمكن أن يكون الرنين المغنطيسي الذي أشبع بحثاً. فثمة أسباب قوية تدعو للاعتقاد أنه ذو طبيعة مغنطيسية. وهكذا يستمر البحث، فقد هُزم متنافسان بالضربة القاضية ولكن الأحجية باقية.

HIGH-TEMP KNOCKOUT (١)

high critical temperature high TC أي درجة حرارة حرجة عالية

BCS هي الأحرف الأولى من أسماء العلماء Schrieffer و Cooper و Bardeen

kink = tight curl, twist or bend. وتعني فتلة أو طبة

أو كوية background (٢)

(التحرير)

الفونونات (وقد وضع هذا الحد على درجة الحرارة الحرجة مؤخراً في موضع التساؤل). وثانيها أن استبدال نظائر isotopes مختلفة في موصل فائق من النوع BCS يغير مواصفات الفونونات (فالذرات الأثقل يجب أن تهتز بصورة أبطأ) وهو نتيجة لذلك يغير بدقة درجة الحرارة الحرجة بمقدار معين. ولكن هذه تتغير بمقادير مختلفة في الموصلات الفائقة العالية الحرارة. وهناك أيضاً خواص تفصيلية أخرى يصعب تفسيرها في إطار النظرية BCS

وكان الفيزيائيون يدرسون مؤخراً فتلة "kink"، أو انحناء bend، تظهر في الخطوط البيانية التي تُعبر عن طاقة الإلكترونات المتزاوجة كمفتاح لحل لغز القوة المسببة لتجمعها أزواجاً. وقد ربط العديد من الباحثين الفتلة بنوع من حالة جماعية بين الإلكترونات تدعى الرنين (التجاوب) المغنطيسي magnetic resonance. فيما قدم باحثون مجربون حججاً مفادها أن الفونونات هي سبب الفتلة - وهذه نتيجة يمكن أن تقلب الحكمة التقليدية حول الموصلات الفائقة غير التقليدية

ويبدو أن نتائج التجارب التي أجريت في جامعة ماك ماستر وفي مختبر بروكهافن الوطني، اسقطت الرنين المغنطيسي والفونونات كليهما من كونهما الغراء. فقد عُرض الموصل الفائق في تجربة هذه المجموعة إلى ضوء تحت الأحمر (IR)، واعتبرت كمية الضوء المنتثر عند كل طول موجي قياساً لطاقة الزوج الإلكتروني. ووجد الفيزيائيون، بقيادة «T تيموسك» [من جامعة ماك ماستر] ذروة حادة في الضوء المنتثر عند تردد محدد وقائمة فوق خلفية انتشار عريضة عند جميع الترددات. من الواضح أن للذروة الحادة علاقة بالفتلة التي تلاحظ أيضاً في تجارب أخرى. لكنها اختفت في

خلال الثمانين عشرة سنة منذ اكتشافها بقيت الموصلات الفائقة العالية الحرارة "أحجية" تُوصَل هذه المواد الخزفية، المؤلفة من أكسيد النحاس، الكهربائي، من دون أن تفقد شيئاً عند درجات حرارة أعلى كثيراً من تلك اللازمة للموصلات الفائقة التقليدية، مع أن هذه الحرارة لاتزال أدنى من درجة الحرارة العادية بكثير ويعرف الفيزيائيون أن سبب الموصلية الفائقة في كلا النوعين من المواد هو إلكترونات متزاوجة ومتجمعة ككل في حالة كمومية جماعية واحدة. لكنهم لا يعرفون ما هو «الغراء» glue الذي يسبب تجمعها أزواجاً في الموصلات الفائقة العالية الحرارة. وقد اقترحت أفكار عديدة لكنه لم يُبرهن على أي منها. وترى دراسة تجريبية حديثة أن بالإمكان إقصاء احتمالين نظريين مهمين

ويتحقق التأثير الحاسم بين الإلكترونات بواسطة اهتزازات شبكية الأيونات الموجبة latic of positive ions للمعدن في الموصلات الفائقة المنخفضة الحرارة: إذ يشوه إلكترون ما الشبكة لدى مروره فيها، وبعد انقضاء ميكروثوان عدة يؤثر التشوه في الإلكترون الشريك عند دخوله الشبكة. وتدعى اهتزازات الشبكة فونونات phonons وهي تسلك سلوك الجسيمات بالضبط، ويولد إصدار الإلكترونات وامتصاصها لها تأثيراً تجاذبياً ضعيفاً. ويسمى الفيزيائيون هذا النموذج النظرية "BCS" باسم العلماء الذين استنبطوها رياضياتياً في عام 1957.

وبعد اكتشاف الموصلات الفائقة العالية الحرارة في عام 1986، سارع الفيزيائيون إلى اعتبار أن النظرية البسيطة BCS لا يمكنها أن تفسر سلوك المواد الجديدة وأول ما في الأمر هو أن الاهتزازات الحرارية الناجمة عن درجات الحرارة العالية يجب أن تقهر أي تجاذب تولده